

Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело»

Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться!

Репродуктивным возвратом у женщины читают возраст:

- *от 18 до 48 лет
- от 15 до 40 лет
- от 15 до 20 лет
- от 15 до 30 лет

Беременная должна встать на учет в женской консультации до срока беременности в неделях:

- *12
- 14
- 16
- 20

Первый дородовой патронаж проводится на сроке беременности в неделях:

- 10-12
- *12-15
- 30 -32
- 28-30

Целью второго дородового патронажа к беременной является:

- выяснение состояния здоровья отца ребенка
- знакомство с семьей
- *подготовка женщины к достаточной лактации
- обучение уходу за ребенком

Срок проведения первого патронажа доношенного новорожденного после выписки из роддома в днях:

- 5-7
- 4-6
- *1-3
- 8-10

Эмбриопатии возникают при влиянии повреждающих факторов до недели беременности:

- 24
- 20
- *12
- 30

Обработку глаз новорожденного проводят с целью профилактики:

- *гонобленнореи
- пиогенной инфекции
- ксерофтальмии
- вирусного конъюнктивита

Молозиво оказывает стимулирующее действие на иммунную систему благодаря высокому содержанию:

- жира
- углеводов
- *иммуноглобулинов
- микроэлементов

В местах измерения температуры тела кожа должна быть без:

- пигментных пятен
- *гиперемии, припухлости
- родинок
- волосяного покрова

Одним из признаков живорождения является:

гиперемия кожи
*самостоятельное дыхание
наличие сосательного рефлекса
grimаса при раздражении

Беременная должна посещать женскую консультацию в первой половине беременности:

*1 раз в месяц
раз в 2 недели
2 раза в триместр
раз в неделю

Клинический анализ крови у беременных в женской консультации проводится:

3 раза за беременность
2 раза в месяц
*1 раз в месяц
1 раз в 2 месяца

Совершившееся событие, при наступлении которого застрахованному лицу по ОМС предоставляется страховое обеспечение, называется:

страховой риск
типовой случай
*страховой случай
случайное стечение обстоятельств

Оптимальная относительная влажность воздуха в смотровом кабинете составляет (%):

*40-60
80-90
20-30
15-20

Кратность проведения обследования на сифилис в течение беременности составляет:

1
*3
2
4

Использованные режуще-колющие медицинские изделия опускают в:

непрокальываемые контейнеры многократного применения
мягкую тару
разобранном и измельченном виде
*непрокальываемые контейнеры однократного применения

Кратность проведения УЗИ с целью пренатальной диагностики составляет:

однократно во II триместре
*трижды в I, II и III триместрах беременности
однократно в I триместре
по строгим показаниям

К муколитическим средствам относят:

сальметерол
кодеин
*ацетилцистеин
кромогликат натрия

Наиболее достоверным методом диагностики врожденного порока развития плода во II триместре является:

амниоскопия
*ультразвуковое исследование
биопсия хориона
электрокардиография

К физиологическим изменениям системы кровотока, характерным для беременности, относится:

*увеличение объема циркулирующей крови

понижение количества эритроцитов
повышение количества лейкоцитов
понижение количества тромбоцитов

Синтез хорионического гонадотропина происходит в:

надпочечниках
*синцитиотрофобласте
гипофизе
яичниках

При сроке беременности 36 недель дно матки:

*достигает мечевидного отростка
а уровне пупка
на середине расстояния между пупком и лоном
на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

Кроме яичников, прогестерон во время беременности вырабатывается также:

*плацентой
гипоталамусом
гипофизом
щитовидной железой

Биологические методы диагностики беременности относятся к группе признаков:

*вероятных
предположительных
сомнительных
достоверных

Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности характеризуются:

остаются без изменений
*повышением
незначительным понижением
значительным понижением

Женский таз состоит из костей:

двух лобковых
*двух тазовых, крестца и копчика
трех подвздошных
двух седалищных

К наружному слою мышц, поддерживающих внутренние половые органы, относятся:

*седалищно-пещеристые
подвздошно- копчиковые
седалищно- копчиковые
лобково-копчиковые

Наружный зев нерожавшей женщины имеет форму:

щелевидную
Т-образную
*точечную
серповидную

Показанием к применению препарата дифенгидрамина (димедрола) является:

судороги
головная боль
ринит
*крапивница

Форма шейки матки нерожавшей женщины:

шарообразная
призматическая
цилиндрическая

*коническая

Нормальная длина пуповины равна (см):

*50

30

70

40

Пуповина включает сосуды:

одну вену и одну артерию

*две артерии и одну вену

две вены и одну артерию

две вены и две артерии

Хорионический гонадотропин стимулирует секрецию:

эстрогенов

андрогенов

*прогестерона

эстриола

В норме созревание шейки матки происходит, начиная с недели беременности:

34

36

35

*38

Поперечный размер плоскости выхода из малого таза составляет (см):

*11

9

13

12,5

Количество мочеиспусканий за сутки у новорожденного:

15-20

8-10

*20-25

6-8

Первый период родов продолжается до полного:

*раскрытия маточного зева

излития околоплодных вод

раскрытия внутреннего зева

сглаживания шейки матки

Гормон, стимулирующий родовую деятельность:

*окситоцин

питуитрин

фолликулин

тестостерон

Расстояние от середины большого родничка головки плода до подъязычной кости, называется размером:

*вертикальным

малым косым

большим косым

прямым

Своевременное отхождение околоплодных вод происходит при:

*полном или почти полном открытии маточного зева

образовании пояса прилегания

появлении потуг

опущении головки плода в полость малого таза

Интервал между схватками в период изгнания при нормальных родах составляет (мин.):

- 4-5
- *2-3
- 6-7
- 8-9

Тактика ведения 3 периода родов зависит от:

состояния плода

- *наличия признаков отделения плаценты
- продолжительности 1 и 2 периода родов
- величины и размеров последа

Третий период родов продолжается до:

- *рождения последа
- рождения плаценты
- рождения плода
- излития околоплодных вод

Аускультация плода во втором периоде родов при головном предлежании проводится:

- *чуть ниже пупка со стороны позиции
- на уровне пупка
- выше пупка
- над лобком

Федеральный закон, регламентирующий право присутствия на родах отца ребенка или иного члена семьи:

- № 678
- № 572н
- № 574
- *№ 323

Оценка здорового новорожденного по шкале Апгар составляет (в баллах):

- 2 – 4
- 10 – 12
- *8 – 10
- 5 – 7

Для установления связи между матерью и ребенком, акушерка должна приложить ребенка к груди:

- *сразу после рождения
- через 1 час
- через 2 час
- через 1 день

Физиологическая прибавка массы тела за беременность составляет в килограммах:

- 7-8
- 5-6
- *10-12
- 13-14

Третий прием Леопольда-Левицкого определяет:

- вставление головки
- позицию
- *предлежащую часть
- вид

Для совместного пребывания матери и ребенка предназначаются палаты:

- *одно или двухместные
- от четырехместных до пятиместных
- трех или четырехместные
- от четырехместных до шестиместных

Нормальные размеры женского таза составляют (см):

- 20-23-25-17

22-25-28-18
28-29-32-15
*25-28-31-20

К адаптированным сладким детским молочным смесям относится:

коровье молоко
*«Хипп комбиотик»
«Наринэ»
«Бифилакт»

Основным фармакологическим эффектом применения парацетамола является:

*анальгезирующий
противоаллергический
антибактериальный
желчегонный

У здорового новорожденного всегда открыт родничок:

*большой
правый боковой
левый боковой
малый

Отношение конечностей к головке и туловищу плода называется:

положение
вид
позиция
*членорасположение

Отношение оси плода к оси матки называется:

вид
позиция
предлежание
*положение

Отношение стреловидного шва к плоскостям таза называется:

разгибание головки
*вставление головки
предлежание головки
сгибание головки

Произвольный сфинктер прямой кишки образован:

круговым слоем мышц стенки прямой кишки
подвздошно-поясничной мышцей
*мышцами диафрагмы таза
продольным слоем мышц стенки прямой кишки

Женское молоко содержит в большом количестве:

казеин
насыщенные жирные кислоты
*гаурин
альфа-лактозу

Основной задачей предоперационного периода является:

улучшение состояния пациента
установление точного диагноза
*подготовка пациента к операции
оформление пациента в стационар

Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеление плода чаще всего на сроке (недели):

20
14
*18

Длительность инволюции половых органов после родов составляет (недели):

2
*6
4
3

Сроки закрытия внутреннего шеечного зева после родов составляет (дни):

*3
7
14
20

Дексаметазон применяется во время беременности для:

*профилактики респираторных расстройств новорожденного
профилактики предлежания плаценты
профилактики кровотечения во втором периоде родов
лечения аномалий родовых сил

Осмотр родовых путей после родов проводится:

только первородящим
только повторнородящим
*всем женщинам
только женщинам из группы риска

Защиту промежности проводят в периоде:

рождения последа
*изгнания плода
раннем послеродовом
раскрытия шейки матки

При осмотре последа необходимо убедиться в целостности:

только оболочек
*плаценты и оболочек
только долек плаценты
краев плаценты

Сроки исчезновения физиологической желтухи у новорожденного (дни жизни):

4-й
7-8-й
5-6-й
*10-12-й

К утеротонизирующему лекарственному средству относится:

гепарин
аскорбиновая кислота
*метилэргометрин
вальпроевая кислота (конвулекс)

К гепатопротекторам относится:

*эссенциале форте Н
пирацетам
ацетилсалициловая кислота
амброксол (лазолван)

К кристаллоидным инфузионным препаратам относится:

реополиглюкин
полиглюкин
желатиноль
*0,9% раствор натрия хлорида

Лекарственным средством, расслабляющим миометрий, является:

мидекамицин (макропен)
динопрост
окситоцин
*гексопреналин (гинипрал)

Перинатальный период включает в себя периоды:

*антенатальный + интранатальный+ ранний неонатальный
антенатальный + интранатальный
антенатальный + неонатальный
интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный

Комплекс мероприятий по интранатальной охране плода в основном осуществляется в:

поликлинике для взрослого населения
*акушерском отделении родильного дома
женской консультации
отделении новорожденных родильного дома

Гинекологическую помощь девочкам до 15 лет оказывают:

*детские поликлиники, детские гинекологи
диспансеры
гинекологические отделения взрослых поликлиник
школьные врачи

Первое место в структуре гинекологической заболеваемости занимают болезни:

*воспалительные
осложнения беременности
врожденные аномалии
онкологические

Одним из показателей деятельности родильного дома является:

повозрастная смертность в детском возрасте
летальность
младенческая смертность
*перинатальная смертность

Периодические изменения в организме женщины репродуктивного возраста, направленные на возможность наступления беременности:

период беременности
*овариально-менструальный цикл
период менархе
климактерический период

Женские половые гормоны первой фазы менструального цикла:

*эстрогены
окситоцин
прогестерон
вазопрессин

Гормон второй фазы менструального цикла:

эстрогены
окситоцин
*прогестерон
вазопрессин

Маточный цикл овариально-менструального цикла состоит из:

ассимиляции, пролиферации
фагоцитоза, гиперплазии, секреции
*десквамации, репарации, пролиферации, секреции
овуляции, секреции, пролиферации

Уровни регуляции овариально-менструального цикла:

кора головного мозга, щитовидная железа, сердце, почки
*кора головного мозга, подкорковые центры, гипофиз, яичники, матка
надпочечники, яичники, почки
кора головного мозга, гипоталамус, щитовидная железа, матка

Эффект эстрогенов:

*гипертрофия эндометрия
гипоплазия эндометрия
атрофия эндометрия
секреция эндометрия

Эффект гестагенов:

гипертрофия эндометрия
гипоплазия эндометрия
атрофия эндометрия
*секреция эндометрия

Эффект действия лютеинизирующего гормона:

*стимуляция овуляции
торможение овуляции
стимуляция щитовидной железы
торможение созревания фолликулов

ФСГ вырабатывается в:

гипоталамусе
*передней доле гипофиза и яичниках в незначительном количестве
плаценте
надпочечниках

За развитие фолликулов в яичниках ответственны гормоны:

*ФСГ- релизинг фактор, ФСГ
эстрогены
гестагены
пролактин

Место выслушивания плода при 2 позиции:

*справа от пупка
над лоном
слева от пупка
выше пупка

Позиция плода при поперечном положении определяется по положению:

*головки и мелких частей плода
спинки
тазового конца плода
головного конца плода

Острая плацентарная недостаточность возникает вследствие:

наличия гестоза
узкого таза
многоводия
*тугого обвития пуповины вокруг шеи плода

Одна из причин развития предлежания плаценты:

многоплодие
*дистрофические изменения слизистой оболочки матки
многоводие
неправильное положение плода

Клинические признаки, характерные для предлежания плаценты:

матка мягкая, сердцебиение плода отсутствует
матка в тонусе, болезненная, асимметричная

матка в тонусе, массивное длительное кровотечение

*матка мягкая, симметричная, кровь алая

Сроки истинного перенашивания беременности:

*42 и более недель

39-40 недель

38-39 недель

37-38 недель

Ежемесячная прибавка массы тела беременной после 30 недель в норме:

до 3 кг

500,0

600,0

*800,0- 1,000

Перинатальный период начинается (недели):

33

30

16

*22

Что относится к предгравидарной подготовке?:

гормональная контрацепция

*комплекс мероприятий подготовки организма к благополучной беременности и родам

антианемическая терапия

активные физические тренировки

Показания к оперативному родоразрешению при миоме матки:

*расположение опухоли в нижнем сегменте

субсерозная миома матки

внутристеночная миома матки

множественная миома матки

Степень тяжести кровотечения в третьем периоде родов при кровопотере до 1000мл?

легкая степень

*средняя степень тяжести

физиологическая кровопотеря.

тяжелая степень

К воспалительным заболеваниям внутренних половых органов женщины относятся:

вульвит

*кольпит, цервицит, эндомерит

пельвиоперитонит

острый бартолинит

Характерная особенность ретенционных кист яичников:

*увеличиваются за счет накопления жидкого содержимого

увеличиваются за счет пролиферации клеточных элементов

относятся к злокачественным образованиям женских половых органов

обладают инвазивным ростом

Контрацептивное воздействие спермицидов основано на:

разрушении сперматозоидов

усилении перистальтики маточных труб

изменениях в эндометрии

*нарушении подвижности сперматозоидов

Способ временного гемостаза при венозном кровотечении:

максимальное сгибание конечности в суставе

*давящая повязка, возвышенное положение конечности

наложение кровоостанавливающего жгута

пальцевое прижатие на протяжении

Для остановки артериального кровотечения из раны в области кисти необходимо:

- *наложить давящую повязку
- наложить жгут выше места ранения
- наложить герметичную повязку
- произвести пальцевое прижатие

При оценке эффективности ИВЛ у новорожденного, подсчет частоты сердечных сокращений осуществляется в течение (сек.)

- *6
- 20
- 3
- 12

При ожидающихся преждевременных родах, температура воздуха в родильном зале должна составлять (°C):

- 22
- 24
- 30
- *26

Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони у новорожденного являются признаками:

- фенилкетонурии
- *болезни Дауна
- галактоземии
- муковисцидоза

У здорового доношенного новорожденного окружность головы составляет в среднем (см):

- 28-30
- *34-36
- 30-32
- 40-42

Персонал медицинской организации, не иммунизированный против гепатита В, допускается к работам по обращению с медицинскими отходами:

- *только класса А
- любого класса
- класса А,Б и В
- только класса Б

При проведении антропометрических исследований используют:

- шагомер
- секундомер
- *весы
- динамометр

Уровень глюкозы в крови определяют:

- *утром, натощак
- через 2 часа после еды
- через 1 час после еды
- сразу после еды

При отравлении метанолом в качестве антидота применяется:

- налоксон
- *этанол
- атропин
- унитиол

Перед введением любого лекарственного средства медицинская сестра обязательно:

- подогревает лекарственное средство
- проводит пробу на наличие аллергической реакции
- разводит лекарственное средство физиологическим раствором

*проверяет срок годности

Для сбора использованных инъекционных игл акушерка готовит:

мешок желтого цвета

мешок красного цвета

бумажный контейнер

*непрокалываемый контейнер

В материальное обеспечение при проведении любой инъекции обязательно входит:

жгут венозный

*кожный антисептик

подушечка из влагостойкого материала

стойка-штатив

При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие осложнения:

*эмболия

флегмона

кровотечение

спазм сосуда

К мочегонным препаратам относятся:

фуразолидон

фурагин

фурадонин

*фуросемид

При проведении медицинской сортировки пострадавший с состоянием средней степени тяжести обозначается сортировочной маркой цвета:

*желтого

черного

зеленого

красного

Абсолютным противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери является прием лекарственного препарата:

апилак

бифиформ

витамина Д

*метотрексат

При третьей степени недоношенности масса тела новорожденного составляет (гр.):

1501-2000

менее 1000

2001-2500

*1001-1500

Оценка новорожденного по шкале Апгар в 5 баллов свидетельствует о степени асфиксии:

*умеренной

тяжелой

легкой

очень тяжелой

К родовой травме относят:

гемолитическую болезнь новорожденного

*кефалогематому

физиологическую эритему

bronхолегочную дисплазию

В случае перелома ключицы у новорожденного, его укладывают:

на живот

на спину

*на здоровый бок

на бок со стороны перелома

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается в отношении:

несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи

*лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами

лица, не достигшего 15 летнего возраста

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

Документом, удостоверяющим определенный факт, событие или действие в медицинской организации, является:

протокол

приказ

справка

*акт

При отморожении кисти накладывают повязку:

крестообразную

осьмиобразную

*варежку

спиральную

В анализе мочи при сахарном диабете определяется:

билирубин

белок

*ацетон

уробилин

К чрезвычайно эпидемиологически опасным отходам относятся:

*отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров

ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование

пищевые отходы из инфекционных отделений

отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными

Качество предстерилизационной очистки изделий многократного использования от крови проверяют путем постановки пробы:

судановой

лакмусовой

*азопирамовой

фенолфталеиновой

Признаком травмы верхне-шейного отдела позвоночника у новорожденного является:

отсутствие движения в одной кисти

вялое свисание руки

спазм мышц нижних конечностей

*поперхивание при глотании

Чаще всего омфалит у новорожденного в родовспомогательных медицинских учреждениях вызывает:

пневмококк

*золотистый стафилококк

кишечная палочка

протей

Оптимальным временем первого прикладывания здорового доношенного новорожденного к груди является:

вторые сутки

первые сутки

*первые 30 минут

первые 12 часов

Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется:

*отрицательным естественным приростом

положительным естественным приростом

демографическим взрывом

нулевым естественным приростом

Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте подряд без уважительных причин в течение:

- 3 часов
- 2 часов
- *4 часов
- 5 часов

Химическое вещество, свойства которого направлены на ослабление или прекращение действия яда, называется:

- катализатор
- реагент
- сорбент
- *антидот

Алая пульсирующая струя крови характерна для кровотечения:

- смешанного
- *артериального
- венозного
- капиллярного

Медицинский персонал обязательно надевает перчатки перед выполнением процедуры:

- измерение артериального давления
- *внутримышечная инъекция
- измерение пульса
- регистрация ЭКГ

К медицинским отходам класса А относятся:

- *пищевые отходы соматических отделений
- пищевые отходы инфекционных отделений
- отходы микробиологических лабораторий
- радиоактивные отходы

Мешок Амбу используется:

- для предупреждения западения языка
- для обеспечения проходимости дыхательных путей
- *при искусственной вентиляции лёгких
- при оксигенотерапии

Состоянием, при котором происходит кратковременная потеря сознания, является:

- кома
- коллапс
- сопор
- *обморок

При сахарном диабете в моче выявляется:

- *глюкоза
- уробилин
- белок
- билирубин

Местом выполнения внутримышечной инъекции является квадрант ягодицы:

- верхний внутренний
- нижний наружный
- нижний внутренний
- *верхний наружный

В период кормления грудью женщине не рекомендуется употреблять в пищу:

- молоко
- говядину
- *чеснок
- яблоки

Риск врожденной патологии плода значительно возрастает если беременная заболела:

ветряной оспой

корью

*краснухой

эпидемическим паротитом

Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья относится к профилактике:

третичной профилактике

*первичной профилактике

реабилитация

вторичной профилактике

Постельное белье в родильнице меняют:

раз в неделю

ежедневно

раз в 10 дней

*раз в три дня

Причиной возникновения гемолитической болезни новорожденного является:

родовая травма

внутриутробное инфицирование

*резус-конфликт

вирусный гепатит

При отсутствии сердцебиения у новорожденного, реанимационные мероприятия в родильном зале прекращаются через (мин.)

*10

5

20

15

Самой частой причиной сепсиса у новорожденных является:

омфалит

потница

токсическая эритема

*пузырчатка новорожденных

Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (недели)

32-34

*38-42

28-30

35-37

Частота сердечных сокращений у здорового новорожденного составляет (уд. в мин.)

*120-140

170-190

80-100

100-120

Заполнение палаты при совместном пребывании матери и ребенка происходит в течение:

48 часов

*24 часов

72 часов

12 часов

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану называется:

стерилизация

антисептика

дезинфекция

*асептика

При анемиях в общем клиническом анализе крови наблюдается снижение:

*эритроцитов, гемоглобина
эозинофилов
тромбоцитов
лейкоцитов, нейтрофилов

Осложнением приема сердечных гликозидов является:

*экстрасистолия
фибрилляция предсердий
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
синусовая тахикардия

Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении называется:

экспрессивность
рефлексия
рационализация
*эмпатия

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры), имеющую цвет:

*желтый
черный
белый
красный

При проведении СЛР соотношение вдуваний в дыхательные пути пациента и компрессий на грудину составляет:

1:15
*2:30
1:20
2:15

Биохимическим показателем, отражающим функцию почек, является:

глюкоза
*креатинин
билирубин
кальций

Сублингвальное применение предполагает введение лекарственных препаратов:

подкожно
в дыхательные пути
в прямую кишку
*под язык

Стилем поведения в межличностном конфликте, предполагающем взаимные уступки для нахождения приемлемого для противостоящих сторон решения, является:

противоборство
*компромисс
приспособление
уклонение

С целью поддержки грудного вскармливания, первое прикладывание к груди здорового новорожденного должно осуществляться после рождения не позднее чем (часы):

4
1
*2
3

Образцы крови при проведении неонатального скрининга доставляются в медико-генетическую лабораторию не позднее (часы):

94
72
*48

Морфологическим признаком недоношенности является:

расположение ногтей до краев ногтевого ложа
хорошее развитие подкожной жировой клетчатки
*тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком
закрытый малый родничок

Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (гр):

2000-2500
4500-5000
*3000-3500
2500-3000

За первый месяц жизни здоровый новорожденный должен прибавить в весе не менее (гр):

400
300
*600
200

Необоснованное назначение большого количества лекарственных средств беременным называется:

синергизм
кумуляция
*полипрагмазия
антагонизм

Критерием эффективности проводимой ИВЛ является:

появление пульса на сонной артерии
*экскурсия грудной клетки
бледность кожных покровов
вздутие эпигастральной области

К первой сортировочной группе относят пострадавших, имеющих:

тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций
легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения
повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
*крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения

Одним из факторов развития гипоксии плода является:

срочные роды
продолжительность первых родов 10 часов
*длительный безводный период
головное предлежание

Недоношенный новорожденный может быть выписан при достижении им массы (гр)

3000
3500
2000
*2500

Противопоказанием к раннему прикладыванию у груди со стороны матери является:

*открытая форма туберкулеза
тугие соски
избыточная масса тела
компенсированная артериальная гипертензия

Горизонтальное плавающее движение глазных яблок у недоношенных детей называется:

астигматизм
экзофтальм
анизокория
*нистагм

Одним из симптомов гипогалактии со стороны новорожденного является:

- *уменьшение суточного объема мочи
- нормальная прибавка массы тела
- жидкий стул
- спокойный сон

К химическому методу стерилизации относится:

- плазменный
- воздушный
- паровой
- *газовый

Противопоказанием для промывания желудка является:

- *желудочное кровотечение
- отравление алкоголем
- эндогенная интоксикация
- отравление грибами

Гипертонус мышц-сгибателей сохраняется у здорового доношенного новорожденного до возврата(мес.)

- 1
- 6
- *3
- 4

Стандарт медицинской помощи при различных заболеваниях и состояниях включает:

- *рекомендуемые к применению лекарственные препараты
- правила организации деятельности медицинской организации
- рекомендуемые штатные нормативы
- оснащение медицинской организации

Пациенту с хронической почечной недостаточностью следует ограничивать употребление продуктов, богатых:

- клетчаткой
- углеводами
- калием
- *белками

Уменьшение количества мочи называется:

- поллакиурия
- *олигурия
- ишурия
- полиурия

При синдроме длительного сдавления целью наложения жгута выше мета повреждения является:

- создание депо венозной крови
- предотвращение плазмопотери
- остановка венозного кровотечения
- *предотвращение токсемии

Порядок оказания медицинской помощи по отдельным ее видам включает:

- рекомендуемые к применению лекарственные препараты
- *этапы оказания медицинской помощи
- виды лечебного питания
- кратность применения медицинской услуги

Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении:

- *фосфорорганическими соединениями
- этанолом
- атропином
- метанолом

Временным противопоказанием для кормления новорожденного грудью является:

- галактоземия

*родовая травма
болезнь «кленового сиропа»
фенилкетонурия

Синдром Арлекина у недоношенного новорожденного является признаком:

нарушения функции ЦНС
снижения терморегуляции
мышечной гипотонии
*нарушения микроциркуляции

Местом размещения собранных образцов крови при проведении неонатального скрининга является:

*бумажный тест-бланк
пробирка
предметное стекло
капилляр

Исследование образцов крови в лаборатории при проведении неонатального скрининга выполняют в срок до:

2 дней
*10 дней
12 часов
24 часов

Реакция новорожденного на проводимые в родильном зале реанимационные мероприятия оценивается:

в первую и пятую минуты
через 10 минут
*каждые 30 секунд
каждую минуту

Болезнь Дауна развивается при трисомии по паре хромосом:

*21
20
19
22

Большое количество эритроцитов, выявленное в общем анализе мочи, называется:

пиоурия
*гематурия
лейкоцитурия
цилиндрурия

Максимальное количество баллов при оценке функционального состояния новорожденного составляет:

14
8
12
*10

Лежа на спине на щите транспортируют пациента переломом:

костей голени
костей предплечья
ребер
*поясничного отдела позвоночника

Медицинский персонал при работе с цитостатиками меняет перчатки:

ежедневно
*каждый час
каждые 2 часа
через 6 часов

Симптом «прилипшей» пятки характерен для перелома:

*шейки бедра
костей стопы

позвоночника
костей голени

Отличительным признаком ожога 2 степени является:

некроз тканей

*наличие пузырей или их остатков

отек тканей

гиперемия кожи

К сердечным гликозидам относится препарат:

*коргликон

каптоприл

атенолол

ибупрофен

При повреждении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы голова новорожденного наклонена:

*в большую сторону

вперед

назад

в здоровую сторону

Одним из признаков синдрома профессионального выгорания у медицинских работников является:

высокая работоспособность

*отстраненность от пациентов и работы

активное участие в жизни коллектива

заинтересованность в результате труда

К социальным эффектам гигиенического обучения населения относится:

*повышение качества жизни населения

консолидация общества

сокращение убытков от временной нетрудоспособности

улучшение медицинского обслуживания

В третьем триместре беременности помощью лечебной физкультуры решается задача:

снижения болевых синдромов опорно-двигательного аппарата

уменьшения пастозности и отеков нижних конечностей

*увеличения подвижности крестцово-подвздошных сочленений и тазобедренных суставов

повышения толерантности к физическим нагрузкам

Один из основных методов изучения заболеваемости населения:

данные переписи населения

статистические талоны

листки нетрудоспособности

*данные медицинских осмотров

Влагалищным доступом обезболиванием проводят:

*малые гинекологические операции

средние гинекологические операции

большие гинекологические операции

лапароскопические гинекологические операции

При концентрации гемоглобина менее 70г/л беременную необходимо направить:

*на госпитализацию в стационар

на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам

в дневной стационар

на санаторно-курортное лечение

Вся интенсивная терапия эклампсии направлена на профилактику:

печеночной комы

пареза кишечника

почечной колики

*следующего приступа судорог

Границы субфебрильной температуры тела (°C) человека составляет:

38,1-40

39,1-40

*37,1-38

36,1-37,3

К выплатам по социальному обеспечению относятся:

компенсация материального ущерба

компенсации вследствие стихийных бедствий

*выплаты по беременности и родам

компенсация морального ущерба

К лекарственным формам с парентеральным введением лекарственных препаратов относятся:

драже

мази

*стерильные растворы

капсулы

Лазерную деструкцию патологического очага на шейке матки относят к операциям:

средним гинекологическим

большим гинекологическим

*малым гинекологическим

лапароскопическим гинекологическим

Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям может производиться:

до 22 недель беременности

до 12 недель беременности

до 28 недель беременности

*в любые сроки беременности

Гибель плода во время родов называется:

перинатальная

антенатальная

*интранатальная

постнатальная

Сведения о диагнозе при оформлении листка нетрудоспособности:

вносятся по разрешению администрации

не вносятся

*вносятся с согласия пациента

обязательно вносятся без согласия пациента

Продолжительность послеродового отпуска при осложнённых родах в календарных днях составляет:

84

70

*86

80

Наиболее частой причиной развития железодефицитной анемии является:

избыточное употребление углеводов

избыточное употребление белков

*хроническая кровопотеря

дефицит витаминов

Ранним проявлением развивающихся крытых отеков у беременных является:

увеличение живота

гидроперикард

*увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

гидроторакс

Родственники, присутствующие на родах в родильном зале должны быть одеты в:

сменную одежду и сменную обувь
обычную одежду
*сменную одежду, халат, маску, обувь и бахилы
обычную одежду и халат

Фебрильной температурой тела (°C) у пациента считается:

*38,1-39
39,1-40
37,1-38
36,1-37,3

Верхняя граница физиологической кровопотери в родах составляет от массы тела (%):

*1
0,5
5
0,6

Границами плоскости входа в малый таз являются:

*верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
низ симфиза, седалищные бугры, край копчика
низ симфиза, седалищные ости, мыс
проекция вертлужных впадин, середина крестца

Свойства и функции амниотической жидкости:

ограничивает свободу движений эмбриона
способствует питанию плода
*создает защитную подушку для эмбриона
обеспечивает иммунологическую защиту

Срок гестации, при котором плод достигает длины 35см и массы 1000 г, составляет (недели):

*28
30
26
35

Заболевание, при котором беременная должна наблюдаться у пульмонолога:

вирусный гепатит
порок сердца
*бронхиальная астма
ревматизм

Антидотом при передозировке сульфата магния является:

антигистаминный препарат
увлажненный кислород
преднизолон
*кальция глюконат

Для эпидуральной анестезии в акушерстве применяют:

пропранолол (анаприлин)
лидокаин
*бупивакаин
этимизол

При бимануальном исследовании необходимо оценить:

состояние прямой кишки
состояние лимфоузлов
*состояние внутренних половых органов и связочного аппарата
степень развитости мышц брюшного пресса

Отсутствие менструации во время лактации называется:

психогенной аменореей
фармакологической аменореей

ложной аменореей
*физиологической аменореей

Наиболее эффективным средством защиты от заболеваний, передающихся половым путем является:

влагалищная диафрагма
*презерватив
прерванный половой акт
шеечный колпачок

Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:

*наличием необходимого количества медицинских работников
муниципальным управлением здравоохранением
функционированием частной системы здравоохранения
государственным управлением здравоохранением

Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:

2 часа
15-20 минут
*30 минут
3-6 минут

Личный состав на сортировочном посту работает с использованием средств индивидуальной защиты:

защитная одежда и приборы дозиметрического контроля
защитная одежда, перчатки, очки
защитная одежда, перчатки, щитки
*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

Патологическое урежение дыхания:

*брадикапноэ
тахипноэ
апноэ
диспноэ

Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:

ситуационно-обусловленные потери
общие потери
санитарные потери
*безвозвратные потери

Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:

*травма не совместимая с жизнью
травматический шок
острая кровопотеря
психотравма

Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:

3 часа
6 часов
1 час
*20-30 минут

К основным сортировочным признакам относится:

тяжесть состояния пострадавшего
*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации
вид повреждения
развитие шока и комы

К видам паллиативной помощи относится:

диспансеризация
скорая помощь
*консультативная помощь
радикальная операция

Вакцинацией БЦЖ формируется иммунитет:

естественный

*активный специфический

неспецифический

пассивный специфический

Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при угрожающих их жизни и здоровью:

развлекательных мероприятиях

террористических актах

*несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях

травмах

Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской помощи – это:

сестринские технологии

сестринское дело

деонтология

*медицинская этика

К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием можно отнести:

дротаверин (но-шпа)

панкреатин (фестал)

мебеверин (дюспаталин)

*эссенциальные фосфолипиды (эссенциале)

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечет за собой:

выговор

увольнение

*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

замечание

Состояние новорожденного оценивается по шкале:

Цельсия

Петрусса

Ватерлоу

*Апгар

Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:

1%

0,1%

10%

*0,9%

Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:

восстановление сознания

повышение температуры тела

*порозовение кожных покровов

повышение АД

К физическому методу дезинфекции относят:

проветривание

вытряхивание

*кипячение

протираание

Вирусный гепатит В передается путем:

алиментарным

воздушно-пылевым

воздушно-капельным

*парентеральным

Основной фактор роста абортотв и родов среди подростков:

экологическая ситуация

*неосведомленность о методах и средствах контрацепции

избыточное использование контрацептивов

широкая доступность информации о половом воспитании

Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:

эндемия

спорадические заболевания

эпидемия

*пандемия

Гигиеническое воспитание – это:

просветительная деятельность

воспитательная деятельность

обучающая деятельность

*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

Раннее прикладывание новорожденного к груди способствует:

профилактике мастита

быстрому росту ребенка

*усилению лактации

профилактике рахита

Механическая антисептика – это:

наложение давящей повязки

*удаление из раны нежизнеспособных тканей

промывание раны раствором водорода пероксида

дренирование раны марлевым тампоном

Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:

трудовой потенциал населения

уровень детской смертности

средняя продолжительность жизни

*ожидаемая продолжительность жизни населения

Профилактикой заболеваний репродуктивной системы является:

низкокалорийное питание

лечение соматических заболеваний

*предупреждение абортов

высококалорийное питание

Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется:

профилактическая

физическая

заключительная

*текущая

Промедол – это:

*наркотический анальгетик

аналептик

психостимулятор

ненаркотический анальгетик

К важнейшим принципам охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» относится:

медицинское страхование граждан

*соблюдение врачебной тайны

государственное управление здравоохранением

муниципальное управление здравоохранением

Проведение биологической антисептики предусматривает применение:

*средств биологического происхождения
дренирования ран
обработки ран с 3% раствором перекиси водорода
первичной хирургической обработки ран

Для совмещения в один этап дезинфекции и ПСО можно использовать дезсредства, обладающие:
дезинфицирующим и стерилизующим действием
только дезинфицирующим действием
*дезинфицирующим и моющим действием
дезинфицирующим и дезодорирующим действием

Оптимальное значение Ph мыла для мытья рук медперсонала:
10,0
*5,5
3,0
8,5

Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции в обязательном порядке должны проходить:
все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
*доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей
весь медицинский персонал
лица любой профессии перед трудоустройством

Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:
*брадипноэ
ортопноэ
тахипноэ
апноэ

При желудочном кровотечении кал бывает:
кровянистый
*дегтеобразный
обесцвеченный
«овечий кал»

Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более:
8 часов
4 часов
*2 часов
1 часа

При беременности наиболее вероятно развитие анемии:
серповидно-клеточной
гемолитической
гипопластической
*железодефицитной

Обязательное медицинское страхование является:
системой, направленной на защиту прав медицинских работников
*составной частью государственной системы социального страхования
страхованием от несчастных случаев
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:
*подавления овуляции
снижения двигательной активности сперматозоидов
уничтожения сперматозоидов
стужения цервикальной слизи

Сроки вакцинации против туберкулеза у доношенного ребенка:
8-9 день жизни

*3-7 день жизни

4-6 день жизни

7-8 день жизни

Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:

Программой развития здравоохранения

Гражданским кодексом РФ

*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Трудовым Кодексом РФ

Репродуктивный период женщины – это период:

полового созревания

угасания детородной функции

полового покоя

*наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

Задержкой стула считается его отсутствие в течение:

72 часов

36 часов

24 часов

*48 часов

При постановке очистительной клизмы наконечник в прямую кишку вводят на глубину (см):

2-4

20

40

*10-12

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развиваются только при наличии:

источника инфекции

*источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

источника инфекции, механизмов и факторов передачи

источника инфекции и восприимчивого человека

Медицинский персонал одноразовые медицинские перчатки:

*меняет после каждой манипуляции

не меняет, однократно протирая спиртом

меняет в конце рабочего дня

не меняет, двукратно протирая спиртом

Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:

дезинфекции

дератизации

*стерилизации

дезинсекции

Персонал, не иммунизированный против гепатита В, к работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В:

допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

*не допускается

допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации

допускается во всех случаях

Режим стерилизации инструментария многократного использования в паровом стерилизаторе:

*132°C, 2 атм, 20 минут

180°C, 3 атм, 20 минут

120°C, 4 атм, 20 минут

120°C, 1,1 атм, 20 минут

Важным этапом предупреждения профессионального заражения гемоконтактными и иными инфекциями является:

ежегодное обследование

обследование всех пациентов

*оценка факторов риска в своей работе
уклонение от работы с инфицированными пациентами

Структурно-функциональной единицей почки является:

долька
ацинус
фолликул
*нефрон

Воспаление пупочной ранки новорожденного называется:

дерматит
потница
*омфалит
гемангиома

Ритм пульса определяют по:

силе, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
*интервалу между пульсовыми волнами
числу пульсовых волн за 1 минуту
наполнению артерии кровью

Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется:

дератизацией
дезинсекцией
стерилизацией
*дезинфекцией

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:

на сроке до 6 недель
независимо от срока беременности
*на сроке до 12 недель
до 22 недель

После выписки или смерти пациента проводят дезинфекцию:

текущую
*заключительную
профилактическую
предварительную

Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):

40-50
20-30
130-150
*100-120

Для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздержаться от:

беременности
*чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей
приема мясной пищи
занятий физкультурой

Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится:

*до 22 недель
на сроке до 12 недель
на сроке до 6 недель
независимо от срока беременности

Немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является:

употребление табака и алкоголя
несбалансированное питание
*половозрастная принадлежность
недостаточная физическая активность

Деятельность школ здоровья является формой проведения:

социальной профилактики
первичной профилактики
*вторичной профилактики
популяционной профилактики

Оценка физического развития детей проводится с помощью:

возрастных стандартов
индивидуальных стандартов
*центильных таблиц
визуально

Основной задачей психопрофилактической подготовки беременной к родам является:

ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
ознакомление беременных со строением и функциями половых органов
*устранение психогенного компонента родовой боли
разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

Антисептикой называется:

уничтожение болезнетворных микробов
комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений
*комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется комплекс мероприятий, направленных на:

регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики
меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
*предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи

Цвет кислородных баллонов:

серый
черный
белый
*голубой

Признак желудочного кровотечения:

изжога
*рвота в виде кофейной гущи
рвота пищей, съеденной накануне
отрыжка

Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают:

кишечные инфекции
*гнойно-септические инфекции
инфекции кожных покровов
инфекции мочевыводящих путей

Планированием семьи занимаются:

*центры планирования семьи
смотровые кабинеты поликлиник
родильные дома
врач-гинеколог участковый

Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает использование:

пишущих машинок
ведение картотеки
*медицинских информационных систем (МИС)

прошнурованных журналов

Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:

*вирусный гепатит В

дизентерия

сальмонеллез

холера

Учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту, называется:

*тахикардией

брадикардией

асистолией

гипертонией

К проявлению климактерических признаков у женщины относится:

боль в животе

*нарушение менструального цикла

снижение аппетита

увеличение веса

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:

фунгицидное

бактериостатическое

вирулицидное

*бактерицидное

Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются:

только стерилизации

*дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

только дезинфекции

только предстерилизационной очистке