Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело»

для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации

«Сестринское дело при инфекциях»

1.Возможные механизмы передачи возбудителя инфекции:
А) фекально-оральный
Б) трансмиссивный
В) воздушно-капельный
Г) вертикальный
2. Факторы передачи возбудителя инфекции:
А) вода
Б) воздух
В) членистоногие
3.Перечислите звенья эпидемиологического процесса:
А) источник инфекции
Б) механизм передачи
В) восприимчивое население
Г) животные
4.После перевода инфекционного пациента в инфекционный стационар в очаге проводят:
А) заключительную дезинфекцию
Б) текущую дезинфекцию
В) профилактическую дезинфекцию
5.Цель заключительной дезинфекции:
А) одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней среды
Б) изоляция пациента в отдельную палату
6.Источниками заболевания при брюшном тифе являются:
А) вирусоноситель
Б) бактерионоситель
В) больной человек
Г) животное
7.Брюшной тиф передается:
А) половым путем
Б) воздушно-капельным путем
В) контактно-бытовым путем
Г) водным путем
Д) алиментарным путем
8.Инкубационный период при брюшном тифе:
А) несколько часов
Б) от 7 дней до 21 дня
В) от 2 до 5 дней
9.Сыпь характерная для брюшного тифа:
А) пятнисто-папулезная
Б) геморрагическая
В) розеолезная
10.Очаг брюшного тифа наблюдается:
А) 15 дней
Б) 25 дней
В) 21 день
Г) 7 дней
11.Основные симптомы ботулизма:
А) птоз
Б) кишечное кровотечение
В) гнусавость голоса
Г) жидкий стул
12.Возбудителем дизентерии является:
А) сальмонелла
Б) коринебактерия
В) вирус
Г) шигелла
13.Дизентерия передается:

А) трансмиссивным путем
Б) контактно-бытовым путем
В) путем
14.При сальмонеллезе стул:
А) жидкий, скудный
Б) жидкий, водянистый, обильный
В) жидкий, зеленого цвета
Г) жидкий, имеющий вид мясных помоев
15.Вирусный гепатит А передается путями:
А) воздушно-капельным
Б) парентеральным
В) контактно-бытовым
Г) алиментарным
Д) трансмиссивным
16.Вирусный гепатит В передается путями:
А) воздушно-капельным
Б) парентеральным
В) контактно-бытовым
Г) половым
Д) алиментарным
17.Вирусный гепатит С передается путями:
А) парентеральным
Б) контактно-бытовым
В) половым
Г) воздушно-капельным
18.Очаг вирусного гепатита А наблюдается:
А) 21 день
Б) 35 дней
В) 6 месяцев
Г) 7 дней
19.Длительность вирусоносительства ВИЧ:
А) не более 15-30 дней
Б) до нескольких месяцев
В0 до нескольких лет
Г) пожизненно
20.Пути передачи ВИЧ-инфекции:
А) трансмиссивный
Б) парентеральный
В) перинатальный
Г) половой
21.Риск профессионального заражения при контакте с ВИЧ – инфицированным пациентом при:
А) уколе иглой
Б) порезе острорежущим предметом
В) попадании на верхние дыхательные пути
22.Причина иммунодефицитного состояния при ВИЧ-инфекции заключается в:
А) поражении В-клеток
Б) поражении Т-клеток
В) поражении эритроцитов
23.Причины, обуславливающие развитие оппортунистических заболеваний, приводящих больного к смерти:
А) снижение иммунитета
Б) лейкоцитоз
В) лимфоцитоз
24.Источник инфекции при краснухе:
А) больной человек
Б) носитель
В) животное
25.Осложнения при кори:
А) пневмония
Б) стеноз гортани
В) неврит
26.Инкубационный период при кори:
А) 9-17 дней

Б) 21 день
В) 10 дней
27.Пятна Филатова – Коплика характерны для:
А) кори
Б) скарлатины
В) ветряной оспы
28.Возбудителем краснухи является:
А) вирус
Б) бактерии
В) простейшие
29.Пути передачи инфекции при краснухе:
А) воздушно-капельный
Б) парентеральный
В) контактно-бытовой
Г) трансплацентарный
30.Инкубационный период при краснухе:
А) 7 дней
Б) 10 дней
В) 11-21 день
31.Ветряной оспой чаще болеют:
А) дети
Б) взрослые
32.Путь передачи при ветряной оспе:
А) воздушно-капельный
Б) контактно-бытовой
33.Ангина характерна для:
Б) скарлатины
В) менингококковой инфекции
Г) кори
34.Источники инфекции при скарлатине:
А) больной человек
Б) носитель
В) животное
35.Основной путь заражения при скарлатине:
А) воздушно-капельный
Б) воздушно-пылевой
В) трансмиссивный
36.Характер сыпи при скарлатине:
А) мелкоточечная
Б) розеолезная
В) пятнистопапулезная
37.Характерный признак эпидпаротита:
А) припухлость околоушных желез
Б) ангина
В) сыпь
38.Характерный симптом коклюша:
А) приступообразный спазматический кашель
Б) сыпь
В) жидкий стул
39.Для профилактики гриппа используется:
А) вакцина
Б) сыворотка
В) иммуноглобулин
40.Неотложные состояния возникающие при гриппе:
А) острая дыхательная недостаточность
Б) острая сердечно-сосудистая недостаточность
В) легочное кровотечение
41.Длительность инкубационного периода при гриппе:
А) 1-10 дней
Б) от 12-24 часов – до 5 дней
В) 2-7 дней
42.Источниками при менингококковой инфекции являются:

А) больной человек
Б) больное животное
В) бактерионоситель
43.Опасные осложнения при менингококковой инфекции:
А) инфекционно-токсический шок
Б) острый отек и набухание головного мозга
В) сердечно-сосудистая недостаточность
44.Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет:
А) 1-5 дней
Б) 3 дня
В) 21 день
Г) до 10 дней
45.Источники инфекции при дифтерии:
А) больной человек
Б) бактерионоситель
В) больное животное
46.Пути заражения дифтерией:
А) воздушно-капельный и парентеральный
Б) парентеральный и контактно-бытовой
Б) контактно-бытовой и воздушно –капельный
47.Бруцеллез – это:
А) антропоноз
Б) зооноз
48.Источниками заболевания при бруцеллезе являются:
А) птицы
Б) крупный рогатый скот
В) свиньи
Г) больной человек
49.Пути передачи при бруцеллезе:
А) трансмиссивный
Б) парентеральный
В) алиментарный
Г) контактный
50.Длительность инкубационного периода при бруцеллезе:
А) 15-30 дней
Б) 7-10 дней
В) 6 месяцев
51.Источник инфекции при туляремии:
Б) грызуны
В) человек
52.Наиболее часто из клинических форм туляремии встречается:
А) гландулярная
Б) легочная
В) абдоминальная
Г) генерализованная
53.Лихорадка при туляремии длится до:
А) 1месяца
Б) 10 дней
В) 5дней
54.Курс лечебно-профилактической иммунизации против бешенства проводится в:
А) травматологических пунктах (кабинетах)
Б) хирургических кабинетах
В) процедурном кабинете
55.При столбняке специфическая профилактика:
А) проводится
Б) не проводится
56.Источником инфекции при сибирской язве является:
А) больное животное
Б) больной человек
57.Больной человек при сибирской язве, эпидемиологическую опасность:
А) не представляет
Б) представляет

58.Рожа начинается:
А) остро
Б) постепенно
59.Для столбняка характерны признаки:
А) тризм
Б) «сардоническая улыбка»
В) дисфагия
60.Основной симптом рожи:
А) появление резкоограниченного участка гиперемии
Б) кашель
В) боли в суставах
Г) одышка
61.Пути заражения при сибирской язве:
А) контактный
Б) трансмиссивный
В) воздушно-капельный
Г) водный
62.При локализованной форме сибирской язвы характерным симптомом является:
А) болезненный карбункул
Б) безболезненный карбункул
63.Длительность инкубационного периода при сибирской язве:
А) 3-8 дней
Б) 15-20 дней
В) 10-12 дней
64.Гидрофобия развивается при:
А) столбняке
Б) бешенстве
В) ящуре
65.Переносчиками чумы являются:
А) блохи
Б) вши
66.Инкубационный период при холере составляет:
А) 5 дней
Б) 7 дней
В0 10 дней
67.Возбудителем описторхоза является:
А) кошачья двуустка
Б) бычий цепень
В) карликовый цепень
68.Заражение описторхозом наступает при употреблении:
А) рыбы
Б) мяса
В) молока
69.Возбудитель аскаридоза относится к классу:
А) круглых червей
Б) ленточных червей
70.При гельминтозах наблюдаются изменения крови:
А) эозинофилия
Б) моноцитоз
В) лимфоцитоз
71.Возбудителем энтеробиоза является:
А) острицы
Б) аскариды
В) бычий цепень
72.Источником инфекции при малярии являются:
А) больной человек
Б) паразитоноситель
В) комары
73.При малярии исследуются:
А) толстая капля крови
Б) мочи
В) кал

74.Болезнь Бриля развивается после перенесенного:
А) эпидемического сыпного тифа
Б) брюшного тифа
75.Для забора материала от больного на бактериологическое исследование используется:
А) стерильная посуда
Б) нестерильная посуда
76.Согласно рекомендациям ВОЗ к катастрофам относятся чрезвычайные ситуации с одномоментным возникновением:
А) более 10 пораженных
Б) более 20 пораженных
В) более 50 пораженных
Г) 5 пораженных
77.К формированиям экстренной медицинской помощи относится:
А) бригада скорой медпомощи
Б) санитарные посты
В) санитарные дружины
Г) бригады экстренной медицинской помощи
Д) передвижные госпитали
78.Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных при чрезвычайных ситуациях осуществляется:
А) в 2 этапа
Б) в 3 этапа
В) в 4 этапа
Г) одномоментно
79.После перенесенной скарлатины иммунитет:
А) стойкий
Б) нестойкий
80.Специфическая профилактика ветряной оспы:
А) проводится
Б) не проводится
81.Неотложные первоочередные мероприятия при лечении ботулизма включают:
А) промывание желудка
Б) введение противоботулинической сыворотки
В) жаропонижающие
Г) витамины
82.Боли в животе при дизентерии носят:
А) разлитой характер
Б) **схваткообразный характер**
83.Боли в животе при сальмонеллезе локализуются чаще:
А) в левой подвздошной области
Б) **в околопупочной области**
84.Сыпь при ветряной оспе чаще появляется на:
А) 1 день болезни
Б) 2 день болезни
В) 3 день болезни
85.Сыпь при менингококцемии появляется на:
А) 1 сутки заболевания
Б) 2 сутки заболевания
В) 3 сутки заболевания
86.Осложнения при геморрагической лихорадке с почечным синдромом:
А) инфекционно-токсический шок
Б) кровоизлияние в надпочечники
В) разрыв почки
Г) сенсорная глухота
87.Наиболее частое осложнение после перенесенной рожи:
А) артрит
Б) лимфостаз
В) гастрит
88.Основной симптом при боррелиозе:
А) мигрирующая эритема
Б) желтуха
В) одышка
89.Основные симптомы при клещевом энцефалите:

А) головная боль
Б) лихорадка
В) судороги
Г) катаральный синдром
90.Инфузионная терапия при холере включает:
А) гемодез
Б) полиионные растворы
В) иммунноглобулины
91.Медсестры кабинета инфекционных заболеваний проводят:
А) взятие материала у больного
Б) обучение родственников уходу за больным
В) посещение оставленных на дому больных
Г) лечение больного
92. Лечебные инфекционные отделения формируются:
А) по нозологическому принципу
Б) с учетом механизма передачи инфекции
В) по тяжести заболевания
93.Госпитализации подлежат больные с:
А) особо опасными инфекциями
Б) инфекциями
В) головным педикулезом
94.В очаге брюшного тифа обследуются:
А) все контактные
Б) декретированная группа
95.Вариант преджелтушного периода, наиболее часто встречаемый при гепатите В:
А) гриппоподобный
Б) диспептический
В) артралгический
96. Вариант преджелтушного периода, наиболее часто встречаемый при гепатите А:
А) гриппоподобный
Б) артралгический
В) диспептический
97. Очаг вирусного гепатита В наблюдается:
А) 35 дней
Б) 21 день
В) 6 месяцев
Г) 1 год
98.Специфическая профилактика проводится при вирусном гепатите:
А) В
Б) С
В) Д
Г) Е
99. Лицензирование медицинского учреждения означает:
А) определение видов и объема медицинской помощи в ЛПУ
Б) выдачу документов на право заниматься определенным видом лечебно- профилактической деятельности
В) определение соответствия качества медицинской помощи установленным стандартам
Г) оценку степени квалификации медицинского персонала
100. Документ, являющейся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при
А) бюджетно-страховой медицине:
Б) паспорт
В) страховой полис
Г) медицинская карта амбулаторного больного
Д) медицинская карта стационарного больного
101.Система оказания помощи инфекционным больным включает следующие этапы:
А) первичное звено (врач общей практики, врач скорой помощи)
Б) кабинет инфекционных заболеваний
В) специализированный инфекционный стационар
Г) терапевтический стационар
102.Стремительно развивающийся шок:
А) травматический
Б) геморрагический

В) анафилактический
Г) гемотрансфузионный
103.Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь:
А) голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперёд нижней челюсти
Б) закрыть нос пострадавшему
В) сделать пробное вдувание воздуха
Г) нажать на грудину
104.К абсолютным признакам перелома костей относится:
А) боль в месте перелома
О) ограничение движений в суставах
В) патологическая подвижность кости
Г) наличие гематомы
105.Признак артериального кровотечения:
А) медленное вытекание крови из раны
Б) темно-вишнёвый цвет крови
В) сильная пульсирующая струя крови
Г) образование гематомы
106.Показание к наложению жгута:
А) венозное кровотечение
Б) артериальное кровотечение
В) внутреннее кровотечение
Г) кровотечение в просвет полого органа
107.Окклюзионную повязку накладывают при:
А) закрытом переломе ребер
Б) открытом переломе ребер
В) ушибе грудной клетки
Г) переломе ключицы
108.Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:
А) начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока
Б) освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию
В) закопать пострадавшего в землю
Г) облить водой
109.Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:
А) наложение жгута
Б) тампонада раны
В) тугая давящая повязка
Г) закрутка
110.До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно:
А) поставить очистительную клизму
Б) положить на живот горячую грелку
В) положить на эпигастрий пузырь со льдом
111.Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой:
А) 12 градусов С
Б) 18-20 градусов С
В) 24-36 градусов С
112.Неотложная помощь при ожогах:
А) анальгин
Б) асептическая повязка
В) обильное питье
Г) димедрол
Д) грелка
113.Непрямой массаж сердца проводится:
А) на границе верхней и средней трети грудины
Б) на границе средней и нижней трети грудины
В) на 1см выше мочевидного отростка
114.При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть:
А) 1-2 см
Б) 2-4 см
В) 4-5 см
Г) 6-8 см

115. Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт:
А) промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь
Б) вызывать рвоту
В) дать слабительное
Г) поставить клизму
116 Адсорбент, применяемый при отравлениях:
А) раствор крахмала
Б) раствор сернокислой магнезии
В) активированный уголь
117.Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца:
А) освободить пострадавшего от действия тока
Б) выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца
В) инъекция адреналина
Г) дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи
118.Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является:
А) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи
Б) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза
В) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
Г) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи
119.Неотложная помощь при приступе стенокардии:
А) обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг, контроль АД
Б) измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг
В) измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50% - 2 мл
120.Во время коллапса кожные покровы:
А) бледные, сухие, теплые
Б) бледные, влажные, прохладные
В) гиперемированные, сухие
Г) гиперемированные, влажные
121.Обморок – это:
А) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
Б) аллергическая реакция
В) потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса
122.Показателями эффективной реанимации являются:
А) появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет
Б) расширенные зрачки
В) правильный массаж сердца
123.Тройной прием по Сафару включает:
А) поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову
Б) освобождение от стесняющей одежды области шеи
В) отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта
124.Противопоказанием для проведения реанимации является:
А) инсульт
Б) неизлечимое заболевание в терминальной стадии
В) инфаркт миокарда
125.Признаками клинической смерти являются:
А) нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание
Б) потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз
В) потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков
Г) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии
126.Терминальные состояния - это:
А) обморок, коллапс, клиническая смерть
Б) предагония, агония, клиническая смерть
В) агония, клиническая смерть, биологическая смерть
127.Для перелома основания черепа характерен симптом:
А) "очков"
Б) Кернига
В) Брудзинского
128.Обязательными условиями при проведении непрямого массажа сердца является:
А) наличие твердой поверхности
Б) положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины
В) наличия валика под лопатками
Г) наличие двух реанимирующих

129.К методам временной остановки кровотечения относятся
А) перевязка сосуда в ране
Б) перевязка сосуда на протяжении
В) наложение кровоостанавливающего жгута
Г) форсированное сгибание конечностей
130. Пути передачи ВИЧ-инфекции:
А) половой путь
Б) парентеральный путь
В) вертикальный путь
Г) воздушно-капельный путь
Д) фекально-оральный путь
131.Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции:
А) половой
Б) вертикальный
В) трансфузионный
132.Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции:
А) трансфузионный
Б) при употреблении в/в наркотиков
В) через медицинсекие отходы, не прошедшие дезинфекцию
Г) аэрогенный
133.При сборе медицинских отходов запрещается:
А) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)
Б) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции
В) собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов
Г) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов
134.Для обработки рук перед выпонением инъекции можно использовать:
А) 70% этиловый спирт
Б) одноразовые спиртовые салфетки
В) «Октенисепт»
Г) раствор хлормисепта 0,5%
135.Дезиконт (индикаторные полоски) используют для:
А) определения концентрации дезинфицирующего средства
Б) определения неправильно приготовленного дезинфицирующего раствора
В) определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды
136.Кожный антисептик применяют для :
А) гигиенической обработки рук
Б) после приготовления пищи
В) хирургической обработки рук
137.Сбор отходов класса А осуществляется в:
А) многоразовые емкости
Б) одноразовые пакеты белого цвета
В) одноразовые пакеты желтого цвета
Г) одноразовые пакеты красного цвета
138.Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) осуществляется в:
А) одноразовые пакеты белого цвета
Б) одноразовые пакеты желтого цвета
В) одноразовые пакеты красного цвета
139.Утилизация медицинских отходов проводиться согласно:
А) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
Б) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»
В) СанПиН 2.1.7.28-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ»
140.Инструктаж работников осуществляющих уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки необходимо проводить:
А) 1 раз в год
Б) 2 раза в год
В) при приеме на работу
Г) при приеме на работу и потом 1 раз в год

141.ВИЧ-инфекция не передается при:
А) рукопожатии
Б) использовании одного шприца, несколькими лицами
В) кашле, чихании
Г) пользовании туалетами или душевыми
Д) укусах комаров или других насекомых
142.ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги
А) должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе
Б) не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе
143.На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно:
А) беременные женщины
Б) больные с поражениями легких
В) больные парентеральными вирусными гепатитами
Г) доноры крови и органов
144.Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
А) металла
Б) хлопчатобумажной ткани
В) стекла
Г) силиконовой резины
145.«Дезинфекция» – это
А) уничтожение патогенных микроорганизмов
Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
В) уничтожение грибков
Г) уничтожение вирусов
146.Для стерилизации применяются средства, обладающие:
А) бактериостатическим действием
Б) вирулицидным действием
В) спороцидным действием
Г) фунгицидным действием
147. «Стерилизация» – это
А) уничтожение патогенных бактерий
Б) уничтожение микробов на поверхности
В) уничтожение инфекции
Г) освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение
148.Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:
А) по профилактике экзогенных интоксикаций
Б) направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
В) по профилактике внутрибольничной инфекции.
149.Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом биксе со штатным фильтром:
А) 3 суток
Б) 20 суток
В) 30 суток
150.Права пациента:
А) на выбор врача и медицинской организации
Б) выбор палаты в медицинской организации
В) на получение информации о своих правах и обязанностях
Г) на получение информации о состоянии своего здоровья
Д) на отказ от медицинского вмешательства
151.Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:
А) конституцию РФ
Б) ФЗ об основах охраны здоровья граждан
В) арбитражное право
Г) ФЗ о системе государственной службы РФ
152.Понятие "врачебная тайна" предусматривается:
А) трудовым кодексом
Б) конституцией РФ
В) законом об адвокатской деятельности
Г) **ФЗ об основах охраны здоровья граждан**
Д) законом о полиции
153.Права медицинского работника:

А) на условия выполнения своих трудовых обязанностей
Б) бесплатного проезда в общественном транспорте
В) на совершенствование профессиональных знаний
Г) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя
154.Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:
А) сообщение на предыдущее место работы
Б) заключение трудового договора
В) получение должностных инструкций
Г) внесение записей в трудовую книжку
Д) выдача справки о месте работы