

Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии»

Разъяснения: *Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться!*

Частота дыхательных движений у здорового ребенка 5-ти лет составляет (в мин.):

- *20-25
- 30-35
- 16-18
- 40-60

Окружность головы у здорового доношенного новорожденного составляет в среднем (см):

- 28-30
- *34-36
- 30-32
- 40-42

Нормой для ребенка в возрасте одного года является:

- окружность головы 40 см
- *закрытый большой родничок
- масса тела 8,0 кг
- рост 65 см

Максимальный объем лекарственного препарата при внутримышечном введении недоношенному новорожденному с массой тела менее 1500 грамм составляет (мл):

- 0,1
- *0,5
- 2
- 1

Собранные образцы крови для проведения неонатального скрининга хранят при температуре (°C):

- 0-1
- 18-20
- 10-12
- *2-8

При оценке эффективности ИВЛ у новорожденного подсчет частоты сердечных сокращений осуществляется в течение (сек.):

- *6
- 20
- 3
- 12

Датчик пульсоксиметра новорожденному с очень низкой массой тела присоединяют:

- к левому запястью
- *к правому запястью
- на левую щиколотку
- на правую щиколотку

При ожидающихся преждевременных родах температура воздуха в родильном зале должна составлять (°C):

- 22
- 24
- 30
- *26

Срок хранения пастеризованного грудного молока в холодильнике составляет не более (час.):

- *12
- 6

18

24

Сведения о диспансерном наблюдении несовершеннолетнего вносятся в учетную форму:

030-ПО/у-17

*030/у

030-ПО/у-13

030-ПО/0-17

При проведении антропометрических исследований используют:

шагомер

секундомер

*весы

динамометр

Для стимуляции регулярного дыхания и предотвращения апноэ у новорожденных с низкой массой тела используют:

порактант альфа

эпинефрин

*кофеин-бензоат натрия

преднизолон

Рекомендуемая численность прикрепленных детей на педиатрическом участке составляет (чел.):

900

*800

1200

700

Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони у новорожденного являются признаками:

фенилкетонурии

*болезни Дауна

галактоземии

муковисцидоза

Температура воздуха в палате для недоношенных новорожденных составляет (°С):

18

*24

28

22

Среднее физиологическое снижение массы тела доношенного новорожденного составляет от массы тела при рождении (%):

1-2

14-18

12-15

*6-8

Персонал медицинской организации, не иммунизированный против гепатита В допускается к работам по обращению с медицинскими отходами:

*только класса А

любого класса

класса А,Б и В

только класса Б

Кислород при проведении ИВЛ новорожденному с респираторным дистресс- синдромом подогревают до температуры (°С):

32

*37

34

40

Исследование слуха у новорожденного при проведении аудиологического скрининга проводится после кормления через:

- 3 часа
- *1 час
- 4 часа
- 2 часа

Сеанс массажа здоровому ребенку начинается с:

- разминания
- *поглаживания
- растирания
- вибрации

К лекарственным препаратам для лечения артериальной гипертензии группы ингибиторов АПФ относятся:

- валсартан
- пропранолол
- *рамприл
- амлодипин

У детей, больных муковисцидозом, в поте содержится большое количество ионов:

- *натрия
- железа
- калия
- кальция

Здоровые несовершеннолетние, имеющие некоторые функциональные нарушения, относятся к группе здоровья:

- *2
- 3
- 5
- 1

Обучение гигиеническим навыкам детей в возрасте 2-3 лет проводится в виде:

- *игры
- беседы
- лекции
- урока

Минимальная кратность уборки туалетов с применением дезсредств в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей составляет:

- два раза в неделю
- один раз в день
- один раз в два дня
- *два раза в день

При измерении окружности головы грудного ребенка мягкая сантиметровая лента сзади должна проходить:

- чуть выше затылка
- *через наиболее выступающую часть затылка
- чуть ниже теменных бугров
- под затылком

Продуктом с низким содержанием фенилаланина является:

- говядина
- говядина
- *капуста
- сыр

Количество молочных зубов у ребенка в один год:

- 6
- *8
- 10

Уровень глюкозы в крови определяют:

- *утром, натощак
- через 2 часа после еды
- через 1 час после еды
- сразу после еды

Третья вакцинация против вирусного гепатита В здоровым детям проводится в возрасте (мес.):

- *6
- 8
- 8
- 12

Медицинское наблюдение за привитыми осуществляется в течение (мин.):

- 5
- 15
- *30
- 40

Для заправки салатов в столовой образовательной организации допускается использовать:

- *лимонный сок
- майонез
- сметана
- уксус

Данные о проведении профилактического осмотра несовершеннолетнего вносятся в учетную форму:

- *030-ПО/у-17
- 030-ПО/у-12
- 030-ПО/о-17
- 030-ПО/о-17

Зимние прогулки с новорожденным допускаются при температуре воздуха не ниже (°C):

- *-10
- 15
- 0
- 20

Второй уровень оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, представлен:

- региональным центром медико-социальной помощи
- *межмуниципальными отделениями медико-социальной помощи
- кабинетами медико-социальной помощи
- отделениями медико-социальной помощи

При выполнении внутривенной инъекции игла вводится под углом (°):

- *10
- 90
- 45
- 25

При отравлении метанолом в качестве антидота используется:

- налоксон
- *этанол
- атропин
- унитиол

Минимальный срок исключения из рациона питания ребенка продукта, вызвавшего пищевую аллергию легкой степени, составляет:

- 6 недель
- 3 месяца
- *6 месяцев
- 3 недели

Температура воды для постановки очистительной клизмы при спастических запорах составляет (°C):

*37-38

23-25

20-25

16-20

Специфическим осложнением брюшного тифа является:

*кишечное кровотечение

гипертермия

судороги

инфекционно-токсический шок

Источником инфекции при антропонозных заболеваниях является:

насекомое

птица

*человек

животное

Перед введением любого лекарственного средства медицинская сестра должна обязательно:

подогревает лекарственное средство

проводит пробу на наличие аллергической реакции

разводит лекарственное средство физиологическим раствором

*проверяет срок годности

Прием препарата «Алмагель» при язвенной болезни осуществляется:

*за полчаса до приема пищи

за два часа до приема пищи

сразу после еды

во время еды

Для использованных инъекционных игл медицинская сестра должна приготовить:

мешок желтого цвета

мешок красного цвета

бумажный контейнер

*непрокальываемый контейнер

В состав материального обеспечения выполнения любой инъекции обязательно входит:

жгут венозный

*кожный антисептик

подушечка из влагостойкого материала

стойка-штатив

В медицинской организации для своевременного выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводится:

*мониторинг медико-социального благополучия детей

реализация индивидуальных комплексных программ

разработка индивидуальных комплексных программ

санитарно-гигиеническое просвещение

Адекватным методом контроля за эффективностью и безопасностью гипотензивной терапии является:

подсчет пульса утром и вечером

измерение АД утром и вечером

*суточное мониторирование АД

регистрация ЭКГ

При обмороке ребенку придают положение:

полусидя

*с приподнятым ножным концом

горизонтальное

с приподнятым головным концом

Медицинские работники, допущенные к взятию и посеву материала на дифтерию, проходят инструктаж в баклаборатории, осуществляющей исследования на дифтерию, не реже, чем:

- 1 раза в полгода
- 1 раза в месяц
- *1 раза в год
- 3 раз в год

Детям до 3-х лет для промывания желудка используют:

- раствор глюкозы
- раствор перманганата калия
- *раствор хлорида натрия
- воду

Курареподобный эффект при отравлении фосфорорганическими соединениями проявляется:

- гиперкинезами
- клоническими судорогами
- гиперсаливацией
- *периферическими параличами

Преобладание ночного диуреза над дневным называется:

- *никтурия
- ишурия
- полиурия
- поллакиурия

Автор метода определения чувствительности организма к введению чужеродного белка:

- Пастер
- Мечников
- Нечипоренко
- *Безредка

Основной причиной развития сердечной недостаточности у детей является:

- инфекционный эндокардит
- *врожденный порок сердца
- гипертоническая болезнь
- инфекционный миокардит

При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие:

- *эмболии
- флегмоны
- кровотечения
- спазма сосуда

К мочегонным препаратам относится:

- фуразолидон
- фурагин
- фурадонин
- *фуросемид

Основным элементом электронной таблицы является:

- *ячейка
- лист
- строка
- столбец

При проведении медицинской сортировки пострадавший в состоянии средней степени тяжести обозначается сортировочной маркой:

- *желтого цвета
- черного цвета
- зеленого цвета
- красного цвета

Для профилактики отека мозга при гипогликемической коме вводят:

нитроглицерин

инсулин

глюкозу

*маннитол

Статистическому учету подлежат все новорожденные при достижении ими 168 часов жизни, родившиеся с массой от (гр.):

400

750

1000

*500

Абсолютным противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери является прием лекарственного препарата:

апилак

бифиформ

витамина Д

*метотрексат

Методика непрерывного положительного давления в дыхательных путях, в качестве самостоятельного метода респираторной поддержки новорожденного с очень низкой массой тела, применяется в случае:

отсутствия регулярного спонтанного дыхания

частоты сердечных сокращений менее 100 в мин

частоты сердечных сокращений менее 60 в мин

*гестационного возраста 27-32 недели

Расширенный объем мероприятий по профилактике гипотермии проводится недоношенным новорожденным при гестационном возрасте:

*28 недель

24 недели

26 недель

25 недель

Мониторинг оксигенации крови недоношенных новорожденных в родильном зале осуществляется:

капнографом

калориметром

*пульсоксиметром

спирометром

Дезинфекцию кувезов проводят дезсредствами, содержащими:

*кислород

альдегиды

хлор

фенолы

Показанием к проведению непрямого массажа сердца у новорожденных является частота сердечных сокращений менее (уд. в минуту):

*60

90

100

80

При третьей степени недоношенности масса тела новорожденного составляет (гр.):

1501-2000

менее 1000

2001-2500

*1001-1500

Оценка по шкале Апгар в 5 баллов свидетельствует о степени асфиксии новорожденного:

*умеренной

тяжелой

легкой
очень тяжелой

Задержка физического и психического развития у детей, родившихся в асфиксии, связана с нарушением функций:

*центральной нервной системы
почек
почек
легких

К родовой травме относят:

гемолитическую болезнь новорожденного
*кефалогематому
физиологическую эритему
бронхолегочную дисплазию

При переломе ключицы у новорожденного, его следует уложить на:

живот
спину
*здоровый бок
бок со стороны перелома

Характерной особенностью мышечной системы недоношенных детей является:

*мышечная гипотония
обычный мышечный тонус
гипертонус мышц разгибателей
гипертонус мышц сгибателей

При наличии у ребенка с сердечной патологией отеков, медицинская сестра порекомендует:

ограничить прием белков и жиров
*ограничить прием жидкости и соли
увеличить прием жидкости и соли
увеличить прием белков и жиров

Основным препаратом в лечении дифтерии является:

вакцина
глобулин
*сыворотка
глюкокортикоиды

Кал для бактериологического исследования доставляют в лабораторию после забора материала не позднее:

1 часа
*2 часов
3 часов
4 часов

При атопическом дерматите у детей до 1,5 лет типичным является поражение кожи:

спины
*разгибательных поверхностей конечностей
сгибательных поверхностей конечностей
живота

Медицинская организация для оказания паллиативной специализированной медицинской помощи детям в стационарных условиях:

*хоспис
врачебная амбулатория
ФАП
детская поликлиника

Тампоны с материалом, взятым у пациента с дифтерией, должны быть доставлены в лабораторию не позднее, чем через (час.):

1

2
*3
5

Конкрементом инфекционного генеза при развитии мочекаменной болезни у детей являются:

*фосфаты магния
оксалаты кальция
мочевая кислота
фосфаты кальция

Для подтверждения диагноза острого лейкоза проводится:

*стерильная пункция
биохимический анализ крови
УЗИ селезенки
УЗИ печени

Осложнение при ингаляционном применении глюкокортикоидов:

*кандидоз полости рта
язва желудка
артериальная гипертензия
мышечная слабость

От ребенка с гипергликемической комой чувствуется запах:

«мышинный»
сладковатый
* ацетона
аммиака

Противопоказание к лечению средствами кинезотерапии в педиатрии:

болезнь Дауна
*кровотечение
парезы
детский церебральный паралич

К генетическим причинам высокого риска развития мочекаменной болезни у детей относится:

*цистинурия
дивертикул чашечки
уретероцеле
стриктура мочеточника

Ранним симптомом ретинобластомы у детей является:

*косоглазие
задержка роста
энофтальм
повышение температуры

Основным клиническим проявлением бронхиальной астмы является:

инспираторная одышка
одышка смешанного характера
одышка смешанного характера
*приступ удушья с затрудненным выдохом

Уровень общего билирубина при гепатите В средней степени тяжести составляет:

80-100
200-250
*100-170
170-200

Обезболивающий препарат вводится детям:

в зависимости от состояния ребенка
по просьбе родителей
*через определенные интервалы времени

один раз в сутки

Материал из ротоглотки и носа для бактериологического исследования на наличие возбудителя дифтерии берется натошак или после еды, не ранее чем через:

1 час
*2 часа
3 часа
4 часа

При отсутствии жалоб и изменений со стороны внутренних органов, пациенты, перенесшие вирусный гепатит В снимаются с учета с момента выздоровления не ранее чем через:

1 год
3 месяца
*6 месяцев
2 года

Полиморфная сыпь (пятно, папула, везикула) наблюдается у пациента в период разгара инфекционного заболевания:

корь
*ветряная оспа
скарлатина
краснуха

Появление водобоязни, возбуждения, является одним из признаков:

коклюша
дифтерии
*бешенства
столбняка

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается проводить в отношении:

несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
*лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами
лица, не достигшего 15 летнего возраста
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

Документ, удостоверяющий определенный факт, событие или действие в организации:

протокол
приказ
справка
*акт

При отморожении кисти накладывают повязку:

крестообразную
восьмиобразную
*«варежка»
спиральную

Назначение Джозамецина детям показано, если острый бронхит вызван:

риновирусом
ротавирусом
вирусом парагриппа
*хламидиями

Чашки, стаканы, бокалы в столовой ополаскивают водой температурой не ниже (°C):

45
80
*65
50

Вакцины в течение рабочего дня прививочной бригады хранятся:

в обычной медицинской сумке

в шкафу процедурного кабинета
*в специальном холодильнике
на процедурном столе

Вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита детям, относящимся к группам риска, проводится вакциной:

ассоциированной
живой
комбинированной
*инактивированной

В анализе мочи при сахарном диабете может определяться:

билирубин
белок
*ацетон
уробилин

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детям в возрасте 6 лет проводится:

третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
*ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
третья ревакцинация против полиомиелита

Нормой для ребенка в возрасте 7 дней является:

*длительный сон
мышечная гипотония
длительное бодрствование
обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

Влажная уборка кабинета иммунопрофилактики проводится:

через день
один раз в день
*два раза в день
один раз в неделю

Первый этап профилактического медицинского осмотра юношей включает:

осмотр педиатра
* скрининг-тесты
инструментальное обследование
лабораторное обследование

К третьей группе здоровья, по результатам профилактического осмотра, относятся несовершеннолетние:

здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие
реконвалесценты, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания
*страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии
с физическими недостатками с выраженным нарушением функций органов и систем

Ревакцинация против пневмококковой инфекции проводится в возрасте:

20 месяцев
*15 месяцев
18 месяцев
одного года

В качестве первого прикорма для ребенка с нормальным весом предпочтительнее назначать:

*овощное пюре
творог
кефир
молочную кашу

До двухлетнего возраста у ребенка отмечается дыхание:

брюшное

*диафрагмальное
грудное
диафрагмально-грудное

Инкубационный период при кори длится (дни):

35-36
*7-21
5-7
5-14

Неонатальный скрининг проводится ребенку при отсутствии сведений о его проведении в родильном доме в возрасте до (мес.):

2
3
4
*1

Суточный объем питания для детей в возрасте 6 месяцев составляет(мл):

1500
500
*1000
200

Медицинская сестра кабинета здорового ребенка проводит прием детей второго года жизни не менее:

3 раз в год
2 раз в месяц
5 раз в год
*4 раз в год

К чрезвычайно эпидемиологически опасным отходам относятся:

*отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование
пищевые отходы из инфекционных отделений
отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными

Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения от крови проверяют пробой:

судановой
лакмусовой
*азопирамовой
фенолфталеиновой

Раствор натрия гидрокарбоната при проведении первичной реанимации новорожденному вводится внутривенно из расчета (мл на кг веса):

1
*4
2
8

Признаком травмы верхне-шейного отдела позвоночника у новорожденного является:

отсутствие движения в одной кисти
вялое свисание руки
спазм мышц нижних конечностей
*поперхивание при глотании

Чаще всего омфалит у новорожденного в медицинских организациях родовспоможения вызывает:

пневмококк
*золотистый стафилококк
кишечная палочка
протей

Оптимальным временем первого прикладывания здорового доношенного новорожденного к груди является:
вторые сутки

первые сутки
*первые 30 минут
первые 12 часов

Для очищения носовых ходов у новорожденного используют:

марлевые салфетки
*ватные жгутики
палочки с ватой
пинцет с ватным шариком

К препаратам сурфактанта относятся:

*пороконтант альфа
дексаметазон
эпинефрин
преднизолон

Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение подряд:

3 часов
2 часов
*4 часов
5 часов

Для оценки физического развития детей применяют:

круговые диаграммы
индекс массы тела
*перцентильные диаграммы
индекс Брока

К критериям стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей с артериальной гипертензией относят:

частые респираторные заболевания
высокую физическую активность
*ожирение
заболевания ЖКТ в анамнезе

Профилактическая доза витамина Д в сутки составляет (МЕ):

1000
200
800
*500

Основанием для прекращения диспансерного наблюдения детей является:

достижение частичной компенсации физиологических функций хронического заболевания
обострение хронического заболевания не чаще 1 раза в год
обострение хронического заболевания не чаще 2 раз в год
*достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания

Средняя частота сердечных сокращений у здорового ребенка 10 лет составляет (уд. в мин.):

90
70
*85
100

Ребенку в возрасте 1,5 лет можно применять антигистаминный препарат:

лоратадин
левоцетиризин
*дезлоратадин
фексофенадин

Внутрикожная аллергическая проба с туберкулином проводится:

один раз в 2 года
ежеквартально

*ежегодно
один раз в три года

Первый профилактический прием в детской поликлинике проводится ребенку в возрасте (мес.):

*1
4
2
3

Основным элементом сыпи при крапивнице является:

пузырек
папула
бугорок
*волдырь

К концу первого года жизни у здорового ребенка должно быть зубов:

6
*8
4
12

Во время профилактического осмотра здорового ребенка 3 лет обязательно проводится дополнительное обследование в виде:

электрокардиографии
нейросонографии
эхокардиографии
*общего анализа крови

Вакцинация против гемофильной инфекции в возрасте 3 месяцев проводится детям:

с физиологической желтухой
с токсической эритемой
*с ВИЧ-инфекцией
здоровым доношенным

Лекарственное вещество, свойства которого направлены на ослабление или прекращение действия яда, называется:

катализатор
реагент
сорбент
*антидот

Алая пульсирующая струя характерна для кровотечения:

смешанного
*артериального
венозного
капиллярного

Перчатки медицинская сестра обязательно надевает перед выполнением процедуры:

измерения артериального давления
*внутримышечной инъекции
измерения пульса
регистрации ЭКГ

К медицинским отходам класса А относятся:

*пищевые отходы соматических отделений
пищевые отходы инфекционных отделений
отходы микробиологических лабораторий
радиоактивные отходы

При гипотиреозе у ребенка в крови повышен уровень гормона:

*тиреотропного
фолликулстимулирующего

соматотропного
адренокортикотропного

При фенилкетонурии в первую очередь поражается:

*головной мозг
мышечная ткань
почки
миокард

Инфекционным заболеванием, при котором сыпь встречается в 10-15% случаев является:

ветряная оспа
*инфекционный мононуклеоз
скарлатина
корь

Основным признаком развивающегося стеноза привратника у детей является:

ноющие боли в эпигастрии
*рвота накануне съеденной пищей
изжога
нарушение стула

Возбудителем инфекционного мононуклеоза является вирус:

Ласса
*Эпштейна-Барра
Коксаки
ЕСНО

К тиазидным диуретикам относится:

буметанид
*индапамид
амилорид
фуросемид

Местом для подкожного введения лекарственного препарата является:

*наружная поверхность плеча
внутренняя поверхность плеча
надлопаточная область
внутренняя поверхность бедра

Одним из проявлений тяжелого течения гриппа у детей является:

острый фарингит
*синдром ДВС
острый ринит
острый трахеит

Мешок Амбу используется:

для предупреждения западения языка
для обеспечения проходимости дыхательных путей
*при искусственной вентиляции лёгких
при оксигенотерапии

Выявление повышенного уровня аминотрансфераз в сыворотке при гепатите является признаком:

холестаза
*цитолита гепатоцитов
нарушения обмена билирубина
внутрипеченочного билистаза

Специфическим антагонистом опиоидных анальгетиков является:

*налоксон
атропин
унитиол
апоморфина гидрохлорид

Состоянием, при котором происходит кратковременная потеря сознания, является:

кома
коллапс
сопор
*обморок

Длительность пребывания в стационаре детей с язвенной болезнью в среднем составляет:

7-14 дней
*14-21 дней
7-10 дней
10-14 дней

Эзофагодуоденоскоп применяется для осмотра слизистой оболочки:

прямой кишки
ободочной и прямой кишки
*пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
мочевого пузыря

Паллиативная первичная доврачебная медицинская помощь оказывается:

врачом-онкологом
врачом-педиатром
врачом-хирургом
*медицинской сестрой

Обильная рвота «фонтаном», снижение массы тела у грудного ребенка является признаком:

эзофагита
перекормливания
пилороспазма
*пилоростеноза

При сахарном диабете в моче выявляется:

*глюкоза
уробилин
белок
билирубин

Отдел ЖКТ, чаще всего поражающийся при шигеллезе:

*сигмовидная и прямая кишка
двенадцатиперстная кишка
желудок
ободочная кишка

Рахит развивается вследствие недостатка витамина:

В
С
*D
А

Методом интракорпоральной детоксикации организма является:

гемодиализ
плазмаферез
гемосорбция
*перитонеальный диализ

При бронхиальной астме мокрота:

жидкая, слизистая,
желто-зеленая, жидкая
*вязкая, стекловидная
пенистая, розовая

Пальцы в виде «барабанных палочек» у ребенка могут быть признаком:

сухого плеврита
острой пневмонии
острого бронхита
*бронхоэктатической болезни

Местом для выполнения внутримышечной инъекции является квадрант ягодицы:

верхний внутренний
нижний наружный
нижний внутренний
*верхний наружный

За лицами, общавшимися с больным эпидемическим паротитом устанавливается медицинское наблюдение с момента выявления последнего случая заболевания в очаге в течение:

7 дней
14 дней
*21 дня
36 дней

Для нормального функционирования щитовидной железы необходимо достаточное поступление с пищей:

фтора
*йода
кальция
натрия

Увеличение задне-шейных лимфатических узлов является признаком:

*краснухи
кори
ветряной оспы
дифтерии

К поствакцинальным осложнениям относится острый:

*миокардит
фарингит
ларингит
бронхит

Наиболее частой причиной артериальной гипертензии у детей в возрасте до одного года является:

*стеноз почечных артерий
узелковый периартериит
эссенциальная артериальная гипертензия
паренхиматозные заболевания почек

Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра несовершеннолетнего является:

*дача информированного добровольного согласия родителей или законного представителя
измерение роста и веса
проведение пробы манту или диаскин теста
оплата медицинских вмешательств

Здорового доношенного ребенка в возрасте трех месяцев купают:

один раз в три дня
один раз в три дня
*ежедневно
один раз в неделю

В «холодовой цепи» следует использовать терморегистраторы, фиксирующие значения температуры с интервалом времени между соседними измерениями не более (мин.):

*1
2
5
10

В группу продуктов, чаще всего вызывающих пищевую аллергию у детей входит:

*коровье молоко
говядина
груша
яблоко

Здоровому новорожденному в возрасте одного месяца обязательно проводится консультация врача:

оториноларинголога
психиатра
травматолога
*невролога

Риск врожденной патологии плода очень высокий в случае заболевания беременной:

ветряной оспой
корью
*краснухой
эпидемическим паротитом

Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья - это:

третичная профилактика
*первичная профилактика
реабилитация
вторичная профилактика

Пробу Манту после любой вакцинации проводят не ранее чем, через:

*1 месяц
20 дней
2 месяца
10 дней

Положение новорожденного с очень низкой массой тела рекомендуется менять через каждые:

6 часов
*3 часа
4 часа
2 часа

Одним из факторов риска развития тугоухости у новорожденного является:

компенсированная гипертензия у матери
анемия легкой степени у матери
многоплодная беременность
*асфиксия новорожденного

К возникновению гемолитической болезни новорожденных приводит:

родовая травма
внутриутробное инфицирование
*резус-конфликт
вирусный гепатит

Прибор для исследования слуха у новорожденного при проведении аудиологического скрининга располагается на расстоянии от уха (см):

5
15
*10
20

При отсутствии сердцебиения у новорожденного, реанимационные мероприятия в родильном зале прекращаются через (мин.):

*10
5
20
15

Самой частой причиной сепсиса у новорожденных является:

омфалит

потница

токсическая эритема

*пузырчатка новорожденных

Препарат сурфактанта вводят из расчета на кг веса новорожденного (мг):

300

350

*200

250

Одной из причин развития хронической внутриутробной гипоксии (со стороны плода) является:

выпадение петель пуповины

предлежание плаценты

*врожденные пороки развития

патология плаценты

Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (недели):

32-34

*38-42

28-30

35-37

Начальная интенсивность шума при проведении аудиологического скрининга у новорожденного составляет

(ДБ):

*90

60

150

50

Неонатальный скрининг проводят для выявления:

*фенилкетонурии

гомоцистинурии

тиреотоксикоза

мукополисахаридоза

Частота сердечных сокращений у здорового доношенного новорожденного составляет (уд. в мин.):

*120-140

170-190

80-100

100-120

Для профилактики бронхолегочной дисплазии у новорожденных с очень низкой массой тела, находящихся на ИВЛ более 7 суток, показано назначение:

натрия хлорида

*дексаметазона

эпинефрина

кофеин-бензоат натрия

В первые недели жизни влажность в инкубаторе для выхаживания детей с очень низкой массой тела необходимо поддерживать на уровне (%):

100

90

*95

85

В состав травяного лактогенного чая может входить:

зверобой

*мелисса

подорожник

ландыш

У недоношенных детей, требующих проведения ИВЛ, оптимальное давление на вдохе определяется:
частотой дыхательных движений
весом новорожденного
*степенью морфо-функциональной зрелости легких
оценкой в баллах по шкале Апгар

Заполнение палаты при совместном пребывании матери и ребенка происходит в течение:
48 часов
*24 часов
72 часов
12 часов

Одним из показателей эффективности оздоровления детей в стационарных организациях отдыха и оздоровления является:
частота сердечных сокращений
*мышечная сила
индекс пикфлоуметрии
частота дыхания

Для определения нарушений температурного режима хранения иммунобиологических лекарственных препаратов применяют:
термографы
термометры
терморегистраторы
*термоиндикаторы

Ребенку в возрасте одного года для лечения аскаридоза назначают:
*пирантел
альбендазол
мебендазол
левамизол

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану называется:
стерилизация
антисептика
дезинфекция
*асептика

Причиной хронической сердечной недостаточности у детей до 1 года чаще всего является:
инфекционный миокардит
*врожденный порок сердца
перикардит
инфекционный эндокардит

Несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, относятся к группе здоровья:
2
3
*5
4

Ко 2 группе здоровья относятся новорожденные:
с гемолитической болезнью
с пренатальной гипотрофией 2 степени
недоношенные
*с риском развития заболеваний

Оздоровительный эффект в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей считается не достигнутым при суммарной оценке показателей (баллы):
10

*6
14
12

Медицинская сестра педиатрического участка посещает ребенка с риском развития патологии нервной системы со второго месяца жизни:

два раза в месяц
*1 раз в месяц
еженедельно
раз в три месяца

Температура воды для гигиенической ванны новорожденного составляет (°C):

*37
30
40
25

Для оценки боли у детей младше 3 лет, а также у детей с задержкой речевого и умственного развития используется:

*метод наблюдения
цветная шкала Эланда
визуально-аналоговая шкала
рейтинговая шкала Вонга-Бейкера

При анемиях в общем клиническом анализе крови наблюдается снижение:

*эритроцитов, гемоглобина
эозинофилов
тромбоцитов
лейкоцитов, нейтрофилов

Признаком гипотермического синдрома является следующее изменение кожных покровов:

*бледные с цианозом
гиперемированные
синюшные
желтушные

Третьим этапом разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида является:

проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики
определение реабилитационных или абилитационных мероприятий
*определение реабилитационного и абилитационного прогноза
оценка реабилитационного и абилитационного потенциала

При лечении гипотрофии II степени суточный объем пищи в течение 7-10 дней составляет от должного объема:

*две трети
половину
одну треть
на треть больше

Местом локализации пятен Бельского-Филатова-Коплика при кори является:

лицо
*слизистая щек
спина
живот

Осложнение при приеме сердечных гликозидов:

*экстрасистолия
фибрилляция предсердий
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
синусовая тахикардия

Одним из критериев качества специализированной медицинской помощи детям при язвенной болезни является:

проведение рентгенологического исследования желудка
*определение инфицированности *H. pylori*
проведение желудочного зондирования
проведение УЗИ желудочно-кишечного тракта

При обструктивном бронхите основной жалобой является:

*одышка
сонливость
повышение температуры
головная боль

Местом локализации болей при хроническом гастрите является:

*эпигастральная область
левое подреберье
околопупочная область
правое подреберье

Грубый кашель, осиплость голоса являются признаком:

фарингита
*ларинготрахеита
трахеита
бронхита

Переносчиками болезни Лайма являются:

птицы
вши
*клещи
животные

Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении называется:

экспрессивность
рефлексия
рационализация
*эмпатия

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемые контейнеры) упаковку, имеющую цвет:

*желтый
черный
белый
красный

Аудиологический скрининг новорожденному проводится:

на второй день после рождения
на четвертый день после рождения
*перед выпиской из родильного отделения
сразу после рождения

При проведении СЛР соотношение вдуваний в дыхательные пути и компрессий на грудину составляет:

1:15
*2:30
1:20
2:15

Биохимический показатель, отражающий функцию почек:

глюкоза
*креатинин
билирубин
кальций

В этиологии острой ревматической лихорадки ведущая роль принадлежит:

*стрептококку
стафилококку
пневмококку
энтерококку

Кабинет оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, создается на базе медицинской организации, оказывающей:

скорую медицинскую помощь
специализированную помощь
*первичную медико-санитарную помощь
паллиативную помощь

Для гастрита характерным признаком является появление болевого синдрома после приема пищи через:

2-5 минут
1,5-2 часа
3-4 часа
*15-20 минут

Генетически обусловленным заболеванием сердца у детей является:

инфекционный эндокардит
инфекционный миокардит
*гипертрофическая кардиомиопатия
острая ревматическая лихорадка

Основные клинические симптомы при железодефицитной анемии у детей:

гиперемия лица, ускоренный рост волос
*бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса
бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь
бледность, носовые кровотечения, поражение суставов

Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет (дни):

14-21
5-7
35-36
*2-10

К менингеальным симптомам относится симптом:

Лассега
Василенко
Мерфи
*Брудзинского

Опистотонус, тризм являются одним из признаков:

коклюша
*столбняка
дифтерии
бешенства

Температура воды для постановки очистительной клизмы при атонических запорах составляет (°C):

23-25
37-38
*16-20
20-25

При остром пиелонефрите в моче отмечается большое количество:

глюкозы
*лейкоцитов
эритроцитов
белка

При атопическом дерматите на коже появляются:

язвы
волдыри
*пузырьки
бугорки

Детям до 10 лет газоотводная трубка при введении лекарственного средства с помощью клизмы вводится на глубину(см):

15-20
*6-15
2-6
15-30

Сублингвальное применение предполагает введение лекарственных препаратов:

на кожу
в дыхательные пути
в прямую кишку
*под язык

Стиль поведения в межличностном конфликте, предполагающий взаимные уступки для нахождения приемлемого для обеих сторон решения:

конкуренция
*компромисс
приспособление
уклонение

Функциональной особенностью ЖКТ недоношенного новорожденного является плохое переваривание:

белка
лактозы
глюкозы
*жира

Максимальный объем саморасправляющегося мешка при проведении ИВЛ новорожденным составляет (мл):

400
350
440
*240

Забор образцов крови при проведении массового обследования доношенных новорожденных на наследственные заболевания осуществляется через 3 часа после кормления (на день жизни):

второй
*четвертый
восьмой
первый

С целью поддержки грудного вскармливания первое прикладывание к груди здорового новорожденного должно осуществляться после рождения не позднее, чем через (часы):

4
1
*2
3

Образцы крови при проведении неонатального скрининга доставляются в медико-генетическую лабораторию не позднее (час):

94
72
*48
60

У новорожденного с тяжелой асфиксией кожные покровы:

бледные
гиперемированы
*цианотичные

розовые

Морфологическим признаком недоношенности является:

расположение ногтей до краев ногтевого ложа
хорошее развитие подкожной жировой клетчатки
*тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком
закрытый малый родничок

Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (гр):

2000-2500
4500-5000
*3000-3500
2500-3000

За первый месяц жизни здоровый новорожденный должен прибавить в весе не менее (гр):

400
300
*600
200

Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте (лет):

*5-7
2-5
7-10
10-13

Необоснованное назначение большого количества лекарственных средств детям называется:

синергизм
кумуляция
*полипрагмазия
антагонизм

При лечении кори рекомендуется прием витамина:

Д
*А
В
К

Одним из осложнений введения вакцины БЦЖ является:

*регионарный лимфаденит
энцефалит
артрит
тромбоцитопения

Количество этапов при проведении плановых профилактических медицинских осмотров юношей:

4
*3
1
2

Электрокардиография в рамках профилактического медицинского осмотра всем здоровым детям проводится в

возрасте:
3 месяцев
2-х недель
*12 месяцев
6 дней

Зуд в перианальной области является признаком:

*энтеробиоза
трихоцефалеза
описторхоза
аскаридоза

Результаты флюорографии легких, внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего, учитываются, если с даты проведения исследования их давность не превышает (мес.):

*12
24
18
36

Критерием эффективности проводимой ИВЛ является:

появление пульса на сонной артерии

*экскурия грудной клетки

бледность кожных покровов

вздутие эпигастральной области

К первой сортировочной группе относят пострадавших, имеющих:

тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций

легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения

повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни

*крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения

Одним из факторов риска развития гипоксии плода является:

срочные роды

продолжительность первых родов 10 часов

*длительный безводный период

головное предлежание

Недоношенный новорожденный может быть выписан при достижении им массы (гр):

3000

3500

2000

*2500

Противопоказанием к раннему прикладыванию к груди со стороны матери является:

*открытая форма туберкулеза

тугие соски

избыточная масса тела

компенсированная артериальная гипертензия

Горизонтальное плавающее движение глазных яблок у недоношенных детей называется:

астигматизм

экзофтальм

анизокория

*нистагм

Одним из симптомов гипогалактии со стороны новорожденного является:

*уменьшение суточного объема мочи

нормальная прибавка массы тела

жидкий стул

спокойный сон

К химическому методу стерилизации относится:

плазменный

воздушный

паровой

*газовый

Противопоказание к промыванию желудка:

*желудочное кровотечение

отравление алкоголем

эндогенная интоксикация

отравление грибами

Ревакцинация против пневмококковой инфекции проводится детям в возрасте (мес.):

- 18
- *15
- 12
- 9

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего предоставляется его родителю или иному законному представителю, если он не достиг возраста:

- 17 лет
- 16 лет
- 18 лет
- *15 лет

Патронаж к новорожденному осуществляется:

- 2 раза в месяц
- 1 раз в день
- *1 раз в неделю
- 1 раз в месяц

Статистическая форма «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних» предоставляется медицинской организацией ежегодно до:

- 20 февраля
- *20 января
- 15 февраля
- 30 января

Первый прикорм здоровому ребенку вводится в возрасте(мес.):

- 10-12
- *5-6
- 8-10
- 2-3

Вакцинация против гриппа осуществляется детям с возраста (мес.):

- *6
- 2
- 4
- 12

Гипертонус мышц –сгибателей сохраняется у здорового доношенного новорожденного до возраста(мес.):

- 1
- 6
- *3
- 4

Число дыхательных движений у детей 1 года в минуту в норме составляет:

- 16-18
- 40-60
- 20-25
- *30-35

Пациенту с хронической почечной недостаточностью следует ограничить употребление продуктов, богатых:

- клетчаткой
- углеводами
- калием
- *белками

Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с заболеваниями:

- последствия травм с благоприятным прогнозом
- распространенные формы злокачественных новообразований в стадии клинико-лабораторной ремиссии
- *неоперабельные врожденные пороки развития
- соматические заболевания в стадии компенсации

При гипогликемической коме кожа ребенка:

желтушная, сухая
розовая, сухая
*бледная, влажная
цианотичная, влажная

Уменьшение количества мочи называется:

поллакиурия
*олигурия
ишурия
полиурия

Эритема на лице, напоминающая бабочку, является признаком:

узелкового периартериита
острой ревматической лихорадки
*системной красной волчанки
системной склеродермии

Ранними симптомами туберкулеза являются:

приступ удушья, стекловидная мокрота
*длительный субфебрилитет, покашливание
лихорадка, кашель с гнойной мокротой
одышка, "ржавая" мокрота

Ведущей жалобой при хроническом гнойном отите является:

повышение температуры
*снижение слуха
головокружение
головная боль

Причина печеночной колики у детей:

гастрит
язвенная болезнь желудка
*желчекаменная болезнь
Панкреатит

При синдроме длительного сдавления целью наложения жгута выше места повреждения является:

создание депо венозной крови
предотвращение плазмопотери
остановка венозного кровотечения
*предотвращение токсемии

Порядок оказания медицинской помощи по отдельным ее видам включает:

рекомендуемые к применению лекарственные препараты
*этапы оказания медицинской помощи
виды лечебного питания
кратность применения медицинской услуги

Учетная форма «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего» заполняется с даты окончания профилактического осмотра не позднее (рабочие дни):

5
10
*20
30

К группе риска по развитию хронических заболеваний относятся новорожденные, перенесшие:

физиологическую эритему
*асфиксию в родах
гормональный криз
физиологическую желтуху

Инкубационный период при гепатите А длится (дни):

*35-36

5-14

7-21

5-7

Ежегодный охват пробой Манту детей до 14 лет включительно должен составлять не менее (%):

100

*95

98

90

Проба Манту проводится 2 раза в год детям:

часто болеющим

привитым, но из социально неблагополучных семей

посещающим образовательные организации

*получающим кортикостероидную терапию

Проверка остроты зрения при профилактическом осмотре впервые проводится в возрасте (лет):

*3

14

6

5

При галактоземии у ребенка часто развивается поражение глаз в виде:

энофтальма

*катаракты

экзофтальма

глаукомы

Устройство, предназначенное для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом:

носовая канюля

*небулайзер

мешок Амбу

кислородная лицевая маска

Место локализации первых элементов сыпи при кори:

руки

*лицо

живот

ноги

Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в расширенных бронхах:

острая пневмония

экссудативный плеврит

абсцесс легкого

*бронхоэктатическая болезнь

Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении:

*фосфорорганическими соединениями

этанолом

атропином

метанолом

Вторым этапом разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида является:

*оценка реабилитационного и абилитационного потенциала

определение реабилитационных или абилитационных мероприятий

проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики

определение реабилитационного и абилитационного прогноза

Экспираторная одышка является признаком:

отека легких

острой пневмонии
инородного тела трахеи
*бронхиальной астмы

Временным противопоказанием для кормления новорожденного грудью является:

галактоземия
*родовая травма
болезнь «кленового сиропа»
фенилкетонурия

Местом размещения собранных образцов крови при проведении неонатального скрининга является:

*бумажный тест-бланк
пробирка
предметное стекло
капилляр

Исследование образцов крови в лаборатории при проведении неонатального скрининга выполняют в срок до:

2-х недель
*10 дней
одного месяца
20 дней

Реакция новорожденного на проводимые в родильном зале реанимационные мероприятия оценивается:

в первую и пятую минуты
через 10 минут
*каждые 30 секунд
каждую минуту

Генеральная уборка процедурного кабинета детского соматического отделения проводится:

один раз в месяц
ежедневно
один раз в три дня
*один раз в неделю

Болезнь Дауна развивается при трисомии по паре хромосом:

*21
20
19
22

Большое количество эритроцитов, выявленное в общем анализе мочи, называется:

пиоурия
*гематурия
лейкоцитурия
цилиндрурия

Контроль эффективности эрадикации *H.pylori* у детей с язвенной болезнью после окончания лечения осуществляется не ранее (недели):

4
*6
2
8

Одним из критериев оценки степени тяжести острого обструктивного ларингита (крупа) по шкале WESTLEY является:

частота дыхательных движений
артериальное давление
*втяжение уступчивых мест грудной клетки
частота сердечных сокращений

Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского возраста, обеспечивается через:

*информирование о факторах риска для здоровья

проведение профилактических осмотров
проведение диспансерного наблюдения
выполнение диагностических процедур

Концентрационная функция почек определяется методом:

Амбюрже
*Зимницкого
Нечипоренко
Аддиса-Каковского

Всем детям с подозрением на менингококковую инфекцию, независимо от формы заболевания проводится:

электронейромиограмма
ультразвуковое исследование головного мозга
клиническое исследование цереброспинальной жидкости
*бактериологическое обследование носоглоточной слизи

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка проводится детям в возрасте:

одного года
одного месяца
*трех месяцев
шести месяцев

В перечень лабораторного и инструментального обследования при проведении профилактического медицинского осмотра юношей 12 лет не входит:

анализ кала
электрокардиография
общий анализ крови
*флюорография

Максимальное количество баллов при оценке функционального состояния новорожденного составляет:

14
8
12
*10

Ведущим признаком стеноза гортани у детей является:

гипертермия
*инспираторная одышка
экспираторная одышка
судорожная готовность

Основные симптомы сахарного диабета у детей:

отеки, боль в пояснице
сухой кашель, одышка
запоры, боли в животе
*полидипсия, полиурия

В качестве экстренной профилактики столбняка при ожогах, привитым детям вводят:

сыворотку противостолбнячную
*столбнячный анатоксин
столбнячный анатоксин и сыворотку противостолбнячную
иммуноглобулин человека противостолбнячный

Ребенку с бронхиальной астмой противопоказано применение:

*ацетилсалициловой кислоты
парацетамола
сальбутамола
фенотерола

При введении лекарственного средства с помощью клизмы ребенку в возрасте 5 месяцев, его укладывают на:
правый бок

*спину
левый бок
живот

Второй дородовый патронаж проводится на сроке беременности (недели):

22-24
38-40
*30-32
26-28

При угрозе стеноза гортани у ребенка с ларинготрахеитом вне медицинской организации требуется:

проведение оксигенотерапии
направление в поликлинику
*срочная госпитализация
выполнение физиотерапевтических процедур

Тест-бланк при проведении неонатального скрининга высушивают в горизонтальном положении на чистой, обезжиренной поверхности не менее:

20 минут
40 минут
*2 часов
1 часа

Общее состояние новорожденного при рождении оценивают по шкале:

*Апгар
Ross
Глазго
SCORE

Холодовой стресс у доношенного новорожденного начинается при температуре тела менее (°C):

36,8
36,7
36,9
*36,5

Температура тела у здорового доношенного новорожденного стабилизируется к часу жизни:

10-12
*5-6
3-4
1-2

Длительность проведения тактильной стимуляции при отсутствии самостоятельного дыхания у новорожденного составляет:

1-2 минуты
3-4 минуты
*10-15 секунд
30-40 секунд

При проведении реанимационных мероприятий новорожденному, родившемуся в асфиксии, повторная оценка по шкале Апгар проводится после рождения через (мин)

одну и две
три и пять
пять и десять
*одну и пять

Большой родничок у здорового ребенка закрывается в возрасте (мес.):

18-24
*12-15
10-11
15-18

Профилактическая доза витамина D ребенку до 3 месяцев жизни составляет(МЕ):

600
*500
200
1000

Результаты диспансеризации детей- сирот заносятся в форму:

030-ПО/о-17
030-ПО/у-17
*030-Д/с/у-13
030-Д/с/о-13

При инвазии аскаридами в общем анализе крови значительно повышается уровень:

базофилов
моноцитов
*эозинофилов
лимфоцитов

Занамивир при тяжелых формах гриппа у детей применяется с возраста:

2 года
*5лет
3года
12 лет

К приобретенному пороку сердца относится:

дефект межжелудочковой перегородки
*митральный стеноз
тетрада Фалло
дефект межпредсердной перегородки

При жизнеугрожающих проявлениях пищевой аллергии ребенку назначают:

фексофенадин
дезлоратадин
*эпинефрин
цетиризин

При тяжелой форме гемолитической болезни у новорожденного с быстрым нарастанием желтухи проводят:

гемосорбцию
*заменное переливание крови
инфузионную терапию
плазмаферез

Изоляция новорожденных детей из очага туберкулезной инфекции проводится на срок не менее (мес.):

*2
4
3
1

Здоровый ребенок самостоятельно сидит с возраста (мес.):

8
*6
4
12

Степень нарушения сознания оценивается по шкале:

Роттердам
*Глазго
Апгар
Ross

Несовершеннолетние, с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, относятся к группе по занятию физической культурой:

2

1
*3А
3Б

Поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4 - 5 дня болезни характерно для инфекционного заболевания:

эпидемический паротит
краснуха
ветряная оспа
*корь

Симптом «прилипшей пятки» характерен для перелома:

*шейки бедра
костей стопы
позвоночника
костей голени

Отличительным признаком ожога 2 степени является:

некроз тканей
*наличие пузырей или их остатков
отек тканей
гиперемия кожи

Оптимальная температура воздуха в спальнях помещений стационарных организаций отдыха и оздоровления детей составляет(°С):

16-18
18-20
*20-24
24-28

Охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее (%):

25
90
95
*75

Медицинские работники со средним медицинским образованием поликлинических подразделений медицинских организаций оказывают:

первичную врачебную медико-санитарную помощь
*первичную доврачебную медико-санитарную помощь
специализированную медицинскую помощь
первичную специализированную медико-санитарную помощь

Максимальная вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) составляет:

6 коек
*2 койки
4 койки
3койки

Тяжелее всего у новорожденных протекает форма гемолитической болезни:

желтушная
анемическая
*отечная
смешанная

Генерализованной формой гнойно-септических заболеваний новорожденных является:

*сепсис
омфалит
парапроктит
везикулопустулез

В лечении аутоиммунного гепатита у детей препаратом выбора является:

дексаметазон
бетаметазон
*преднизолон
клобетазон

К сердечным гликозидам относится препарат:

*коргликон
каптоприл
атенолол
ибупрофен

При повреждении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы голова новорожденного наклонена:

*в больную сторону
вперед
назад
в здоровую сторону

Лечение новорожденных с признаками инфекции осуществляется:

в палате для совместного пребывания послеродового отделения
в палате для раздельного пребывания послеродового отделения
*в отделении патологии новорожденных
в наблюдательном отделении

У здорового доношенного новорожденного окружность груди составляет в среднем (см):

38-40
*32-34
26-28
28-30

Одним из признаков синдрома профессионального выгорания у медицинских работников является:

высокая работоспособность
*отстраненность от пациентов и работы
активное участие в жизни коллектива
заинтересованность в результате труда

К социальным эффектам гигиенического обучения населения относится:

*повышение качества жизни населения
консолидация общества
сокращение убытков от временной нетрудоспособности
улучшение медицинского обслуживания

Обострение хронического холецистита у детей провоцирует прием:

витаминов
углеводов
жидкости
*жирной пищи

Для диагностики бронхоэктатической болезни проводят:

флюорографию
спирометрию
рентгенографию органов грудной клетки
*бронхографию

Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь:

больной человек
*пациент
старый человек
гражданин

Патологическое урежение дыхания:

*брадипноэ
тахипноэ

апноэ
диспноэ

Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:

ситуационно-обусловленные потери

общие потери

санитарные потери

*безвозвратные потери

Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской помощи – это:

сестринские технологии

сестринское дело

деонтология

*медицинская этика