

**Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело»**  
для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации  
**«Сестринское дело в психиатрии»**

1. К первой ступени психиатрической помощи относится:

- а) психиатрическая больница
- б) психиатрический диспансер
- в) психиатрический кабинет**

2. Термин «шизофрения» введен:

- а) Э. Крепелином
- б) С. Корсаковым
- в) Э. Блейлером**

3. Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются:

- а) комментирующие
- б) констатирующие
- в) императивные**

4. Ремиссия – это:

- а) выздоровление
- б) временное улучшение состояния**
- в) временное ухудшение состояния

5. В древности «священной, лунной болезнью» называли:

- а) шизофрению
- б) истерию
- в) олигофрению
- г) эпилепсию**

6. Изменение личности в виде вязкости, тугоподвижности, злопамятности характерно для:

- а) эпилепсии**
- б) церебрального атеросклероза
- в) шизофрении
- г) истерии

7. Катастрофы, пожары, стихийные бедствия могут привести к возникновению:

- а) делирия
- б) истерического паралича**
- в) нейроида

8. Основанием помещения больного в интернат для психохроников является:

- а) хроническое психическое заболевание с частыми обострениями
- б) недееспособность
- в) отсутствие опекуна**

9. Врач, описавший тотальное слабоумие с распадом речи:

- а) Г. Вернике
- б) С. Корсаков
- в) З. Фрейд
- г) А. Пик
- д) А. Альцгеймер**

10. Двигательный автоматизм встречается в структуре синдрома:

- а) психоорганического
- б) галлюцинаторно-параноидного**
- в) амнестического

11. Закатывание глаз, кривошея, тонические судороги характерны при использовании:

- а) амитриптилина
- б) тегретола
- в) барбитала
- г) галоперидола**

12. Истинные зрительные галлюцинации характерны для:

- а) шизофрении
- б) интоксикационного делирия**
- в) инволюционной меланхолии

13. Медикаментозными средствами, оказывающими профилактическую помощь в лечении расстройств настроения являются:

- а) антидепрессанты
- б) психостимуляторы**

в) нейролептики

**г) препараты солей лития**

14. Изменение личности при шизофрении характеризуется всем, кроме:

а) «расщепления» психики

б) эмоциональной тупости

**в) прогрессирующего расстройства памяти**

15. Нарушение чувствительности по типу «носков» наблюдается у больных с:

**а) алкогольным полиневритом**

б) белой горячкой

в) алкогольным бредом ревности

16. Состояние эйфории предполагает приподнятое настроение с:

а) творческой активностью

**б) двигательной активностью**

в) алкогольным бредом ревности

17. Ведущим методом обследования лиц, страдающих психическими расстройствами, является:

а) психологическое исследование

б) психоанализ

**в) клинический метод**

18. Тихая, монотонная медленная речь присуща больным с:

а) кататонией

б) бредом преследования

в) бредом громадности

**г) депрессией**

19. К числу особенностей алкоголизма на современном этапе относится:

а) стабилизация распространенности алкогольных психозов

б) увеличение числа типичных алкогольных психозов

**в) увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов**

20. Абсолютно специфическим заболеванием, развивающимся у сотрудников психиатрической больницы, является:

а) невроз

б) шизофрения

**в) аллергия на психотропные препараты**

21. «Великой симулянткой» называют:

а) неврастению

б) ипохондрию

**в) истерию**

22. Нейролептический синдром характеризуется:

**а) неусидчивостью**

б) плаксивостью

в) депрессией

23. Абсолютным признаком психоза являются:

**а) галлюцинации**

б) фантазии

в) иллюзии

г) фобии

24. Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является:

а) аминазин

б) реланиум

**в) акинетон**

25. По статистике большинство послеродовых психозов – это:

а) интоксикационные

б) МДП

в) истерия

**г) шизофрения**

26. Кататонический синдром чаще встречается при:

**а) шизофрении**

б) эпилепсии

в) органических поражениях головного мозга

27. Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для:

а) онкологических больных

**б) наркоманов**

в) алкоголиков

28. К профилактическим средствам при расстройстве настроения относится:

а) амитриптилин

б) ноотропил

в) золофт

**г) карбонат лития**

29. Отказ опекуна взять из психиатрического стационара недееспособного больного с ремиссией предусматривает:

а) немедленную выписку больного.

б) оформление в ПНИ.

в) обращение в суд

**г) обращение в органы опеки и попечительства**

30. К пациенту, находящемуся на стационарном обследовании (военная экспертиза) и возбуждавшемуся в связи с конфликтом:

а) применяют терапевтические меры

б) применяют меры стеснения

**в) не применяют меры, выписывают за нарушение режима**

31. По статистике суицидальные попытки чаще совершаются:

**а) утром**

б) днем

в) вечером

г) ночью

32. Психически больные с расстройством влечений наиболее опасны, когда в статусе преобладают симптомы:

а) прожорливость, жажда

б) отказ от еды

**в) стремление к поджогу**

33. Больной, находящийся в состоянии острого бреда нуждается в:

**а) строгом наблюдении**

б) обычном наблюдении

в) усиленном наблюдении

34. Больной, находящийся в депрессии опасен:

а) отказом от еды

б) снижением всех жизненно-важных функций

**в) суицидом**

г) депрессивным ступором

35. Больной в состоянии маниакального возбуждения опасен:

а) прожорливостью

б) чрезмерной веселостью

в) отказом от еды

**г) состоянием гневливой мании**

36. Для гебефренической шизофрении характерно

**а) нелепое, дурашливое поведение**

б) депрессия

в) истерия

37. Ведущими симптомами при неврозоподобной шизофрении являются бред и галлюцинации

а) да

**б) нет**

38. Отличают парафренный синдром от синдрома психического автоматизма:

а) идеи воздействия

б) идеи преследования

**в) идеи величия**

39. Какие нарушения наиболее значимы в диагностике уровня шизофрении:

а) развитие речи

**б) особенности мышления**

в) общий запас знаний

40. Какой их перечисленных синдромов характерен для шизофрении параноидной:

**а) паранойяльный**

б) онейроидный

в) маниакальный

41. Какое содержание бреда характерно для острого параноида:

а) возможные неприятности в будущем

б) ожидающее величие

**в) сиюминутная угроза**

42. Основные клинические признаки биполярного расстройства:

а) наличие бреда, галлюцинаций

**б) наличие аффективных синдромов (фаз.)**

в) расстройство сознания

43. Может ли у одного больного в разные периоды болезни быть и маниакальная и депрессивная фаза:

**а) да**

б) нет

44. Настроение при дисфории:

а) подавленное

б) тревожное

**в) раздражительно-злое**

45. Что нужно сделать в первую очередь, если у больного эпилепсией наблюдается аура:

**а) уложить на мягкое и ввести прокладку между зубов**

б) дать привычный противосудорожный препарат

в) ввести седуксен

46. Назовите признак, свидетельствующий о тяжести алкогольного делирия:

а) врожденный тремор

б) парейдолин

**в) тактильные галлюцинации**

47. Галлюцинации характерны для алкогольного психоза:

**а) истинные**

б) псевдогаллюцинации

48. Какие психические нарушения характерны для алкогольного психоза:

а) идеи ущерба

**б) рительные галлюцинации, бред преследования.**

в) депрессия

49. Клинической картине острого галлюциноза присущи следующие эмоциональные расстройства:

а) аффект недоумения

б) раздражительная слабость, слезливость

**в) аффект тревоги и параноидная настроенность**

50. Сознание при алкогольном галлюцинозе:

а) помрачено

б) изменено

**в) не нарушено**

51. Сознание при алкогольном делирии:

**а) изменено**

б) не нарушено

52. Препарат, обладающий нейролептическим действием:

**а) аминазин**

б) амитриптилин

в) тазепам

г) седуксен

53. Препарат, который используется для купирования психомоторного возбуждения:

**а) аминазин**

б) мелипрамин

в) амитриплин

г) любой из перечисленных

54. Какой из перечисленных признаков наиболее значим для различия истерических и пароксизмальных приступов

а) падение

б) моторные конвульсии

**в) зрачковые реакции**

55. Транквилизатор, не вызывающий сонливости:

а) феназепам

б) седуксен

**в) грандаксин**

56. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» обязаны соблюдать:

а) медицинские учреждения психиатрического профиля

**б) медицинские учреждения любого профиля**

57. Кто является законным представителем недееспособного психически больного:

- а) муж, жена
- б) родители
- в) опекун**

58. Назначает или отменяет принудительное лечение психически больного:

- а) комиссия врачей-экспертов
- б) суд**

59. Недееспособность психически больного может быть установлена:

- а) судом**
- б) комиссией врачей
- в) лечащим врачом

60. Оформление истории болезни больного в психиатрический стационар невозможно, если нет:

- а) направления районного психиатра
- б) согласия пациента
- в) диагностированного дежурным врачом психического состояния**
- г) документа, удостоверяющего личность

61. Согласие больного на госпитализацию берется:

- а) во всех случаях стационарирования в психиатрическую больницу
- б) только при стационарировании больного в состоянии острого психоза
- в) при стационарировании больных, находящихся вне состояния острого психоза или выраженной деменции**

62. Согласие на госпитализацию, оформление в истории болезни:

- а) действительно на весь период стационарного лечения
- б) действуют только в течение месяца после госпитализации
- в) не имеет срока действия и может быть отозвано в любой момент**

63. Согласие на госпитализацию, полученное от больного, находящегося в состоянии острого психоза:

- а) принимается во внимание, если оно дано больным добровольно, без принуждения
- б) должно быть подтверждено свидетелями
- в) не имеет правового значения**

64. При поступлении в стационар неизвестного больного информация о нем направляется в ОВД:

- а) в течение первых 10 дней пребывания в стационаре
- б) в течение суток после госпитализации**
- в) в течении месяца

65. Заявление в суд о недобровольной госпитализации больного направляется больницей:

- а) в течении суток после помещения больного в стационар
- б) не позднее 48 часов с момента госпитализации**
- в) в течении первых трех дней после пребывания в стационаре

66. Находящиеся в истории болезни записи и документы:

- а) всегда должны быть недоступными для больного
- б) могут быть предоставлены больному в полном объеме, по первому его требованию
- в) могут быть доступны больному при определенных условиях**

67. Галлюцинации – это:

- а) искаженное восприятие окружающего
- б) нечеткое восприятие объекта
- в) ощущение нереальности окружающего
- г) восприятие без объекта**

68. Псевдогаллюцинации – это:

- а) когда больной не воспринимает реальный объект
- б) когда больной воспринимает объект измененным
- в) проекция галлюцинаторного образа во внутрь**
- г) проекция галлюцинаторного образа вовне

69. Иллюзии – это:

- а) восприятие несуществующего объекта
- б) искаженное восприятие объекта**
- в) нечеткое восприятие реальности
- г) увеличенное восприятие реального объекта

70. В синдром Кандинского – Клерамбо не входит:

- а) синдром открытости мыслей
- б) псевдогаллюцинации
- в) ощущение насильственности поступков
- г) повышенное настроение**

71. При навязчивых мыслях пациент:

**а) критичен к своим мыслям и высказываниям**

б) не критичен к своим мыслям и высказываниям

72. Деменция является характерным исходом:

**а) старческих психозов**

б) неврозов

в) шизофрении

г) олигофрении

73. Резонерство является нарушением:

а) настроения

б) памяти

**в) мышления**

г) эмоций

74. Деменция является нарушением:

а) эмоций

б) воли

**в) интеллекта, памяти**

г) сознания

75. Депрессивное состояние характеризуется :

**а) тоской**

б) агрессивностью

в) злобой

76. При депрессии больной не высказывает мыслей:

а) самоуничижения

**б) изобретательства**

в) греховности

г) собственной никчемности

77. Дайте определение анорексии?

**а) понижение влечения к пище**

б) извращение влечения к пище

в) повышение влечения к пище

78. Апатия характеризуется:

а) подавленностью

б) беспокойством

**в) безразличием**

г) тревогой

79. Бред ущерб, «малого размаха», как правило, встречается при:

**а) инволюционных психозах**

б) шизофрении

в) старческих психозах

г) реактивных психозах

80. При амбивалентности больной испытывает:

а) недовольство

б) стремление к побегу

в) нежелание лечиться

**г) два противоположных чувства**

81. Депрессивный синдром опасен совершением:

а) побега

**б) суицида**

в) нападения на персонал

г) криминальные действия

82. Кататонический синдром встречается при:

а) психопатиях

б) неврозах

**в) шизофрении**

г) эпилепсии

83. Нарушение способности запоминать текущие события называется:

а) гипомнезией

б) ретроградной амнезией

**в) фиксационной амнезией**

г) парамнезией

84. Эквивалент судорожного припадка на уровне настроения называется:

**а) дисфорией**

- б) морией
- в) депрессией
- г) эйфорией

85. Обсессии – это:

- в) вид бреда
- б) навязчивости**
- в) галлюцинации
- г) вид нарушения памяти

86. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная деятельность характеризует симптом:

- а) депрессивный
- б) тревожно – депрессивный
- в) маниакальный**
- г) судорожный

87. При ипохондрическом бреде больной считает, что:

- а) у него тяжелая болезнь**
- б) его обворовывают
- в) он преступник
- г) его хотят отравить

88. К расстройствам восприятия относится:

- а) судороги
- б) галлюцинации**
- в) бред
- г) делирий

89. Дромомания (влечение к бродяжничеству)– это расстройство:

- а) памяти
- б) эмоциональной сферы
- в) волевой сферы**
- г) восприятия

90. Состояние выключения сознания:

- а) кома**
- б) делирий
- в) сумеречное состояние
- г) онейроид

91. Отсутствие воспоминаний у больного на какой–то период времени называется:

- а) бредом
- б) парамнезией
- в) амнезией**
- г) гипермнезией

92. Патологическая нелепая идея, не поддающаяся разубеждению, называется:

- а) бредовой**
- б) навязчивой
- в) сверхценной
- г) бессмысленной

93. Наиболее опасным для окружающих является больной:

- а) с фиксационной амнезией
- б) с кататоническим возбуждением**
- в) с комментирующими псевдогаллюцинациями
- г) с кататоническим ступором

94. Психопатия – это:

- а) врожденная патология интеллекта
- б) патологическое развитие характера**
- в) проявление деменции
- г) результат длительной алкоголизации

95. Течение психопатий характеризуется:

- а) цикличностью
- б) прогрессивностью
- в) компенсацией – декомпенсацией**
- г) фазностью

96. Возможная причина невроза:

- а) черепно – мозговая травма
- б) алкоголизм

**в) конфликтная ситуация в семье**

г) наркомания

97. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид деятельности:

**а) лицензия**

б) приказ

в) сертификат

г) диплом

98. Цель сестринского процесса:

а) диагностика и лечение заболеваний

**б) обеспечение максимально возможного качества жизни пациента**

в) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу

г) активное сотрудничество с пациентом

99. Действие медсестры, способное разрешить проблемы пациента без консультации и сотрудничества с врачом:

а) зависимое сестринское вмешательство

**б) независимое сестринское вмешательство**

в) взаимозависимое вмешательство

г) автономное сестринское действие

100. Независимые сестринские вмешательства:

**а) кормление пациента**

б) запись ЭКГ

в) в/м инъекции

г) в/в капельное вливание

101. К ятрогенным относятся заболевания:

а) обусловленные вредными факторами производства

**б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников**

в) с неблагоприятным прогнозом

102. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при повреждении

а) паренхиматозных органов

б) капилляров

**в) артерий**

г) вен

103. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:

а) височной кости

б) углу нижней челюсти

в) поперечному отростку 6 шейного позвонка

**г) в надключичной ямке к 1 ребру**

104. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к:

а) височной кости

**б) поперечному отростку 6 шейного позвонка**

в) углу нижней челюсти

г) в надключичной ямке к 1 ребру

105. Временный гемостаз при ранении сонной артерии

а) наложение давящей повязки

б) наложение окклюзионной повязки

**в) наложение жгута с противоупором**

г) наложение жгут-закрутки.

106. Метод временного гемостаза при артериальном кровотечении

а) возвышенное положение конечности

б) наложение пузыря со льдом

**в) пальцевое прижатие**

г) перевязка сосудов

107. Способ временного гемостаза при венозном кровотечении

а) максимальное сгибание конечности в суставе

**б) давящая повязка, возвышенное положение конечности**

в) наложение кровоостанавливающего жгута

г) пальцевое прижатие на протяжении

108. Для остановки артериального кровотечения из раны в области кисти необходимо

**а) наложить давящую повязку**

б) наложить жгут выше места ранения

в) наложить герметичную повязку

г) произвести пальцевое прижатие

109. Показание для наложения кровоостанавливающего жгута

- а) желудочное кровотечение
- б) кровотечение из вен голени
- в) кровотечение из крупных артерий**
- г) кровотечение из крупных вен шеи

110. Признак правильности наложения жгута

- а) синюшность кожных покровов
- б) отсутствие чувствительности ниже жгута
- в) бледность кожных покровов**
- г) отек кожи ниже жгута

111. Подручное средство для остановки артериального кровотечения

- а) провод
- б) ремень**
- в) капроновая нить
- г) веревка

112. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку летом

- а) 30 минут
- б) 1 час
- в) 2 часа**
- г) 3 часа

113. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку зимой

- а) 30 минут
- б) 1 час**
- в) 2 часа
- г) 3 часа

114. Основной опасностью при ранении яремной вены является

- а) воздушная эмболия**
- б) быстрое развитие острого малокровия
- в) инфицирование
- г) клиническая смерть

115. Временный гемостаз при ранении яремной вены

- а) наложение давящей повязки
- б) наложение окклюзионной повязки**
- в) наложение кровоостанавливающего жгута
- г) пальцевое прижатие

116. Меры оказания первой помощи при носовом кровотечении

- а) холод на переносицу, пальцевое прижатие крыльев носа к носовой перегородке**
- б) дать понюхать нашатырный спирт
- в) запрокинуть голову
- г) дать успокаивающее средство

117. Положение больного с носовым кровотечением

- а) сидя, запрокинув голову
- б) лежа на спине
- в) сидя, слегка опустив голову**
- г) лежа на животе

118. Основной фактор появления нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций в ЛПУ?

- а) нарушение правил асептики и антисептики в ЛПУ**
- б) увеличение количества тяжелобольных
- в) появление в отделениях больных с педикулезом
- г) нарушение режима питания

119. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую глаз:

- а) обильно промыть водой (не тереть)**
- б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия
- в) промыть 20% раствором сульфацила натрия
- г) промыть 1% раствором борной кислоты

120. При попадании биологической жидкости на кожу, необходимо:

- а) промыть кожу водой с мылом
- б) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным спиртом - контакт с кожей - 2 мин**
- в) обработать 1% раствором хлорамина
- г) обработать 0,05% раствором перманганата калия

121. При попадании крови на слизистую носа необходимо:

**а) промыть нос водой (не тереть)**

б) промыть 0,05% раствором перманганата калия

в) промыть 0,01% раствором перманганата калия

г) промыть 1% раствором борной кислоты

122. Нормативный документ по профилактике вирусных гепатитов:

а) № 916

б) № 720

в) № 170

**г) № 408**

123. Меры профилактики ВБИ для медицинского персонала при работе с биологическими жидкостями:

а) использование халатов, масок, перчаток

**б) использование халатов, перчаток, масок, защитных очков или щитков, фартуков, нарукавников**

в) использование перчаток, фартуков, нарукавников

124. При уколах и порезах кожи необходимо:

а) обработать рану 3% хлорамином

б) выдавить кровь, обработать рану 5% спиртовым раствором йода

**в) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать спиртом, смазать рану 5% спиртовым раствором йода**

г) ничего не предпринимать, сообщить старшей медсестре

125. Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента:

а) обеспечение кратковременной стерильности

б) создание кратковременной стерильности

в) профилактика профессионального заражения

**г) удаление бытовых загрязнений**

126. Гигиеническая обработка рук медперсонала проводится:

а) после посещения туалета

б) перед едой

**в) до и после снятия перчаток**

г) перед кормлением пациента

127. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:

а) по профилактике интоксикаций

б) направленных на пропаганду здорового образа жизни

**в) по профилактике внутрибольничной инфекции**

г) по лечению пациента

128. Дезинфекция – это:

а) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов во внешней среде

б) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов в организме человека

**в) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде**

г) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов в организме человека

129. Профилактическая дезинфекция проводится:

а) в непосредственном окружении больного

**б) постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания**

в) в очаге, после госпитализации больного

130. К механическому способу дезинфекции относится:

**а) влажная уборка помещений**

б) кипячение

в) ультрафиолетовое облучение

г) использование формалина

131. К химическому способу дезинфекции относится:

а) влажная уборка помещений

б) фильтрация воздуха

в) ультрафиолетовое облучение

**г) использование растворов дезсредств**

132. Укажите последовательность этапов обработки медицинского инструментария:

а) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, стерилизация

**б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация**

в) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация

г) дезинфекция, стерилизация

133. Для генеральной и текущей уборки предпочтительно использовать препараты, обладающие свойствами:

а) только дезинфицирующими

**б) дезинфицирующими и моющими**

в) только моющими

г) моющими и дезодорирующими

134. . Количество классов отходов, образующихся в лечебно – профилактических учреждениях:

а) 4

б) 2

в) 3

**г) 5**

135. Отходы класса А утилизируются в пакетах:

а) жёлтого цвета

б) красного цвета

в) чёрного цвета

**г) белого цвета**

136. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:

а) А

**б) Б**

в) В

г) Г

137. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают:

а) ополаскиванию проточной водой

б) мойке

**в) дезинфекции**

г) стерилизации

138. Основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу:

**а) 180°C – 60 минут**

б) 120°C – 45 минут

в) 160°C – 90 минут

г) 132°C – 20 минут

139. В нескрытом биксе с фильтром материал сохраняет стерильность в течение:

а) 6 часов

б) 3 суток

в) суток

г) 10 дней

**д) 20 дней**

140. Температура и экспозиция основного режима паровой стерилизации:

**а) 132°C -20 минут**

б) 120°C – 45 минут

в) 180°C – 60 минут

г) 160°C – 90 минут

141. Основными признаками клинической смерти являются:

а) нитевидный пульс, расширение зрачков, цианоз

б) потеря сознания, расширение зрачков, цианоз

в) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии, расширение зрачков

**г) потеря сознания, отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, широкие зрачки без реакции на свет**

142. Непрямой массаж сердца взрослому проводят с частотой:

а) 40 в минуту

б) 60 в минуту

**в) 80 в минуту**

г) 100 в минуту

143.. Побочное действие оксигенотерапии

**а) токсическое действие на ЦНС**

б) токсическое действие на печень

в) сухость дыхательных путей

г) токсическое поражение почек

144. Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции лёгких свидетельствуют:

а) об эффективной реанимации

б) об неэффективной реанимации

**в) о правильно проводимой ИВЛ**

г) об оживлении больного

145. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

- а) 1-4 мин
- б) 5-6 мин**
- в) 2-3 мин
- г) 1-2 мин

146. Эффективная реанимация продолжается:

- а) 5 мин
- б) 30 мин
- в) 60 мин
- г) до восстановления жизнедеятельности**

147. Формы шизофрении:

- а) простая**
- б) ипохондрическая
- в) параноидная**
- г) кататоническая**
- д) гебефреническая**

148. При неврозе навязчивых состояний у больных выявляются:

- а) обсессивно – фобический синдром**
- б) ритуалы**
- в) демонстративность поведения

149. При неврозах назначают:

- а) психотерапию**
- б) дегидратацию
- в) транквилизаторы**
- г) общеукрепляющие средства**

150. Для неврастении характерны:

- а) раздражительная слабость**
- б) вегетососудистая дистония**
- в) дисфория

151. Для лечения пограничных состояний применяют:

- а) психотерапию**
- б) транквилизаторы**
- в) седативные средства**
- г) нейролептики

152. Лечение шизофрении включает:

- а) психофармакологические средства**
- б) биологические методы**
- в) гипноз
- г) реабилитацию, ресоциализацию**

153. При психомоторном возбуждении показаны:

- а) аминазин**
- б) галоперидол**
- в) амитриптилин
- г) коаксил
- д) тизерцин**

154. Наиболее частые причины агрессии у душевнобольных:

- а) алкоголь
- б) самовольное прекращение приема лекарств**
- в) злоупотребление курением
- г) изменение психического состояния**

155. Аутизм является чаще всего признаком:

- а) шизофрении**
- б) депрессивной фазы
- в) маниакально-депрессивного психоза
- г) шизоидной психопатии**

156. При агрессии со стороны душевнобольного родственники должны:

- а) убрать опасные предметы**
- б) насильно заставить принять лекарство
- в) уйти из дома
- г) вызвать скорую помощь**

157. Побочные действия амитриптилина:

- а) сухость во рту**

- б) падение АД
- в) брадикардия
- г) тахикардия
- д) **сухость кожных покровов**

158. Сестринские вмешательства бывают:

- а) самостоятельными
- б) **зависимыми**
- в) **взаимозависимыми**
- г) активными
- д) **независимыми**

159. К зависимым сестринским вмешательствам относятся:

- а) **в/м инъекция**
- б) **подготовка пациента к инструментальному исследованию**
- в) кормление пациента
- г) постановка очистительной клизмы

160. Входными воротами для развития гнойной инфекции могут быть:

- а) **нарушение целостности кожных покровов**
- б) **нарушение целостности слизистых**
- в) нарушение целостности иммунной системы

161. К осложнениям кровотечений относятся:

- а) **геморрагический шок**
- б) **воздушная эмболия**
- в) **сдавление органов и тканей излившейся кровью**
- г) гемипарезы

162. Симптомы характерные для острой кишечной непроходимости:

- а) **схваткообразные боли**
- б) **отсутствие стула и газов**
- в) тенезмы
- г) **рвота**
- д) частый жидкий стул

163. Перечислите кровотечения, относящиеся к внутренним:

- а) носовое
- б) желудочное
- в) **в плевральную полость**
- г) **в брюшную полость**
- д) **в полость черепа**

164. Формами острых аллергических реакций является:

- а) **крапивница**
- б) **отёк Квинке**
- в) **анафилактический шок**
- г) снижение температуры тела
- д) повышение температуры тела

165. К методам временной остановки кровотечения относятся

- а) перевязка сосуда в ране
- б) перевязка сосуда на протяжении
- в) **наложение кровоостанавливающего жгута**
- г) **форсированное сгибание конечностей**

166. Пути передачи ВИЧ-инфекции:

- а) **половой путь**
- б) **парентеральный путь**
- в) **вертикальный путь**
- г) воздушно-капельный путь
- д) фекально-оральный путь

167. Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции:

- а) трансфузионный
- б) **половой**
- в) **вертикальный**
- г) аэрогенный
- д) фекально-оральный

168. Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции:

- а) **трансфузионный**

- б) при употреблении невымытых овощей и фруктов
- в) при употреблении в/в наркотиков**
- г) через медицинские отходы, не прошедшие дезинфекцию
- д) аэрогенный

169. Пути передачи вирусных гепатитов В, С:

- а) половой путь**
- б) парентеральный путь**
- в) воздушно-капельный путь
- г) вертикальный путь
- д) фекально-оральный

170. При сборе медицинских отходов запрещается:

- а) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)**
- б) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции**
- в) собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов
- г) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов

171. В состав «Аптечки аварийных ситуаций» входят:

- а) 70 % спирт этиловый**
- б) 5% спиртовой раствор йода**
- в) 0,5% р-р новокаина
- г) спиртовой р-р бриллиантового зеленого

172. Кожный антисептик применяют для:

- а) гигиенической обработки рук**
- б) после приготовления пищи
- в) хирургической обработки рук**
- г) удаления бытовых загрязнений

173. Моюще-дезинфицирующее средство используют для:

- а) дезинфекции использованного инструментария**
- б) дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария**
- в) дезинфекции и стерилизации инструментария

174. На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно:

- а) беременные женщины**
- б) доноры крови и органов**
- в) больные с поражениями легких
- г) больные парентеральными вирусными гепатитами**
- д) пациенты с заболеваниями крови

175. Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:

- а) металла**
- б) хлопчатобумажной ткани
- в) стекла**
- г) силиконовой резины

176. Растворы для стерилизации химическим методом:

- а) сайдекс, глутарал**
- б) 6% перекись водорода**
- в) 3% перекись водорода
- г) лизоформин 3000**
- д) октенисепт

177. Права пациента:

- а) на выбор врача и медицинской организации**
- б) на выбор палаты в медицинской организации
- в) на получение информации о состоянии своего здоровья**
- г) на составление меню рациона питания
- д) на отказ от медицинского вмешательства**

178. Права медицинского работника:

- а) на условия выполнения своих трудовых обязанностей**
- б) бесплатного проезда в общественном транспорте
- в) на совершенствование профессиональных знаний**
- г) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя**

179. Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:

- а) сообщение на предыдущее место работы
- б) заключение трудового договора**
- в) получение должностных инструкций**
- г) внесение записей в трудовую книжку**