

Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело»
для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации
«Сестринское дело в хирургии»

1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид деятельности:
 - а) лицензия
 - б) приказ
 - в) сертификат
 - г) диплом
2. ЛПУ, относящиеся к учреждениям стационарного типа:
 - а) поликлиника
 - б) многопрофильная больница**
 - в) станция скорой помощи
 - г) здравпункт
3. Обязательное медицинское страхование работающего населения осуществляется за счет
 - а) отчислений из местного бюджета
 - б) страховых взносов предприятий и учреждений**
 - в) личных средств граждан
 - г) средств благотворительных фондов
4. Основные права пациента указаны в:
 - а) основах законодательства РФ об охране здоровья граждан**
 - б) Этическом Кодексе медсестры России
 - в) Уголовном Кодексе РФ
 - г) Гражданском Кодексе РФ
5. К ятрогенным относятся заболевания:
 - а) обусловленные вредными факторами производства
 - б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников**
 - в) с неблагоприятным прогнозом
6. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при повреждении
 - а) паренхиматозных органов
 - б) капилляров
 - в) артерий**
 - г) вен
7. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:
 - а) височной кости
 - б) углу нижней челюсти
 - в) поперечному отростку 6 шейного позвонка
 - г) в надключичной ямке к 1 ребру**
8. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к:
 - а) височной кости
 - б) поперечному отростку 6 шейного позвонка**
 - в) углу нижней челюсти
 - г) в надключичной ямке к 1 ребру
9. Временный гемостаз при ранении сонной артерии
 - а) наложение давящей повязки
 - б) наложение окклюзионной повязки
 - в) наложение жгута с противоупором**
 - г) наложение жгут-закрутки.
10. Метод временного гемостаза при артериальном кровотечении
 - а) возвышенное положение конечности
 - б) наложение пузыря со льдом
 - в) пальцевое прижатие**
 - г) перевязка сосудов
11. Способ временного гемостаза при венозном кровотечении
 - а) максимальное сгибание конечности в суставе
 - б) давящая повязка, возвышенное положение конечности**
 - в) наложение кровоостанавливающего жгута
 - г) пальцевое прижатие на протяжении
12. Для остановки артериального кровотечения из раны в области кисти необходимо
 - а) наложить давящую повязку**
 - б) наложить жгут выше места ранения

- в) наложить герметичную повязку
 - г) произвести пальцевое прижатие
13. Показание для наложения кровоостанавливающего жгута
- а) желудочное кровотечение
 - б) кровотечение из вен голени
 - в) кровотечение из крупных артерий**
 - г) кровотечение из крупных вен шеи
14. Признак правильности наложения жгута
- а) синюшность кожных покровов
 - б) отсутствие чувствительности ниже жгута
 - в) бледность кожных покровов**
 - г) отек кожи ниже жгута
15. подручное средство для остановки артериального кровотечения
- а) провод
 - б) ремень**
 - в) капроновая нить
 - г) веревка
16. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку летом
- а) 30 минут
 - б) 1 час
 - в) 2 часа**
 - г) 3 часа
17. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку зимой
- а) 30 минут
 - б) 1 час**
 - в) 2 часа
 - г) 3 часа
18. Опасное осложнение при ранении яремной вены
- а) воздушная эмболия**
 - б) быстрое развитие острого малокровия
 - в) инфицирование
 - г) клиническая смерть
19. Временный гемостаз при ранении яремной вены
- а) наложение давящей повязки
 - б) наложение окклюзионной повязки**
 - в) наложение кровоостанавливающего жгута
 - г) пальцевое прижатие
20. Меры оказания первой помощи при носовом кровотечении
- а) холод на переносицу, пальцевое прижатие крыльев носа к носовой перегородке**
 - б) дать понюхать нашатырный спирт
 - в) запрокинуть голову
 - г) дать успокаивающее средство
21. Положение больного с носовым кровотечением
- а) сидя, запрокинув голову
 - б) лежа на спине
 - в) сидя, слегка опустив голову**
 - г) лежа на животе
22. Первая помощь при желудочно-кишечном кровотечении
- а) грелка на живот
 - б) холод на живот, введение гемостатических средств**
 - в) введение анальгетиков
 - г) введение спазмолитиков
23. Транспортировка пострадавшего с желудочно-кишечным кровотечением
- а) лежа на спине без подушки**
 - б) лежа на животе
 - в) сидя
 - г) полусидя
24. Транспортировка пострадавшего с легочным кровотечением
- а) лежа
 - б) сидя
 - в) полусидя**
 - г) лежа на животе

25. Операция, произведенная после полного обследования больного в стационаре

- а) экстренная
- б) срочная
- в) плановая**
- г) диагностическая

26. Операция, при которой полностью удаляется болезненный орган

- а) диагностическая
- б) радикальная**
- в) паллиативная
- г) экстренная.

27. Цель паллиативной операции

- а) уточнение диагноза
- б) излечение больного
- в) облегчение состояния больного**
- г) получение материала для исследования

28. Вид санитарной обработки перед плановой операцией

- а) обтирание кожи и смена белья
- б) полная санитарная обработка**
- в) частичная санитарная обработка
- г) санитарная обработка не проводится

29. Вид санитарной обработки перед экстренной операцией

- а) обтирание кожи и смена белья
- б) полная санитарная обработка
- в) частичная санитарная обработка**
- г) санитарная обработка не проводится

30. Подготовку операционного поля перед плановой операцией проводят

- а) за 1 сутки до операции
- б) вечером накануне операции
- в) утром в день операции**
- г) после премедикации

31. Очистительная клизма перед экстренной операцией

- а) ставится за 6 часов до операции
- б) ставится за 2 часа до операции
- в) ставится накануне операции вечером
- г) не ставится**

32. Позднее осложнение послеоперационного периода

- а) рвота
- б) кровотечение
- в) остановка дыхания
- г) нагноение раны**

33. Цель наложения груза на рану в послеоперационном периоде

- а) обезболивание
- б) предотвращение отека
- в) профилактика инфицирования
- г) профилактика кровотечения**

34. Дыхательная гимнастика является профилактикой

- а) застойной пневмонии**
- б) асфиксии
- в) бронхита
- г) плеврита

35. Фурункул - это

- а) воспаление сальных желез
- б) воспаление потовых желез
- в) воспаление волосяного фолликула**
- г) воспаление подкожной клетчатки

36. Гидраденит - это

- а) воспаление сальных желез
- б) воспаление потовых желез**
- в) воспаление волосяного фолликула
- г) воспаление подкожной клетчатки

37. Карбункул – это

- а) **воспаление нескольких волосяных фолликулов в одном месте**
 - б) воспаление потовых желез
 - в) воспаление лимфатических узлов
 - г) воспаление подкожной клетчатки
38. Флегмона - это
- а) гнойное воспаление потовых желез
 - б) ограниченное воспаление подкожной клетчатки
 - в) **разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки**
 - г) воспаление нескольких волосяных фолликулов
39. Флюктуация – это
- а) **появление размягчения в центре инфильтрации**
 - б) судорожное сокращение мимических мышц
 - в) судорожное сокращение жевательных мышц
 - г) судороги всего тела
40. Местный симптом рожистого воспаления
- а) подергивание мышц вокруг раны
 - б) **яркая гиперемия кожи с четкими границами**
 - в) разлитое покраснение кожи
 - г) побледнение кожи
41. Лечение абсцесса в стадии абсцедирования
- а) новокаиновая блокада с антибиотиками
 - б) **широкий разрез и дренирование раны**
 - в) пункция гнойника с введением антибиотиков
 - г) влажные согревающие компрессы
42. Общей гнойной хирургической инфекцией называется
- а) туберкулез
 - б) остеомиелит
 - в) **сепсис**
 - г) флегмона
43. Заболевание, при котором отмечается «сардоническая улыбка»
- а) бешенство
 - б) газовая гангрена
 - в) **столбняк**
 - г) сепсис
44. Ранним признаком столбняка со стороны раны является
- а) крепитация
 - б) отсутствие чувствительности
 - в) флюктуация
 - г) **единичные подергивания мышц вокруг и в самой ране**
45. «Опистотонус» - это
- а) появление размягчение в центре инфильтрации
 - б) судорожное сокращение мимических мышц
 - в) судорожное сокращение жевательных мышц
 - г) **судороги всего тела**
46. Некроз - это
- а) временная потеря тактильной чувствительности
 - б) расширение вен конечности
 - в) **омертвление тканей**
 - г) параличи конечностей
47. Свищ - это
- а) опухоль пищевода
 - б) повреждение костей
 - в) омертвление тканей
 - г) **соединение органа с внешней средой**
48. Длительно незаживающие дефекты кожи называются
- а) **трофические язвы**
 - б) наружный свищ
 - в) инфицированная рана
 - г) рожистое воспаление
49. Основной признак варикозного расширения вен
- а) отек голени
 - б) **наличие извитых расширенных вен**

- в) перемежающаяся хромота
г) боль
50. Облитерирующий энтерит возникает у
а) мужчин до 35 лет
б) женщин до 35 лет
в) мужчин с 35 лет, злоупотребляющих никотином
г) мужчин и женщин с 55 лет
51. Симптом «перемежающей хромоты» характерен для
а) тромбоза
б) облитерирующего энтерита
в) остеомиелита
г) артроза
52. Сухая гангрена возникает при ожогах
а) 1 степени
б) 2 степени
в) 3 степени
г) 4 степени
53. Влажная гангрена особенно тяжело протекает у больных
а) облитерирующим энтеритом
б) фурункулезом
в) сахарным диабетом
г) туберкулезом костей
54. При синдроме «острого живота» нужно
а) сделать очистительную клизму
б) ввести анальгетики
в) промыть желудок
г) применить холод, срочно госпитализировать больного в хирургическое отделение
55. Транспортировка больного с синдромом «острый живот»
а) лежа на спине с согнутыми в коленных суставах ногами
б) сидя
в) полусидя
г) лежа на боку
56. При ранении, проникающем в брюшную полость с выпадением внутренних органов необходимо
а) наложить сухую повязку, не вправляя внутренние органы в брюшную полость
б) вправить внутренние органы в брюшную полость
в) дать внутрь обильное питье
г) ввести спазмолитики
57. Достоверный признак перитонита
а) болезненность живота при пальпации
б) задержка газов и кала
в) рвота
г) симптомы раздражения брюшины
58. Симптом острого аппендицита
а) кашицеобразный стул
б) изнурительная рвота
в) боли в эпигастрии с переходом в правую подвздошную область
г) значительная интоксикация
59. При остром аппендиците характерно положение больного лежа на
а) правом боку
б) левом боку
в) спине с опущенным головным концом
г) животе
60. Характер и локализация болей при перфоративной язве желудка
а) постоянные, сильные в правой подвздошной области
б) постоянные резкие боли в правом подреберье
в) опоясывающие тупого характера
г) «кинжальные» в эпигастрии
61. Свободный газ в брюшной полости определяется при
а) холецистите
б) аппендиците
в) перфоративной язве желудка
г) кишечной недостаточности

62. Первая помощь при ущемленной грыже

- а) теплая грелка
- б) очистительная клизма
- в) введение анальгетиков
- г) холод и госпитализация в хирургическое отделение**

63. Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

- а) мягкий живот
- б) симптом Щеткина-Блюмберга**
- в) симптом Пастернацкого
- г) кровотечение из уретры

64. Симптом почечной колики

- а) недержание мочи
- б) полиурия
- в) задержка стула и газа
- г) острая боль в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника**

65. Доврачебная помощь при почечной колике

- а) холод местно
- б) сердечные средства
- в) спазмолитики, анальгетики и тепло**
- г) новокаиновая блокада

66. Доврачебная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы предстательной железы

- а) пузырь со льдом
- б) мочегонные средства
- в) анальгетики
- г) катетеризация мочевого пузыря**

67. Абсолютный симптом перелома кости

- а) боль
- б) патологическая подвижность**
- в) отек
- г) деформация

68. Вид переломов костей, который чаще всего наблюдается у детей

- а) неполные
- б) полные
- в) по типу «зеленой веточки»**
- г) компрессионные

69. Первоочередное мероприятие у больного с открытым переломом и артериальным кровотечением

- а) иммобилизация конечности
- б) наложение жгута на конечность**
- в) наложение асептической повязки на место перелома
- г) наложение холода на место перелома

70. Доврачебная помощь при переломе кости

- а) наложение фиксирующей повязки
- б) наложение гипсовой повязки
- в) транспортная иммобилизация**
- г) согревающие компрессы

71. Транспортная иммобилизация при переломе предплечья

- а) пальцы – лопатка здоровой стороны
- б) пальцы – лопатка больной стороны
- в) пальцы – средняя треть плеча**
- г) лучезапястный сустав – плечевой сустав

72. При переломе бедра фиксируют

- а) голеностопный сустав
- б) голеностопный – коленный суставы
- в) пальцы стопы – голеностопный сустав
- г) голеностопный – коленный – тазобедренный сустав**

73. Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости

- а) лучезапястный сустав – плечевой сустав
- б) локтевой сустав – плечевой сустав
- в) пальцы – лопатка больной стороны
- г) пальцы – лопатка здоровой стороны**

74. При переломе голени фиксируют

- а) пальцы стопы – голеностопного сустава

- б) голеностопный – коленный сустав
в) голеностопный сустав
г) голеностопный – коленный – тазобедренный суставы
77. Абсолютный симптом вывиха
а) боль в зоне травмы
б) болезненная припухлость
в) кровоизлияние в зоне травмы
г) **пружинящая фиксация**
76. Первая помощь при вывихе:
а) наложение давящей повязки
б) тепло на месте повреждения
в) **транспортная иммобилизация**
г) асептическая повязка
77. Доврачебная помощь при ушибе мягких тканей
а) **наложение фиксирующей повязки, холод**
б) наложение гипсовой повязки
в) транспортная иммобилизация
г) согревающие компрессы
78. Первая помощь при случайной ране
а) остановка кровотечения, мазевая повязка
б) **остановка кровотечения, асептическая повязка**
в) остановка кровотечения, гипсовая повязка
г) введение антибиотиков
79. Первая медицинская помощь при термическом ожоге
а) обработка поверхностей ожога спиртом;
б) смазывание поверхностей ожога мазью;
в) обработка раствором марганца;
г) холод, обезболивание, наложение сухой повязки.
80. Охлаждение поверхности ожога холодной водой показано:
а) **в первые минуты после травмы**
б) перед каждой перевязкой
в) только при ожоге первой степени
г) не показано
81. Доврачебная помощь при отморожениях 1 степени
а) **растирание пораженной части тела водкой или спиртом**
б) удаление пузырей
в) растирание участков тела снегом
г) новокаиновая блокада.
82. При электротравме оказание неотложной помощи должно начинаться с
а) непрямого массажа сердца
б) перикардального удара
в) **прекращение воздействия электрического тока**
г) ИВЛ
83. Показания для введения противостолбнячной сыворотки и анатоксина
а) воспалительные заболевания мягких тканей туловища
б) **открытые травмы**
в) закрытые травмы
г) закрытая черепно-мозговая травма
84. Основным симптом сотрясения головного мозга
а) **ретроградная амнезия**
б) усиление рефлексов
в) паралич конечностей
г) нарушение функции тазовых органов
85. «Светлый промежуток» является симптомом
а) сотрясения головного мозга
б) ушиба головного мозга
в) **сдавления головного мозга**
г) перелома основания черепа
86. Типичное проявление перелома основания черепа
а) **кровотечение и истечение ликвора из носа и ушей**
б) отек век
в) подкожная эмфизема

- г) двоение в глазах
87. Симптом «очков» наблюдается при
- а) сотрясении головного мозга
 - б) ушибе головного мозга
 - в) переломе основания черепа**
 - г) сдавлении головного мозга
88. Транспортировка пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой
- а) сидя
 - б) полусидя
 - в) на спине, голова фиксирована на ватно-марлевом круге**
 - г) лежа на боку
89. Первая помощь при ножевом ранении сердца
- а) стимуляция сердечной деятельности
 - б) нож удалить
 - в) нож не удалять**
 - г) спазмолитики
90. Транспортировка пострадавшего с переломом ребер
- а) лежа на спине
 - б) лежа на животе
 - в) сидя**
 - г) лежа на боку
91. Вид пневмоторакса, при котором рана «не дышит»
- а) открытый
 - б) закрытый**
 - в) клапанный
 - г) спонтанный
92. Вид пневмоторакса, при котором рана «дышит»
- а) открытый**
 - б) закрытый
 - в) клапанный
 - г) спонтанный
93. Доврачебная помощь при закрытом пневмотораксе
- а) наложение сухой повязки**
 - б) наложение давящей повязки
 - в) герметической повязки
 - г) наложение матерчатой повязки
94. Доврачебная помощь при открытом пневмотораксе
- а) наложение сухой повязки
 - б) наложение давящей повязки
 - в) наложение матерчатой повязки
 - г) наложение герметической повязки**
95. Транспортировку пострадавшего с закрытым переломом поясничного отдела позвоночника осуществляют на носилках в положении
- а) на спине**
 - б) на животе
 - в) на боку
 - г) «лягушки».
96. Пострадавшего с переломом костей таза транспортируют на носилках в положении
- а) на животе
 - б) на боку
 - в) «лягушки»**
 - г) на спине с выпрямленными ногами
97. Основной фактор появления нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций в ЛПУ?
- а) нарушение правил асептики и антисептики в ЛПУ**
 - б) увеличение количества тяжелобольных
 - в) появление в отделениях больных с педикулезом
 - г) нарушение режима питания
98. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую глаз:
- а) обильно промыть водой (не тереть)**
 - б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия
 - в) промыть 20% раствором сульфацила натрия
 - г) промыть 1% раствором борной кислоты

99. При попадании биологической жидкости на кожу, необходимо:

- а) промыть кожу водой с мылом
- б) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным спиртом - контакт с кожей - 2 мин**
- в) обработать 1% раствором хлорамина
- г) обработать 0,05% раствором перманганата калия

100. При попадании крови на слизистую носа необходимо:

- а) промыть нос водой (не тереть)**
- б) промыть 0,05% раствором перманганата калия
- в) промыть 0,01% раствором перманганата калия
- г) промыть 1% раствором борной кислоты

101 Нормативный документ по профилактике вирусных гепатитов:

- а) № 916
- б) № 720
- в) № 170
- г) № 408**

102 Меры профилактики ВБИ для медицинского персонала при работе с биологическими жидкостями:

- а) использование халатов, масок, перчаток
- б) использование халатов, перчаток, масок, защитных очков или щитков, фартуков, нарукавников**
- в) использование перчаток, фартуков, нарукавников

103 При уколах и порезах кожи необходимо:

- а) обработать рану 3% хлорамином
- б) выдавить кровь, обработать рану 5% спиртовым раствором йода
- в) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать спиртом, смазать рану 5% спиртовым раствором йода**
- г) ничего не предпринимать, сообщить старшей медсестре

104 Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента:

- а) обеспечение кратковременной стерильности
- б) создание кратковременной стерильности
- в) профилактика профессионального заражения
- г) удаление бытовых загрязнений**

105. Гигиеническая обработка рук медперсонала проводится:

- а) после посещения туалета
- б) перед едой
- в) до и после снятия перчаток**
- г) перед кормлением пациента

106 Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:

- а) по профилактике интоксикаций
- б) направленных на пропаганду здорового образа жизни
- в) по профилактике внутрибольничной инфекции**
- г) по лечению пациента

107 Дезинфекция – это:

- а) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов во внешней среде
- б) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов в организме человека
- в) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде**
- г) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов в организме человека

108 Профилактическая дезинфекция проводится:

- а) в непосредственном окружении больного
- б) постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания**
- в) в очаге, после госпитализации больного

109 К механическому способу дезинфекции относится:

- а) влажная уборка помещений**
- б) кипячение
- в) ультрафиолетовое облучение
- г) использование формалина

110 К химическому способу дезинфекции относится:

- а) влажная уборка помещений
- б) фильтрация воздуха
- в) ультрафиолетовое облучение
- г) использование растворов дезсредств**

111 Укажите последовательность этапов обработки медицинского инструментария:

- а) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, стерилизация
- б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация**
- в) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация
- г) дезинфекция, стерилизация

112 Для генеральной и текущей уборки предпочтительно использовать препараты, обладающие свойствами:

- а) только дезинфицирующими
- б) дезинфицирующими и моющими**
- в) только моющими
- г) моющими и дезодорирующими

113. Количество классов отходов, образующихся в лечебно – профилактических учреждениях:

- а) 4
- б) 2
- в) 3
- г) 5**

114. Отходы класса А утилизируются в пакетах:

- а) жёлтого цвета
- б) красного цвета
- в) чёрного цвета
- г) белого цвета**

115 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:

- а) А
- б) Б**
- в) В
- г) Г

116. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают:

- а) ополаскиванию проточной водой
- б) мойке
- в) дезинфекции**
- г) стерилизации

117. Основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу:

- а) 180°C – 60 минут**
- б) 120°C – 45 минут
- в) 160°C – 90 минут
- г) 132°C – 20 минут

118. В невскрытом биксе с фильтром материал сохраняет стерильность в течение:

- а) 6 часов
- б) 3 суток
- в) суток
- г) 10 дней
- д) 20 дней**

119. Температура и экспозиция основного режима паровой стерилизации:

- а) 132°C -20 минут**
- б) 120°C – 45 минут
- в) 180°C – 60 минут
- г) 160°C – 90 минут

120. Основными признаками клинической смерти являются:

- а) нитевидный пульс, расширение зрачков, цианоз
- б) потеря сознания, расширение зрачков, цианоз
- в) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии, расширение зрачков
- г) потеря сознания, отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, широкие зрачки без реакции на свет**

121. Непрямой массаж сердца взрослому проводят с частотой:

- а) 40 в минуту
- б) 60 в минуту
- в) 80 в минуту**
- г) 100 в минуту

122. Побочное действие оксигенотерапии

- а) токсическое действие на ЦНС**
- б) токсическое действие на печень
- в) сухость дыхательных путей

- г) токсическое поражение почек
123. Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции лёгких свидетельствуют:
- а) об эффективной реанимации
 - б) об неэффективной реанимации
 - в) о правильно проводимой ИВЛ**
 - г) об оживлении больного
124. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:
- а) 1-4 мин
 - б) 5-6 мин**
 - в) 2-3 мин
 - г) 1-2 мин
125. Эффективная реанимация продолжается:
- а) 5 мин
 - б) 30 мин
 - в) 60 мин
 - г) до восстановления жизнедеятельности**
126. Сестринские вмешательства бывают:
- а) самостоятельными
 - б) зависимыми**
 - в) взаимозависимыми**
 - г) активными
 - д) независимыми**
127. К зависимым сестринским вмешательствам относятся:
- а) в/м инъекция**
 - б) подготовка пациента к инструментальному исследованию**
 - в) кормление пациента
 - г) постановка очистительной клизмы
128. Входными воротами для развития гнойной инфекции могут быть:
- а) нарушение целостности кожных покровов**
 - б) нарушение целостности слизистых**
 - в) нарушение целостности иммунной системы
129. К осложнениям кровотечений относятся:
- а) геморрагический шок**
 - б) воздушная эмболия**
 - в) сдавление органов и тканей излившейся кровью**
 - г) гемипарезы
130. Для внутривенного наркоза применяют:
- а) гексенал**
 - б) калипсол**
 - в) эфир
 - г) закись азота
131. К местноанестезирующим средствам относятся:
- а) новокаин**
 - б) лидокаин**
 - в) дикаин**
 - г) гексенал
132. Для гемотранфузионного шока характерны симптомы:
- а) боль в сердце**
 - б) боль в пояснице**
 - в) повышение артериального давления
 - г) тахикардия**
 - д) одышка
133. Симптомы характерные для острой кишечной непроходимости:
- а) схваткообразные боли**
 - б) отсутствие стула и газов**
 - в) тенезмы
 - г) рвота**
 - д) частый жидкий стул
134. Факторами, предрасполагающими к возникновению брюшных грыж, являются:
- а) пожилой возраст, прогрессирующее похудание**
 - б) заболевания, вызывающие повышение внутрибрюшного давления**

в) тяжёлая физическая работа

г) тупые травмы живота

135. Перечислите кровотечения, относящиеся к внутренним:

а) носовое

б) желудочное

в) в плевральную полость

г) в брюшную полость

д) в полость черепа

136. Симптомами, характерными для клиники сотрясения мозга, являются:

а) потеря сознания

б) тошнота, рвота

в) головная боль

г) истечение ликвора из уха

д) ретроградная амнезия

137. Виды местной анестезии

а) срочная

б) плановая

в) проводниковая

г) инфильтрационная

д) внутривенная

138. Симптомы желудочного кровотечения

а) дегтеобразный стул

б) стул с алой кровью

в) рвота цвета кофейной гущи

г) рвота желчью

д) рвота с пенистой кровью

139. Абсолютные показания к экстренной операции

а) злокачественные опухоли

б) язвенная болезнь желудка

в) прободная язва желудка

г) неущемленная грыжа

д) ущемленная грыжа

140. Симптомы инфицирования послеоперационной раны:

а) кровотечение

б) отек

в) местное повышение температуры

г) гиперемия

д) рвота

141. Профилактика тромбэмболий после операции:

а) дыхательная гимнастика

б) бинтование нижних конечностей

в) раннее вставание

г) грелки к ногам

д) холодные примочки

142. Профилактика пролежней

а) туалет кожи

б) подкладной круг

в) чистое постельное белье

г) строгий постельный режим

д) активное положение в постели

143. Физические методы лечения гнойных ран:

а) повязка с гипертоническим раствором хлорида натрия

б) ПХО

в) вакуумное дренирование

г) УФО

д) официальный раствор перекиси водорода

144. Условия для заживления ран первичным натяжением:

а) ровные края

б) неровные края раны

в) сгустки крови в ране

г) отсутствие в ране инородных тел

- д) отсутствие нагноения**
145. Симптомы облитерирующего эндартериита
- а) гипертрофия мышц
 - б) гипотрофия мышц**
 - в) зябкости стоп**
 - г) пигментация кожи
 - д) перемежающая хромота**
146. К симптомам острого аппендицита относятся
- а) Ровзинга**
 - б) Ситковского**
 - в) Пастернацкого
 - г) Щеткина-Блюмберга**
 - д) Ортнера
147. При закрытой травме живота следует
- а) сделать обезболивание
 - б) обеспечить покой**
 - в) не давать пить**
 - г) наложить асептическую повязку
 - д) госпитализировать пострадавшего**
148. Признаки перитонита быстро нарастают при повреждении
- а) печени
 - б) желудка**
 - в) толстого кишечника**
 - г) селезенки
 - д) тонкого кишечника**
149. Неотложная помощь при открытых травмах почек
- а) катетеризация уретры
 - б) асептическая повязка**
 - в) антибиотики
 - г) обильное питье
 - д) срочная госпитализация**
150. Неотложная помощь при разрывах мочевого пузыря
- а) холод на живот**
 - б) антибиотики
 - в) покой в положении на животе
 - г) покой в положении «лягушки»**
 - д) срочная госпитализация**