Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело»

для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации

«Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении»

1. Изделия, подвергающиеся стерилизации в паровых стерилизаторах:
А) деревянные
Б) из текстиля
В) резиновые
Г) бумажные
Д) из стекла
2. Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 132^0С:
А) 45 минут
Б) 20 минут
В) 10 минут
3. Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 120^0С:
А) 45 минут
Б) 20 минут
В) 15 минут
4. Эксплуатировать паровой стерилизатор можно при:
А) получении положительных результатов анализа баклабораторий
Б) получении отрицательных результатов анализа баклабораторий
5. Проверка манометров проводится:
А) еженедельно
Б) 1 раз в 5 лет
В) не реже 1 раза в 12 месяцев
6. Проверка вакуумметров должна производится:
А) ежемесячно
Б) **не реже 1 раза в 12 месяцев**
В) 1 раз в 5 лет
7. Электрические стерилизаторы подключаются к сети через:
А) штепсельную розетку
Б) автономный рубильник
В) автоматический выключатель
8. Автономный рубильник устанавливается:
А) на расстоянии 1,6 м от пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора
Б) не имеет значения как
В) на расстоянии 1 м от пола и не далее 2х м от места расположения стерилизатора
9. Облицовка стен помещения, где находится паровой стерилизатор должна быть:
А) высотой 1 м
Б) на высоте 3х м
В) высотой не менее 1,8 м от пола
10. Рекомендуемая облицовка стен помещения, где находится паровой стерилизатор:
А) нитрокраска
Б) водоэмульсионная краска
В) глазурованная плитка
11. Дверь в помещение, где находится паровой стерилизатор:
А) должна открываться из помещения
Б) во время работы стерилизатора не должна закрываться
В) должна открываться в помещение
12. Эвакуационный путь в помещении, где находится стерилизатор должен быть шириной:
А) не менее 1 м
Б) 5 м
В) не менее 2 м
13. Общий выключатель потребителей электроэнергии устанавливается:
А) перед входом в стерилизационной помещение
Б) в центре стерилизационного помещения
В) произвольно
14. В стерилизационном отделении предусматриваются:
А) внешняя и внутренняя телефонная связь
Б) санитарный узел
В) автоматическая пожарная сигнализация
Г) приточно-вытяжная вентиляция

15. Гидравлические испытания стерилизаторов проводятся:
А) не реже 1 раза в 5 лет
Б) 1 раз в год
В) 1 раз в 10 лет
16. Удостоверения, подтверждающие окончание программы повышения квалификации хранится у:
А) главного врача ЛПУ
Б) старшей медсестры отделения
В) лица, работающего на автоклаве
17. Удостоверение подтверждающее окончание программы повышения квлификации действительно в течение:
А) 1 года
Б) 5 лет
В) 10 лет
18. О неисправностях в автоклаве сообщают:
А) старшей медсестре отделения
Б) главному врачу ЛПУ
В) ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора
Г) в учреждения Роспотребнадзора
19. Потенциально опасные факторы при эксплуатации паровых стерилизаторов:
А) низкое давление
Б) высокое давление
В) вибрация
Г) электрический ток
Д) высокая температура
20. Укажите средства индивидуальной защиты персонала:
А) термовлагостойкий фартук
Б) маска
В) очки
Г) рукавицы суконные
Д) аптечка с лекарственными средствами для оказания первой помощи
21. К обслуживанию автоклавов допускаются лица:
А) достигшие 16 лет
Б) с 18 лет
В) возраст не имеет значения
22. Инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизаторов проводится:
А. ежегодно
Б. 1 раз в месяц
В. 1 раз в 6 месяцев
Г. не проводится
23. Акт об установке стерилизатора подписывается:
А) представителями местного отделения “Медтехника”
Б) представителями завода-изготовителя
В) главным врачом ЛПУ
Г) лицами учреждения, ответственными по надзору за безопасную эксплуатацию
24. Лицо, ответственное по надзору за стерилизаторами назначается из:
А) инженерно-технических работников
Б) медицинского персонала
25. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию стерилизаторов назначается из:
А) инженерно-технического персонала
Б) медицинских работников
В) фармацевтического персонала
26. Первая стерилизация (в начале смены) проводится в:
А) холодном стерилизаторе
Б) горячем стерилизаторе
В) предварительно разогретом стерилизаторе
27. В зависимости от расположения загрузочного проема стерилизаторы делятся на:
А) горизонтальные
Б) стационарные
В) вертикальные
Г) электрические
28. В зависимости от формы стерилизационной камеры стерилизаторы делятся на:
А) вертикальные
Б) круглые

В) прямоугольные
Г) электрические
29. Курсовое обучение персонала для работы на паровых стерилизаторах проводит:
А) ст. медсестра ЦСО
Б) зам. главного врача ЛПУ по ОМР
В) представитель “Медтехники”
Г) главный врач ЛПУ
30. Гидравлические испытания стерилизатора проводятся:
А) паром при давлении в 1,5 раза выше рабочего
Б) водой при давлении в 1,5 раза выше рабочего
В) водой при максимально разрешенном давлении
31. Плановая проверка манометра проводится:
А) 1 раз в год
Б) во время технического переосвидетельствования
В) по требованию техника
32. Работоспособность предохранительного клапана проверяется:
А) ежедневно перед началом работы
Б) ежедневно после отключения аппарата от сети
В) 1 раз в неделю
33. Электробезопасность парового стерилизатора обеспечивает:
А) предохранительный клапан
Б) заземление корпуса
В) деревянная решетка на полу
Г) диэлектрический коврик на полу
34. За документацию парового стерилизатора отвечает:
А) обслуживающий персонал
Б) ответственного лицо
В) главная медсестра
Г) инженер по технике безопасности
35. Фильтр для подачи воздуха в камеру предназначен для:
А) согревания воздуха
Б) очистки воздуха
В) стерилизация воздуха
Г) дезинфекции воздуха
36. Продувка камеры проводится:
А) в каждом цикле стерилизации
Б) только перед первым циклом
В) если проводилась доливка воды в парогенераторе
37. Вода наливается в парогенератор:
А) не менее 20 литров
Б) до середины водоуказательной колонки
В) столько, сколько хватит для стерилизации, но не выше верхней отметки на водоуказательной колонке
38. Предохранительный клапан необходим для:
А) сбрасывания избыточного давления пара из парогенератора
Б) удаления воздуха из камеры
В) регулировки режима стерилизации
39. Электроконтактный манометр необходим для:
А) измерения давления в камере
Б) измерения и поддержки рабочего давления в парогенераторе
В) измерения рабочей температуры
40. Единицы измерения давления пара:
А) кг/см^2
Б) атмосфера
В) мм рт. столба
Г) МПА
41. Паровой метод стерилизации – это стерилизация:
А) сухим горячим воздухом
Б) водяным насыщенным паром под избыточным давлением
42. Воздушный метод стерилизации – это стерилизация:
А) сухим горячим воздухом
Б) водяным насыщенным паром под избыточным давлением
43. Перед началом работы на стерилизаторе необходимо проверить:

А) защитное заземление
Б) исправность предохранительных клапанов
В) исправность контрольно-измерительных приборов
Г) все перечисленное
44. После окончания работы парового стерилизатора необходимо:
А) проверить исправность предохранительных клапанов
Б) проверить работу измерительных приборов
В) отключить электропитание
Г) убедиться в отсутствии давления в стерилизаторе
45. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации флаконов необходимо:
А) сразу же после окончания стерилизации
Б) не ранее 30 минут после окончания стерилизации
В) через 120 минут после окончания стерилизации
46. Источником ВИЧ-инфекции для человека являются:
А) домашние и дикие животные
Б) больные ВИЧ-инфекцией
В) инфицированные ВИЧ
47. Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией:
А) половой
Б) трансмиссивный
В) парентеральный
Г) перинатальный
48. Длительность вирусоносительства ВИЧ:
А) не более 15-30 дней
Б) до нескольких месяцев
В) до нескольких лет
Г) пожизненно
49. Теория происхождения, ВИЧ общепризнанная в мире в настоящее время:
А) искусственно созданный биологический объект
Б) результат изменения генома человека под влиянием природных факторов
В) африканская теория
50. Искусственный путь передачи ВИЧ-инфекции:
А) трансмиссивный
Б) парентеральный
В) перинатальный
Г) половой
51. Риск профессионального заражения при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при:
А) уколе иглой
Б) порезе острорежущим предметом
В) попадании на верхние дыхательные пути
52. Наиболее опасны для заражения биологические жидкости:
А) кал
Б) слюна
В) кровь
Г) сперма
53. Причина иммунодефицитного состояния при ВИЧ-инфекции заключается в:
А) поражении В-клеток
Б) поражении Т-лимфоцитов
В) поражении эритроцитов
54. Продолжительность стадии инкубации в соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции:
А) стадия инкубации длится от момента заражения до развития оппортунистических инфекций
Б) стадия инкубации длится от момента заражения до появления генерализованной лимфоаденопатии
В) стадия инкубации длится от момента заражения до выработки антител
55. В организме человека ВИЧ поражает:
А) эритроциты
Б) лимфоциты
В) тромбоциты
56. Причины, обуславливающие развитие, оппортунистических заболеваний, приводящих больного к смерти:
А) снижение иммунитета
Б) лейкоцитоз
В) лимфоцитоз
57. Симптомы, характерные для стадии вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции:

А) увеличение нескольких групп лимфоузлов
Б) диарея
В) снижение веса более 10%
Г) одышка и боли в сердце
58. Наиболее частые оппортунистические инфекции:
А) пневмоцистоз
Б) саркома Капоши
В) листериоз
59. Наиболее частые причины смерти при ВИЧ-инфекции:
А) туберкулез, токсоплазмоз, листериоз
Б) оппортунистические инфекции
В) онкологические заболевания
60. Лабораторные методы, используемые для диагностики ВИЧ:
А) реакция связывания комплимента (РСК) и реакция агглютинации (РА)
Б) реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)
В) иммуноферментный анализ (ИФА)
Г) иммуноблот (ИБ)
61. Условия хранения сывороток крови, отобранных для исследования на ВИЧ:
А) при температуре не выше 0^0С до 2 суток
Б) при температуре не выше +4^0С до 7 суток
В) при температуре не выше +8^0С до 3 суток
62. Правила доставки крови на ВИЧ-инфекцию в лабораторию:
А) в пробирках с резиновой пробкой попутным транспортом
Б) в пробирках на штативе любым медработником или водителем
В) в специальной металлической емкости со штативом в пробирках с пробками медработником или водителем, прошедшим инструктаж
63. При попадании ВИЧ-инфицированной крови на кожу, медсестра должна:
А) тщательно вымыть лицо мылом
Б) протереть лицо сухим ватным тампоном
В) протереть 70% раствором спирта, промыть водой с мылом, повторно обработать 70% раствором спирта
64. Доноры крови обследуются на. ВИЧ-инфекцию:
А) ежегодно
Б) 1 раз в 6 месяцев
В) при каждой сдаче крови
65. Наиболее эффективный метод в борьбе по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в мире в настоящее время:
А) вакцинация взрослого населения
Б) антибиотикотерапия
В) санитарно-просветительская работы, среди населения
Г) изоляция больных и инфицированных
66. За нарушение врачебной тайны при выявлении ВИЧ-инфицированных медработник несет от-ветственность в виде:
А) исправительных работ до 2 лет
Б) лишение права заниматься медицинской деятельностью на срок до 3-х лет
В) выговора
67. Мероприятия в отношении кормящих матерей, инфицированных ВИЧ:
А) ребенок изолируется от матери
Б) запрещается грудное вскармливание и осуществляется перевод ребенка на искусственное
В) ежемесячный анализ крови ребенка на ВИЧ-инфекцию
68. Материал, исследуемый от больного на ВИЧ-инфекцию:
А) мазок из зева
Б) кал
В) сыворотка крови
Г) моча
69. Наиболее верно утверждение:
А) заразившийся ВИЧ человек не заразен и не может стать источником инфекции до появления антител в крови
Б) ВИЧ-инфицированным называется. лицо от момента заражения до терминальной стадии заболевания
70. Человек считается ВИЧ-инфицированным, если:
А) антитела к ВИЧ к сыворотке крови выявлены метолом ИФА отечественными тест-системами с двумя положительными результатами из 2-х или-3-х анализов
Б) антитела к ВИЧ в сыворотке крови выявлены методом ИФА импортными тест-системами
В) антитела к ВИЧ в сыворотке крови выявлены методом иммунного блотинга

71. Перечислите основные симптомы ВИЧ-инфекции:
А) длительная лихорадка
Б) длительная диарея
В) снижение массы тела
Г) увеличение лимфоузлов
72. Возбудителем ВИЧ - инфекции является:
А) вирус
Б) простейшие
В) бактерии
73. Возбудитель ВИЧ-инфекции:
А) устойчив в окружающей среде
Б) не устойчив в окружающей среде
74. Источником ВИЧ-инфекции является:
А) вирусоносители, больные люди
Б) больные животные и человек
75. Заражение ВИЧ-инфекции может произойти при:
А) пользовании общей посудой
Б) при переливании крови, препаратов крови, при пересадке органов и тканей
В) при пользовании общим туалетом с ванной
76. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции:
А) до 7 дней
Б) до 30 дней
В) от 3 недель до 3 месяцев, иногда до года и более
77. Пути передачи внутрибольничной инфекции:
А) **парентеральный**
Б) контактный
В) воздушно-капельный
Г) фекально-оральный
Д) биологический
78. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:
А) направленных на пропаганду здорового образа жизни
Б) по профилактике внутрибольничной инфекции
79. Повторный осмотр на педикулез проводится:
А) ежедневно
Б) через 10 дней
В) при выписке пациента
80. Срок наблюдения за эпидемическим очагом исчисляется от:
А) **момента изоляции источника инфекции и проведения дезинфекции в очаге**
Б) момента выявления источника инфекции и перевод в инфекционную больницу
81.Обувь при грибковых заболеваниях кожи обрабатывается в:
А) паровоздушной, пароформалиновой камере
Б) 40% растворе уксусной кислоты
В) 5% растворе хлорамина
82 .К педикулицидам относятся:
А) лосьон «Ниттифор»
Б) препарат «Педилин»
В) формалин
Г) перекись водорода
83. Камерная дезинфекция белья, одежды пациента проводится при
А) обнаружении вшей
Б) общем загрязнении
В) госпитализации пациента
84. Факторы передачи при гепатите «В»:
А) кровь
Б) сперма
В) медицинский инструментарий
Г) продукты питания
Д) воздух
85. Инкубационный период гепатита «В»:
А) 35 дней
Б) 6 месяцев
В) 2 месяца

86. Постельные принадлежности пациента вирусным гепатитом подлежат:
А) камерной дезинфекции
Б) стирке в прачечной
В) дезинфекции в 2% р-ре соды
87. Факторы передачи гепатита «А»:
А) пищевые продукты, загрязненные выделениями больного
Б) руки медперсонала, загрязненные выделениями больного
В) шприцы медицинский инструментарий
88. Пути передачи гепатита «В»:
А) половой
Б) парентеральный
В) фекально-оральный
Г) аспирационный
89. Источник инфекции при гепатите «В»:
А) медицинский инструментарий
Б) больной гепатитом
В) вирусоноситель
Г) кровь
90. Пути передачи гепатита «А»:
А) половой
Б) парентеральный
В) фекально-оральный
91. Инкубационный период, гепатита «А»:
А) 35 дней
Б) 6 месяцев
В) 60 дней
92. Камерное обеззараживание постельных принадлежностей и белья относится к:
А) заключительной дезинфекции
Б) профилактической дезинфекции
93. Цель заключительной дезинфекции:
А) одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней среды
Б) изоляция пациента в отдельную палату исключение, контакта с родственниками и окружающими пациентами
94. От внутрибольничной инфекции могут пострадать:
А) амбулаторные пациенты
Б) госпитализированные больные
В) медицинский персонал
Г) родственники больного
95. Отделения повышенного риска по ВБИ:
А) ожоговое
Б) родильное
В) хирургическое
Г) урологическое
Д) терапевтическое
96. Причины роста внутрибольничной инфекции (ВБИ):
А) научно-технический прогресс в медицине
Б) применение новых дезинфицирующих средств
В) несоблюдение приказов по профилактике ВБИ
Г) низкий иммунитет населения к инфекционным заболеваниям
97. При выявлении инфекционного пациента в стационаре, персонал:
А) организует и проводит текущую дезинфекцию
Б) изолирует пациента от остальных и организует доставку пациента домой
В) срочно отправляет пациента, на любом транспорте, в инфекционную больницу
98. Задача текущей дезинфекции в очаге:
А) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых пациентами во внешнюю среду
Б) только уничтожение возбудителей анаэробной инфекции
99. Изделия из резины стерилизуются при режиме:
А) 1,1 атмосфера – 120^{0}С - 45минут
Б) 2 атмосферы – 180^{0}С - 30 минут
В) 2 атмосферы – 132^{0}С - 20 минут
100. Химический контроль стерильности при режиме 132^{0}С - 2 атмосферы - 20 минут:
А) МедТест132
Б) СтериТест132

В) Фармтест134
Г) Фармтест112
Д) Фармтест110
101. Неостывшие биксы из ЦСО выдавать:
А) разрешается
Б) не разрешается
В) разрешается в случае производственной необходимости
102. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксах без фильтра:
А) 3 суток
Б) 1 день
В) 20 суток
103. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в двойной мягкой упаковке из бязи:
А) **3 суток**
Б) 6 часов
В) 10 суток
104. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксе с фильтром:
А) 20 суток
Б) 3 суток
В) 6 часов
105. Химический контроль качества стерилизации при режиме 1,1 атмосфер – 120^0С - 45 мин:
А) МедТест 120^0С
Б) ТВИИС – 120^0С
В) СтериТест 120^0С
Г) никотинамид
106. Режимы при паровом методе стерилизации:
А) 2 атм. 132^0С - 20 минут
Б) 1,1 атм. – 120^0С - 45 минут
В) 160^0С - 2,5 часа
Г) 180^0С - 1 час
107. Объекты стерилизации при паровом методе стерилизации:
А) изделия из металла, стекла
Б) резиновые перчатки
В) текстильный материал
Г) только изделия из х/бумажной ткани
108. Время начала стерилизации при воздушном методе отсчитывается с:
А) момента поднятия температуры до 132^0С
Б) момента закрытия сухожарового шкафа
В) момента поднятия температуры до 160^0С
Г) момента поднятия температуры до 180^0С
109. После проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения проводится:
А) сушка горячим воздухом до полного исчезновения влаги
Б) стерилизация одним из методов, без предварительной сушки
В) сушка в открытом виде до полного исчезновения влаги
110. Методы стерилизации:
А) паровой
Б) воздушный
В) химический
Г) газовый
Д) механический
111. Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
А) металла
Б) хлопчатобумажной ткани
В) стекла
Г) резины
112. Раствор азопирама хранится:
А) на ярком свете
Б) вблизи нагревательных, приборов
В) в холодильнике
113. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением:
А) 2х - 3х капель раствора на кровяное пятно
Б) 2-3 капель раствора на стерильный ватный шарик
114. Для постановки фенолфталеиновой пробы готовят:

А) 1% спиртовой раствор фенолфталеина
Б) 5% спиртовой раствор фенолфталеина
115. Рабочий раствор азопирама готовят:
А) непосредственно перед постановкой пробы
Б) накануне, за день до постановки пробы
116. Рабочий раствор азопирама может быть использован в течение:
А) 1-2 часов
Б) 24 часов
В) 7 дней
117. При положительной азопирамовой пробе повторный контроль инструментов проводят:
А) ежедневно до получения 10 - кратного отрицательного результата
Б) до получения отрицательного результата
118. Мойка каждого изделия в моющем растворе проводится в течение:
А) 0,5 минут (30 секунд)
Б) 1 минуты (60 секунд)
119. Моющий раствор подлежит замене:
А) при изменении его окраски
Б) каждые три часа
В) при снижении температуры ниже 50^0С
120. Температура моющего раствора во время замочки инструментария:
А) поддерживается в пределах 40 -50^0С
Б) не поддерживается
В) поддерживается в зависимости от вида моющего средства
121. Наличие остатком моющих средств на инструментах проверяется с помощью:
А) фенолфталеиновой пробы
Б) азопирамовой или амидопириновой пробы
122. Положительная реакция на наличие скрытой крови дает:
А) розовое окрашивание
Б) сиренево-фиолетовое окрашивание
123. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводится в:
А) закрытых емкостях из стекла, пластмассы
Б) открытых емкостях, покрытых эмалью
В) закрытых емкостях, покрытых эмалью
124. Физический метод дезинфекции:
А) кипячение
Б) протирание
В) замачивание
125. Методы дезинфекции:
А) физический
Б) химической
В) биологический
126. Основной принцип асептики:
А) все, что попадает в рану должно быть уничтожено
Б) все, что соприкасается с раной должно быть стерильным
127. Дезинфекция уничтожает:
А) все формы жизнедеятельность микробов
Б) только вегетативные формы микробов
128. Инфекционная безопасность - это:
А) комплекс мероприятий по профилактике ВБИ
Б) обработка изделий медицинского назначения
129. Выбор метода стерилизации зависит от:
А) особенностей стерилизуемого изделия
Б) степени загрязненности изделия
130. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при повреждении
А) паренхиматозных органов
Б) капилляров
В) артерий
Г) вен
131. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:
А) височной кости
Б) углу нижней челюсти
В) поперечному отростку 6 шейного позвонка

Г) в надключичной ямке к 1 ребру
132. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к:
А) височной кости
Б) поперечному отростку 6 шейного позвонка
В) углу нижней челюсти
Г) в надключичной ямке к 1 ребру
133. Временный гемостаз при ранении сонной артерии
А) наложение давящей повязки
Б) наложение окклюзионной повязки
В) наложение жгута с противоупором
Г) наложение жгут-закрутки.
134. Метод временного гемостаза при артериальном кровотечении
А) возвышенное положение конечности
Б) наложение пузыря со льдом
В**) пальцевое прижатие**
Г) перевязка сосудов
135. Способ временного гемостаза при венозном кровотечении
А) максимальное сгибание конечности в суставе
Б) давящая повязка, возвышенное положение конечности
В) наложение кровоостанавливающего жгута
Г) пальцевое прижатие на протяжении
136. Для остановки артериального кровотечения из раны в области кисти необходимо
А) наложить давящую повязку
Б) наложить жгут выше места ранения
В) наложить герметичную повязку
Г) произвести пальцевое прижатие
137. Показание для наложения кровоостанавливающего жгута
А) желудочное кровотечение
Б) кровотечение из вен голени
В) кровотечение из крупных артерий
Г) кровотечение из крупных вен шеи
138. Признак правильности наложения жгута
А) синюшность кожных покровов
Б) отсутствие чувствительности ниже жгута
В) бледность кожных покровов
Г) отек кожи ниже жгута
139. Подручное средство для остановки артериального кровотечения
А) провод
Б) ремень
В) капроновая нить
Г) веревка
140. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку летом
А) 30 минут
Б) 1 час
В) 2 часа
Г) 3 часа
141. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута взрослому человеку зимой
А) 30 минут
Б) 1 час
В) 2 часа
Г) 3 часа
142. Основной опасностью при ранении яремной вены является
А) воздушная эмболия
Б) быстрое развитие острого малокровия
В) инфицирование
Г) клиническая смерть
143. Временный гемостаз при ранении яремной вены
А) наложение давящей повязки
Б) наложение окклюзионной повязки
В) наложение кровоостанавливающего жгута
Г) пальцевое прижатие
144. Меры оказания первой помощи при носовом кровотечении

А) холод на переносицу, пальцевое прижатие крыльев носа к носовой перегородке
Б) дать понюхать нашатырный спирт
В) запрокинуть голову
Г) дать успокаивающее средство
145. Положение больного с носовым кровотечением
А) сидя, запрокинув голову
Б) лежа на спине
В) сидя, слегка опустив голову
Г) лежа на животе
146. Первая помощь при желудочно-кишечном кровотечении
А) грелка на живот
Б) холод на живот, введение гемостатических средств
В) введение анальгетиков
Г) введение спазмолитиков
147.Транспортировка пострадавшего с желудочно-кишечным кровотечением
А) лежа на спине без подушки
Б) лежа на животе
В) сидя
Г) полусидя
148. Транспортировка пострадавшего с легочным кровотечением
А) лежа
Б) сидя
В) полусидя
Г) лежа на животе
149. Абсолютный симптом перелома кости
А) боль
Б) патологическая подвижность
В) отек
Г) деформация
150.Вид переломов костей, который чаще всего наблюдается у детей
А) неполные
Б) полные
В) по типу «зеленой веточки»
Г) компрессионные
151. Первоочередное мероприятие у больного с открытым переломом и артериальным кровотечением
А) иммобилизация конечности
Б) наложение жгута на конечность
В) наложение асептической повязки на место перелома
Г) наложение холода на место перелома
152. Доврачебная помощь при переломе кости
А) наложение фиксирующей повязки
Б) наложение гипсовой повязки
В) транспортная иммобилизация
153. Транспортная иммобилизация при переломе предплечья
А) пальцы – лопатка здоровой стороны
Б) пальцы – лопатка больной стороны
В) пальцы – средняя треть плеча
Г) лучезапястный сустав – плечевой сустав
154. При переломе бедра фиксируют
А) голеностопный сустав
Б) голеностопный – коленный суставы
В) пальцы стопы – голеностопный сустав
Г) голеностопный – коленный – тазобедренный сустав
155. Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости
А) лучезапястный сустав – плечевой сустав
Б) локтевой сустав – плечевой сустав
В) пальцы – лопатка больной стороны
Г) пальцы – лопатка здоровой стороны
156. При переломе голени фиксируют
А) пальцы стопы – голеностопного сустава
Б) голеностопный – коленный сустав
В) голеностопный сустав

Г) голеностопный – коленный – тазобедренный суставы
157. Абсолютный симптом вывиха
А) боль в зоне травмы
Б) болезненная припухлость
В) кровоизлияние в зоне травмы
Г) пружинящая фиксация
158. Первая помощь при вывихе:
А) наложение давящей повязки
Б) тепло на месте повреждения
В) транспортная иммобилизация
Г) асептическая повязка
159. Доврачебная помощь при ушибе мягких тканей
А) наложение фиксирующей повязки, холод
Б) наложение гипсовой повязки
В) транспортная иммобилизация
Г) согревающие компрессы
160. Первая помощь при случайной ране
А) остановка кровотечения, мазевая повязка
Б) остановка кровотечения, асептическая повязка
В) остановка кровотечения, гипсовая повязка
Г) введение антибиотиков
161. Первая медицинская помощь при термическом ожоге
А) обработка поверхностей ожога спиртом;
Б) смазывание поверхностей ожога мазью;
В) обработка раствором марганца;
Г) холод, обезболивание, наложение сухой повязки.
162. Охлаждение поверхности ожога холодной водой показано:
А) в первые минуты после травмы
Б) перед каждой перевязкой
В) только при ожоге первой степени
Г) не показано
163. Доврачебная помощь при отморожениях 1 степени
А) растирание пораженной части тела водкой или спиртом
Б) удаление пузырей
В) растирание участков тела снегом
Г) новокаиновая блокада.
164. При электротравме оказание неотложной помощи должно начинаться с
А) непрямого массажа сердца
Б) перикардиального удара
В) прекращение воздействия электрического тока
Г) ИВЛ