### Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело»

для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации

# «Сестринская помощь гинекологическим больным»

- 1.Средняя продолжительность менструального цикла:
  - А) 22 дня
  - Б) 45 дней
  - В) 28 дней
  - Г) 35 дней
  - Д) 38 дней
- 2. Среднее количество крови, которое теряет женщина во время менструации за 1 день:
  - A) 150 200 мл
  - $\mathbf{F}$ ) 40 60 мл
  - B) 60 100 мл
  - $\Gamma$ )  $100 150 \, \text{мл}$
  - Д) более 200 мл
- 3. Характеристика физиологической менструации:
  - А) нерегулярная, длительная
  - Б) умеренная, безболезненная
  - В) длительная, скудная.
- 4.В фолликулярной фазе менструального цикла происходит:
  - А) регенерация функционального слоя эндометрия
  - Б) повышение в крови содержания эстрогенов
  - В) рост фолликула в яичнике
  - Г) развитие желтого тела в яичнике
- 5. Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной только в случае, если:
  - А) полноценная фаза пролиферации
  - Б) произошла овуляция
  - В) функционирует полноценное желтое тело
- 6.О произошедшей овуляции можно судить по:
  - А) подъему базальной температуры
  - Б) беременности
  - В) повышению уровня прогестерона
  - Г) состоянию эндометрия
  - Д) наступлению менструации
- 7. Гипоталамус вырабатывает:
  - А) гонадотропины
  - Б) эстрогены
  - В) гестагены
  - Г) рилизинг гормоны
- 8.Гипофиз вырабатывает:
  - А) гонадотропины
  - Б) эстрогены
  - В) гестагены
  - $\Gamma$ ) рилизинг гормоны
- 9.Эстрогены:
  - А) определяют развитие вторичных половых признаков
  - Б) снижают тонус матки
  - В) повышают сократимость маточных труб
  - Г) вызывают слущивание влагалищного эпителия
- 10.К тестам функциональной диагностики относятся:
  - А) исследование шеечной слизи
  - Б) измерение базальной температуры
  - В) кольпоскопия
- 11. Вторая степень чистоты влагалищного мазка:
  - А) в мазке много эпителиальных клеток
  - Б) реакция влагалищного содержимого кислая
  - В) в мазке есть влагалищные бациллы
  - Г) лейкоцитов в мазке 5-6 в поле зрения
  - Д) лейкоциты сплошь
- 12. Методы гормонального исследования в гинекологии:
  - А) определение гормонов в крови

- Б) тесты функциональной диагностики В) гормональные пробы Г) бактериологическое исследование 13. Показание к проведению кольпоскопии:
  - А) бесплодие
  - Б) подозрение на порок развития гениталий
  - В) подозрение на фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки
  - Г) невынашивание беременности
  - Д) маточное кровотечение
- 14. Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:
  - А) кольпоскопия
  - Б) лапароскопия
  - В) УЗИ
  - Г) гистероскопия
  - Д) цистоскопия
- 15. Показания для гистеросальпингографии:
  - А) подозрение на трубное бесплодие
  - Б) подозрение на внутренний эндометриоз
  - В) подозрение на аномалии развития матки
  - Г) эрозия шейки матки
- 16. Показания к гистероскопии:
  - А) дисфункциональные маточные кровотечения
  - Б) кровотечения в постменопаузе
  - В) подозрения на внематочную беременность
  - Г) эрозия шейки матки
  - Д) бесплодие
- 17. Показания к диагностической гистероскопии:
  - А) рецидивирующие маточные кровотечения в репродуктивном периоде
  - Б) кровотечения в постменструальном периоде
  - В) аномалии развития матки
  - Г) эктопическая беременность
- 18. Методы исследования эндометрия:
  - А) биопсии эндометрия
  - Б) гистероскопия
  - В) кульдоцентез
  - Г) гистерография
- 19. Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:
  - А) кольпоскопия
  - Б) лапароскопия
  - В) УЗИ
  - Г) гистероскопия
- 20. Диагностическая ценность лапароскопии в гинекологии особенно высока при:
  - А) прогрессирующей внематочной беременности
  - Б) маточной беременности
  - В) опухоли яичника
  - Г) миомы матки
- 21.К методам диагностики патологии шейки матки относятся
  - А) гормональное исследование
  - Б) кольпоскопия
  - В) цервикогистеросальпингография
  - Г) кюретаж цервикального канала
- 22. Возможным источником кровотечения из яичника может быть:
  - А) желтое тело
  - Б) фолликулярная киста яичника
  - В) киста желтого тела
  - Г) склеротически измененный яичник
- 23. Сперматозоиды после проникновения в матку и маточные трубы сохраняют способность к оплодотворению в течение:
  - А) 6-12 часов
  - Б) 24-48 часов
  - В) 3-5 суток
  - Г) 10 суток

# 24. После овуляции яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение:

- А) 6 часов
- Б) 12-24 часов
- А) 3-5 суток
- Г) 10 суток

## 25. Причины бесплодия женщин в браке:

- А) воспалительные заболевания половых органов
- Б) инфантилизм и гипоплазия половых органов
- В) общие истощающие заболевания и интоксикации
- Г) эрозия шейки матки

## 26.В группу высокого риска развития опухолей яичников включают женщин:

- А) длительно использующих гормональную контрацепцию
- Б) с нарушениями менструальной и репродуктивной функции
- В) с ожирением и гиперлипидемией
- Г) имеющих наследственно обусловленную предрасположенность к развитию рака органов репродуктивной системы

# 27.Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у молодых женщин:

- А) удаление придатков
- Б) резекция яичника с возможно большим сохранением здоровой ткани органа
- В) надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения
- Г) удаление яичника на стороне поражения
- 28. Трофобластическая болезнь это:
  - А) саркома матки
  - Б) миома матки
  - В) кистома яичника
  - Г) хорионэпителиома
  - Д) рак тела матки
- 29.Основной метод диагностики рака тела матки:
  - А) гистологическое исследование соскоба эндометрия
  - Б) цитологическое исследование
  - В) трансвагинальная эхография
  - Г) гистерография
  - Д) рентгенотелевизионная гистеросальпингография
- 30.Основной клинический симптом рака тела матки:
  - А) хроническая тазовая боль
  - Б) контактные кровотечения
  - В) ациклические кровотечения
  - Г) нарушение функции соседних органов
  - Д) бесплодие
- 31.К фоновым заболеваниям шейки матки относятся:
  - А) простая лейкоплакия
  - Б) дисплазия
  - В) эритроплакия
  - Г) эктропион
  - Д) рецидивирующеий полип канала шейки матки
- 32. Аплазия влагалища это:
  - А) первичное отсутствие части влагалища
  - Б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным процессом в анте- и постнатальном периоде
  - В) первичное полное отсутствие влагалища
  - Г) полная перегородка во влагалище
- 33. Атрезия влагалища это:
  - А) первичное отсутствие части влагалища
  - Б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным процессом в анте- и постнатальном периоде
  - В) первичное полное отсутствие влагалища
  - Г) полная перегородка во влагалище

### 34. Эндометриоз - это:

- А) дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия
- Б) доброкачественное разрастание ткани, подобной эндометрию
- В) опухолевидный процесс
- Г) воспалительный процесс
- 35. Трубный аборт надо дифференцировать с:
  - А) самопроизвольным выкидышем малого срока
  - Б) обострением хронического сальпингоофорита
  - В) лейкоплакией шейки матки
- 36.У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника показанием к операции является:
  - А) наличие воспаления придатков в анамнезе
  - Б) дисфункция яичников в анамнезе
  - В) болевой синдром
  - Г) внутрибрюшное кровотечение
- 37. Апоплексия яичника чаще наступает в:
  - А) период овуляции
  - Б) стадию васкуляризации желтого тела
  - В) период созревания граафова фолликула
  - Г) период атрезии фолликулов
- 38.Для апоплексии яичника характерно все, кроме:
  - А) болей внизу живота
  - Б) внутреннего кровотечения
  - В) отрицательных биологических реакций на беременность
  - Г) выраженного лейкоцитоза
  - Д) симптомов раздражения брюшины
- 39. Возможные причины возникновения внематочной беременности:
  - А) инфантилизм
  - Б) инфекции органов малого таза
  - В) эндокринопатия
  - Г) пиелонефрит
  - Д) миома матки
- 40. Признаки нарушенной эктопической беременности по типу трубного аборта:
  - А) приступообразные боли
  - Б) кровянистые выделения из половых путей
  - В) обморочные состояния
- 41. Причины внутрибрюшного кровотечения:
  - А) апоплексия яичника
  - Б) перфорация матки во время аборта
  - В) перекрут ножки опухоли яичника
  - Г) разрыв кисты желтого тела
  - Д) нарушенная эктопическая беременность
- 42.Внематочная беременность может локализоваться в:
  - А) шейке матки
  - Б) рудиментарном роге матки
  - В) яичнике
  - Г) брюшной полости
  - Д) влагалище
- 43.Осложнением медицинского аборта не является:
  - А) бесплодие
  - Б) нарушение функции яичников
  - В) эндометрит
  - Г) перфорация матки
  - Д) цистит
- 44. Фактор риска эктопической беременности:
  - А) гипоплазия матки
  - Б) оральная контрацепция
  - В) пиелонефрит
  - Г) кесарево сечение в анамнезе
  - Д) эндометриоз
- 45.Клинические симптомы перекрута ножки кистомы яичника:

- А) резкие боли в нижних отделах живота
  Б) положительный симптом Щеткина-Блюмберга
  В) тошнота, рвота
  Г) повышение температуры
  - Д) иррадиация боли в плечо
- 46. Возможные причины опущения и выпадения матки:
  - А) травма промежности в родах
  - Б) резкое похудание
  - В) атрофия тканей в пожилом возрасте
  - Г) заболевания шейки матки
- 47. Стадии самопроизвольного аборта, при которых возможно сохранение беременности:
  - А) угрожающий
  - Б) начавшийся
  - В) в ходу
  - Г) неполный
  - Д) полный
- 48. Пельвиоперитонит это
  - А) воспаление брюшины малого таза
  - Б) воспаление клетчатки малого таза
  - В) воспаление серозного покрова матки
- 49. Критерии излеченности больных гонореей устанавливаются после лечения в течение:
  - А) одного месяца
  - Б) двух месяцев
  - В) трех месяцев
  - Г) четырех месяцев
  - Д) пяти месяцев
- <u>50.Эндометрит это:</u>
  - А) воспаление маточной трубы
  - Б) воспаление мышцы матки
  - В) воспаление брюшины
  - Г) воспаление околоматочной клетчатки
  - Д) воспаление слизистой оболочки матки
- 51.Основная триада жалоб гинекологических пациентов:
  - А) боли, тошнота, кровотечения
  - Б) боли, бесплодие, бели
  - В) боли, бели, кровотечения
  - Г) бели, кровотечения, бесплодие
- 52. Клинические симптомы острого сальпингоофорита:
  - А) повышение температуры, озноб
  - Б) нарушение менструального цикла
  - В) боли в гипогастрии
  - Г) гнойные выделения из половых путей
  - Д) ощущение излившейся в брюшную полость жидкости
- 53. Современными методами контрацепции являются:
  - А) барьерные
  - Б) гормональные
  - В) химические
  - Г) ритмические
- 54. Возможные осложнения гормональной контрацепции:
  - А) гипертензия
  - Б) тромбофлебиты
  - В) циститы
  - Г) кольпиты
- 55. Возможные осложнения при использовании ВМС:
  - А) полименорея
  - Б) аменорея
  - В) анемия
  - Г) боли
- 56.Срок беременности определяют по:
  - А) анамнезу
  - Б) сомнительным признакам
  - В) данным УЗИ

- Г) вероятным признакам 57.Позиция плода – это:
  - А) отношение спинки плода к плоскостям таза
  - Б) отношение спинки плода к боковым сторонам матки
  - В) положение спинки плода по отношению к передней и задней стенкам матки
  - Г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз
- 58.Положение плода это:
  - А) отношение продольной оси плода к продольной оси матки
  - Б) отношение спинки плода к стенке матки
  - В) отношение головки к плоскостям таза
  - Г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз
- 59. Диагональная конъюгата измеряется:
  - А) при влагалищном исследовании
  - Б) в сантиметрах
  - В) по ромбу Михаэлиса
  - Г) тазомером
- 60. Антенатальная охрана плода это:
  - А) медицинская помощь во время родов
  - Б) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для женщин до беременности
  - В) дородовая профилактическая помощь
  - Г) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для беременных женщин
- 61. Факторы, вызывающие гипотрофию плода:
  - А) гестозы
  - Б) пороки сердца
  - В) хроническая интоксикация
  - $\Gamma$ ) излитие вод
- 62.Отрицательное влияние на эмбрион оказывают:
  - А) антибиотики
  - Б) гормональные препараты
  - В) витамины
  - Г) глюкоза
- 63. Врожденные заболевания плода возникают в период:
  - А) неонатальный
  - Б) перинатальный
  - В) эмбриогенеза
  - Г) фетогенеза
- 64. При резус-конфликте у беременной развиваются:
  - А) слабость
  - Б) гестозы
  - В) анемия
  - Г) гемолитическая болезнь
- 65. Прерывание беременности показано при:
  - А) активном ревмокардите
  - Б) недостаточности кровообращения II-III стадии
  - В) мерцательной аритмии
  - Г) гипотонии
- 66.Aборт это:
  - А) прерывание беременности в любые сроки
  - Б) медицинская операция
  - В) прерывание беременности до 27-недельного срока
  - Г) метод регулирования семьи
- 67.Стадии аборта:
  - А) полный
  - Б) неполный
  - В) в ходу
  - Г) мини-аборт
- 68.Возможные сложнения абортов:
  - А) травма шейки матки
  - Б) травма полости матки
  - В) воспаление матки
  - Г) травма промежности
- 69. Тазовое дно состоит из:

- А) трех слоев мышц и фасций
- Б) наружного и внутреннего слоя мышц
- В) мочеполовой диафрагмы
- Г) соединительной ткани
- 70. Для определения чистоты влагалища берутся мазки из:
  - А) уретры
  - Б) цервикального канала
  - В) заднего свода влагалища
  - Г) нижней трети влагалища
- 71. При кольпоскопии определяют:
  - А) размеры шейки матки
  - Б) рельеф слизистой оболочки цервикального канала
  - В) рельеф слизистой оболочки шейки матки и характер сосудов
  - Г) наличие псевдоэрозии шейки матки
- 72. При бимануальном исследовании определяется:
  - А) величина матки
  - Б) подвижность матки
  - В) величина яичников
  - Г) проходимость труб
- 73. Характерные черты современной гинекологии:
  - А) проведение массовых профилактических мероприятий
  - Б) оздоровление труда и быта женщин
  - В) своевременное выявление онкозаболеваний
  - Г) проведение рациональной комплексной терапии
- 74. Менструальная функция регулируется гормонами:
  - А) гипоталамическими
  - Б) яичниковыми
  - В) маточными
  - Г) гипофизарными
- 75. Лютеиновая фаза это:
  - А) вторая фаза менструального цикла
  - Б) период от овуляции до начала менструации
  - В) фаза развития желтого тела
  - Г) период десквамации
- 76.Менструация это:
  - А) период овуляции
  - Б) десквамация эпителия
  - В) период менархе
  - Г) фаза менструального цикла
- <u>77. Аменорея − это</u>:
  - А) нарушение менструального цикла
  - Б) отсутствие месячных более 6 месяцев
  - В) обильные месячные
  - Г) скудные месячные
- 78.К воспалительным заболеваниям наружных половых органов женщины относятся:
  - А) вульвит
  - Б) бартолинит
  - В) эндометрит
  - Г) цервицит
- 79.К воспалительным заболеваниям внутренних половых органов женщины относятся:
  - А) бартолинит
  - Б) вульвит
  - В) сальпингит
  - Г) оофорит
- 80.К специфическим воспалительным заболеваниям гениталий относятся:
  - А) гонорея
  - Б) туберкулез
  - В) трихомоноз
  - Г) бартолинит
- 81.Симптомы трихомоноза:
  - А) атрофия слизистых оболочек
  - Б) гиперемия слизистых оболочек

# В) жжение и зуд в области половых губ Г) пенистые зеленоватые бели 82.Средства, обладающие противотрихомонадным действием: А) осарсол

- Б) трихопол
- В) метронидазол
- Г) спирин

#### 83. Провокация гонореи — это:

- А) искусственная активизация возбудителя
- Б) естественная активизация гонококка
- В) введение специальных химических препаратов
- Г) применение гоновакцины

#### 84. Вирусные заболевания женских половых органов:

- А) герпетические высыпания
- Б) ВИЧ-инфекция
- В) остроконечные кондиломы
- Г) эндоцервициты

#### 85. Фибромиома матки – это:

## А) доброкачественная опухоль из гладкомышечных и соединительных тканей матки

- Б) доброкачественная опухоль из соединительных тканей
- В) злокачественная опухоль
- Г) предраковое состояние

## 86. Возможные осложнения фибромиомы матки:

- А) развитие хорионэпителиомы
- Б) перекрут ножки узла
- В) бесплодие
- Г) анемия

## <u>87.Эндометриоз – это:</u>

- А) доброкачественный процесс
- Б) разрастание эндометрия

## В) разрастание ткани, функционально и морфологически сходной с эндометрием

Г) гормонозависимая опухоль

#### 88.При эндометриозе отмечаются:

- А) болезненные менструации
- Б) нарушение менструального цикла
- В) ухудшение общего состояния перед месячными
- Г) сепсис

## 89. Доброкачественные опухоли яичников:

- А) кистома
- Б) саркома
- В) фиброма
- Г) опухоль Крукенберга

# 90.<u>Киста яичника – это:</u>

- А) воспалительное заболевание
- Б) ретенционное образование
- В) истинное образование
- Г) доброкачественная опухоль

# 91.Генитальный инфантилизм – это:

- А) симптом нейроэндокринной патологии
- Б) причина бесплодия
- В) причина невынашивания
- Г) отсутствие матки

# 92.Опущение и выпадение матки происходят при:

- А) потере тонуса мышц тазового дна
- Б) разрывах мышц тазового дна
- В) разрывах промежности І степени
- Г) разрывах шейки матки

#### 93. Причины бесплодного брака:

- А) инфекционные заболевания
- Б) аборты
- В) инфантилизм
- Г) двухфазный цикл

## 94. Причины женского бесплодия:

- А) генетические нарушения
- Б) врожденные заболевания
- В) венерические болезни
- Г) иммунодефицит

#### 95.Положение матки и придатков в малом тазу зависит от:

- А) состояния брюшного пресса
- Б) тазового дна
- В) аппарата матки
- Г) фазы цикла

## 96.Псевдоэрозия шейки матки является:

- А) онкозаболеванием
- Б) факультативным (фоновым) процессом
- В) предраковым заболеванием
- Г) хроническим процессом
- 97. Лейкоплакия это:
  - А) фоновое заболевание
  - Б) злокачественный процесс
  - В) ороговевание плоского эпителия
  - Г) гипертрофия эпителия

## 98.Стремительно развивающийся шок:

- А) травматический.
- Б) геморрагический
- В) анафилактический
- Г) гемотрансфузионный
- 99.Признак артериального кровотечения:
  - А) медленное вытекание крови из раны
  - Б) темно-вишнёвый цвет крови
  - В) сильная пульсирующая струя крови
  - Г) образование гематомы

#### 100.Показание к наложению жгута:

- А) венозное кровотечение
- Б) артериальное кровотечение
- В) внутреннее кровотечение
- Г) кровотечение в просвет полого органа
- 101.Окклюзионную повязку накладывают при:
  - А) закрытом переломе ребер
  - Б) открытом переломе ребер
  - В) ушибе грудной клетки
  - Г) переломе ключицы

# 102. Первая помощь при потере сознания:

- А) абсолютный покой
- Б) абсолютный покой, голову поворачивают набок
- В) абсолютный покой, голову поворачивают набок, дальнейшие действия зависят от причины, вызвавшей потерю сознания
- Г) холод на голову

# 103. Первая помощь при гипогликемической предкоме:

- А) срочно ввести инсулин
- Б) дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
- В) срочно доставить в ЛПУ
- Г) сделать непрямой массаж сердца
- 104. При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к:
  - А) ребру
  - Б) поперечному отростку VI шейного позвонка
  - В) середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы
  - Г) ключице
- 105.Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:
  - А) 96% этиловым спиртом
  - Б) холодной водой до онемения
  - В) стерильным новокаином
  - Г) жиром

## 106. Принципы оказания помощи при химических ожогах:

- А) по возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой
- Б) промывание холодной водой в течение часа
- В) анальгетики, начиная со второй степени сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности
- Г) присыпать тальком
- 107. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:
  - А) начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока
  - Б) освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию
  - В) облить водой
- 108. Наибольшее значение в уменьшении безвозвратных потерь придают своевременному оказанию:
  - А) первой медицинской и доврачебной помощи
  - Б) доврачебной и врачебной помощи
  - В) врачебной и квалифицированной помощи
  - Г) специализированной помощи
- 109. Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:
  - А) наложение жгута
  - Б) тампонада раны
  - В) тугая давящая повязка
  - Г) закрутка
- 110.Шок это:
  - А) острая сосудистая недостаточность
  - Б) острая сердечная недостаточность
  - В) острая дыхательная недостаточность
- 111.До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно:
  - А) поставить очистительную клизму
  - Б) положить на живот горячую грелку
  - В) положить на эпигастрий пузырь со льдом
- 112. Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой:
  - А) 12 градусов С
  - **Б) 18-20 градусов С**
  - В) 24-36 градусов С
- 113. При применении каких медикаментов могут возникнуть аллергические реакцииу больного:
  - А) лидокаин
  - Б) дикаин
  - В) тримекаин
  - Г) физиологический раствор
  - Д) кордиамин
- 114. Неотложная помощь при ожогах:
  - А) анальгин
  - Б) асептическая повязка
  - В) обильное питье
  - Г) димедрол
  - Д) грелка
- 115. Неотложная помощь при травматическом шоке:
  - А) обезболивание
  - Б) иммобилизация
  - В) остановка кровотечения
  - Г) седуксен
  - Д) эфедрин
- 116. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме:
  - А) холод
  - Б) обтирание спиртом
  - В) тепло
  - Г) новокаин
  - Д) анальгин
- 117. При отморожении первая помощь состоит в:
  - А) наложении термоизолирующей повязки
  - Б) погружении в горячую воду
  - В) растирании снегом и шерстью

- Г) наложении масляно бальзамической повязки
- 118.К ранним симптомам биологической смерти относится:
  - А) помутнение роговицы
  - Б) трупное окоченение
  - В) трупные пятна
  - Г) расширение зрачков
  - Д) деформация зрачков
- 119. При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть:
  - А) 1-2 см
  - Б) 2-4 см
  - В) 4-5 см
  - Г) 6-8 см
- 120. Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт:
  - А) промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь
  - Б) вызывать рвоту
  - В) дать слабительное
  - Г) поставить клизму
- 121. Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является:
  - А) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи
  - Б) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза
  - В) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
  - Г) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи
- 122.Выведение нижней челюсти при ИВЛ:
  - А) предупреждает регургитацию желудочного содержимого
  - Б) устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)
  - В) создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента
- 123. Доврачебная неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы:
  - А) ингаляция беротока или сальбутамола (1 доза)
  - Б) ингаляция кислорода
  - В) инъекция эуфиллина 2,4 % 10,0
- 124. Неотложная помощь при приступе стенокардии:
  - А) обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг, контрль АД
  - Б) измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг
  - В) измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50% 2 мл
- 125.Первыми признаками развивающего травматического шока являются:
  - А) резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот
  - Б) психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния
  - В) судороги, апатия, потоотделение
  - Г) гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации
- 126.Неотложная помощь при тяжелом коллапсе:
  - А) внутривенно ввести преднизолон 30- 60 мг( или дексаметазон 8 мг), обеспечить инфузию 200 мл физ. раствора
  - Б) внутривенно ввести адреналин 1 мл
  - В) внутривенно ввести глюкозу 5% 200 мл
  - Г) внутривенно ввести мезатон 1% 1мл
- 127.Во время коллапса кожные покровы:
  - А) бледные, сухие, теплые
  - Б) бледные, влажные, прохладные
  - В) гиперемированные, сухие
  - Г) гиперемированные, влажные
- 128. При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются:
  - А) бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение
  - Б) цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания
  - В) бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия
- 129.Обморок это:
  - А) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
  - Б) аллергическая реакция
  - В) потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса
- 130.Показателями эффективной реанимации являются:
  - А) появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет
  - Б) расширенные зрачки
  - В) правильный массаж сердца

## 131.К методам временной остановки кровотечения относятся

- А) перевязка сосуда в ране
- Б) перевязка сосуда на протяжении
- В) наложение кровоостанавливающего жгута
- Г) форсированное сгибание конечностей
- 132. Общение в деятельности медицинского работника это:
  - А) обмен информацией
  - Б) обмен эмоциями
  - В) обмен информацией и эмоциями
- 133.К вербальным средствам общения относится:
  - А) поза
  - Б) речь
  - В) взгляд
  - Г) жест
- 134. Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после аварийной ситуации:
  - А) только после аварийной ситуации
  - Б) после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев
  - В) после аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев
- 135. Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции:
  - А) половой
  - Б) вертикальный
  - В) трансфузионный
- 136. Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции:
  - А) трансфузионный
  - Б) при употреблении в/в наркотиков
  - В) через медицинсекие отходы, не прошедшие дезинфекцию
  - Г) аэрогенный
- 137. Пути передачи вирусных гепатитов В, С:
  - А) половой путь
  - Б) парентеральный путь
  - В) вертикальный путь
  - Г) воздушно-капельный путь
  - Д) фекально-оральный
- 138. При сборе медицинских отходов запрещается:
  - А) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)
  - Б) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции
  - В) собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов
  - $\Gamma$ ) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов
- 139. Для обработки рук перед выполнением инъекции можно использовать:
  - А) 70% этиловый спирт
  - Б) одноразовые спиртовые салфетки
  - В) хлоргексидин спиртовой раствор 0,5%
  - Г) раствор хлормисепта 0,5%
- 140. Дезиконт (индикаторные полоски) используют для:
  - А) определения концентрации дезинфицирующего средства
  - Б) определения неправильно приготовленного дезинфицирующего раствора
  - В) определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды
- 141. Кожный антисептик применяют для:
  - А) гигиенической обработки рук
  - Б) после приготовления пищи
  - В) хирургической обработки рук
- 142. Моюще-дезинфицирующее средство используют для:
  - А) дезинфекции использованного инструментария
  - Б) дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария
  - В) дезинфекции и стерилизации инструментария
- 143. Проводить дезинфекцию использованного одноразового инструментария:
  - А) необходимо
  - Б) не обязательно
- 144. Сбор отходов класса А осуществляется в:

- А) многоразовые емкости
- Б) одноразовые пакеты белого цвета
- В) одноразовые пакеты желтого цвета
- Г) одноразовые пакеты красного цвета
- 145.Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) осуществляется в:
  - А) одноразовые пакеты белого цвета
  - Б) одноразовые пакеты желтого цвета
  - В) одноразовые пакеты красного цвета
- 146. Утилизация медицинских отходов проводиться согласно:
  - А) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
  - Б) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»
  - В) СанПиН 2.1.7.28-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ"
- 147.ВИЧ-инфекция не передается при:
  - А) рукопожатии
  - Б) использовании одного шприца, несколькими лицами
  - В) кашле, чихании
  - Г) пользовании туалетами или душевыми
  - Д) от инфицированной матери плоду
- 148. ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги
  - А) должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе
  - Б) не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе
- 149. Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:
  - А) ежедневно
  - Б) 1 раз в неделю
  - В) 1 раз в месяц
  - Г) при каждом включении установки
- 150.Высока вероятность инфицирования ВИЧ при:
  - А) половом контакте с ВИЧ-инфицированным
  - Б) проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным
  - В) совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным наркотических веществ,
  - Г) рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной
- 151. На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно:
  - А) беременные женщины
  - Б) больные с поражениями легких
  - В) больные парентеральными вирусными гепатитами
  - Г) доноры крови и органов
- 152. Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
  - А) металла
  - Б) хлопчатобумажной ткани
  - В) стекла
  - Г) силиконовой резины
- 153.«Дезинфекция» это
  - А) уничтожение патогенных микроорганизмов
  - Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
  - В) уничтожение грибков
  - Г) уничтожение вирусов
- 154. Для стерилизации применяются средства, обладающие:
  - А) статическим действием
  - Б) вирулицидным действием
  - В) спороцидным действием
  - Г) фунгицидным действием
- 155. «Стерилизация» это
  - А) уничтожение патогенных бактерий
  - Б) уничтожение микробов на поверхности
  - В) уничтожение инфекции
  - Г) освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение
- 156. Пути передачи внутрибольничной инфекции:
  - А) парентеральный

- Б) контактный
- В) воздушно-капельный
- Г) биологический
- Д) химический

## 157.Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к классу:

- А) А (эпидемиологически безопасные)
- Б) Б (эпидемиологически опасные)
- В) В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)
- Г) Г (токсикологически опасные)
- Д) Д (радиоактивные)

## 158.Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий

- А) по профилактике экзогенных интоксикаций
- Б) направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
- В) по профилактике внутрибольничной инфекции
- 159.Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом биксе со штатным фильтром:
  - А) 3 суток
  - Б) 20 суток
  - В) 30 суток

## 160.Стерильный стол накрывают:

- А) на сутки
- Б) на 12 часов
- В) на 6 часов
- 161. Права пациента:

### А) на выбор врача и медицинской организации

- Б) на выбор палаты в медицинской организации
- В) на получение информации о состоянии своего здоровья
- Г) на составление меню рациона питания
- Д) на отказ от медицинского вмешательства

#### 162. Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности:

- А) замечание
- Б) выговор
- В) строгий выговор
- Г) штраф
- Д) лишение свободы

## 163. Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:

- А) конституцию РФ
- Б) ФЗ об основах охраны здоровья граждан
- В) арбитражное право
- Г) ФЗ о системе государственной службы РФ

### 164.Субъектами медицинского права являются:

- А) медицинский персонал
- Б) суд
- В) пациент
- Г) ЛПУ
- Д) должностное лицо правоохранительных органов

# 165.Понятие "врачебная тайна" предусматривается:

- А) трудовым кодексом
- Б) конституцией РФ
- В) законом об адвокатской деятельности
- Г) ФЗ об основах охраны здоровья граждан
- Д) законом о полиции

#### 166. Права медицинского работника:

- А) на условия выполнения своих трудовых обязанностей
- Б) бесплатного проезда в общественном транспорте
- В) на совершенствование профессиональных знаний

#### Г) на профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя

- 167. Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:
- А) сообщение на предыдущее место работы
- Б) заключение трудового договора
- В) получение должностных инструкций
- Г) внесение записей в трудовую книжку
- Д) выдача справки о месте работы