

**Сертификационный экзамен по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
для соискателей, закончивших обучение по программе повышения квалификации
«Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях»**

1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид деятельности:

- а) лицензия
- б) приказ
- в) сертификат
- г) диплом

2. У новорожденного ребенка позвоночник:

- а) **не имеет изгибов**
- б) имеет 1 изгиб
- в) имеет 2 изгиба

3. У ребенка 5 лет частота пульса составляет:

- а) 70 - 80
- б) **90 – 100**
- в) 110 – 120
- г) 100 – 110

4. Вид санитарной обработки перед плановой операцией

- а) обтирание кожи и смена белья
- б) **полная санитарная обработка**
- в) частичная санитарная обработка
- г) санитарная обработка не проводится

5. Вид санитарной обработки перед экстренной операцией

- а) обтирание кожи и смена белья
- б) полная санитарная обработка
- в) **частичная санитарная обработка**
- г) санитарная обработка не проводится

6. Подготовку операционного поля перед плановой операцией проводят

- а) за 1 сутки до операции
- б) вечером накануне операции
- в) **утром в день операции**
- г) после премедикации

7. Очистительная клизма перед экстренной операцией

- а) ставится за 6 часов до операции
- б) ставится за 2 часа до операции
- в) ставится накануне операции вечером
- г) **не ставится**

8. Позднее осложнение послеоперационного периода

- а) рвота
- б) кровотечение
- в) остановка дыхания
- г) **нагноение раны**

9. Цель наложения груза на рану в послеоперационном периоде

- а) обезболивание
- б) предотвращение отека
- в) профилактика инфицирования
- г) **профилактика кровотечения**

10. Фурункул - это

- а) воспаление сальных желез
- б) воспаление потовых желез
- в) **воспаление волосяного фолликула**
- г) воспаление подкожной клетчатки

11. Гидраденит - это

- а) воспаление сальных желез
- б) **воспаление потовых желез**
- в) воспаление волосяного фолликула
- г) воспаление подкожной клетчатки

12. Карбункул – это

- а) **воспаление нескольких волосяных фолликулов в одном месте**
- б) воспаление потовых желез

- в) воспаление лимфатических узлов
- г) воспаление подкожной клетчатки

13. Флегмона - это

- а) гнойное воспаление потовых желез
- б) ограниченное воспаление подкожной клетчатки
- в) разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки**
- г) воспаление нескольких волосяных фолликулов

14. Флюктуация – это

- а) появление размягчения в центре инфильтрации**
- б) судорожное сокращение мимических мышц
- в) судорожное сокращение жевательных мышц
- г) судороги всего тела

15. Местный симптом рожистого воспаления

- а) подергивание мышц вокруг раны
- б) яркая гиперемия кожи с четкими границами**
- в) разлитое покраснение кожи
- г) побледнение кожи

16. Лечение абсцесса в стадии абсцедирования

- а) новокаиновая блокада с антибиотиками
- б) широкий разрез и дренирование раны**
- в) пункция гнойника с введением антибиотиков
- г) влажные согревающие компрессы

17. Общей гнойной хирургической инфекцией называется

- а) туберкулез
- б) остеомиелит
- в) сепсис**
- г) флегмона

18. Некроз - это

- а) временная потеря тактильной чувствительности
- б) расширение вен конечности
- в) омертвление тканей**
- г) параличи конечностей

19. Свищ - это

- а) опухоль пищевода
- б) повреждение костей
- в) омертвление тканей
- г) соединение органа с внешней средой**

20. Для некротической флегмоны новорожденных характерны:

- а) пятнистая гиперемия
- б) разлитая гиперемия**
- в) инфильтрация сплошная**
- г) инфильтрация бугристая
- д) повышение местной температуры**

21. Остеомиелит - это:

- а) гнойное воспаление костного мозга, кости**
- б) гнойное воспаление сустава

22. При синдроме «острого живота» нужно

- а) сделать очистительную клизму
- б) ввести анальгетики
- в) промыть желудок
- г) применить холод, срочно госпитализировать больного в хирургическое отделение**

23. Для острого гематогенного остеомиелита у детей характерны ранние симптомы:

- а) острое начало**
- б) постепенное начало
- в) стойкая гипертермия**
- г) нарушение функции конечности
- д) резкая локальная боль**

24. Транспортировка больного с синдромом «острый живот»

- а) лежа на спине с согнутыми в коленных суставах ногами**
- б) сидя
- в) полусидя
- г) лежа на боку

25. Достоверный признак перитонита
- а) болезненность живота при пальпации
 - б) задержка газов и кала
 - в) рвота
 - г) симптомы раздражения брюшины**
26. Симптом острого аппендицита
- а) кашицеобразный стул
 - б) изнурительная рвота
 - в) боли в эпигастрии с переходом в правую подвздошную область**
 - г) значительная интоксикация
27. При остром аппендиците характерно положение больного лежа на
- а) правом боку**
 - б) левом боку
 - в) спине с опущенным головным концом
 - г) животе
28. Первая помощь при ущемленной грыже
- а) теплая грелка
 - б) очистительная клизма
 - в) введение анальгетиков
 - г) холод и госпитализация в хирургическое отделение**
29. Симптомами пилоростеноза являются:
- а) срыгивание молоком с рождения
 - б) рвота молоком с 3-4 недель
 - в) рвота створоженным молоком с 3-4 недель**
 - г) симптом «мокрой подушки»**
 - д) усиленная перистальтика желудка
30. Для желудочно-пищеводного рефлюкса характерны:
- а) срыгивание молоком с рождения**
 - б) рвота молоком с 3-4 недель
 - в) симптом «мокрой подушки»**
 - г) рвота в горизонтальном положении**
 - д) запоры
31. Инвагинация у ребенка грудного возраста проявляется типичными симптомами:
- а) острое внезапное начало**
 - б) гипертермия
 - в) неукротимая рвота
 - г) стул с кровью**
 - д) выделения крови из ануса**
32. Оценить концентрационную функцию почек позволяет проба:
- а) Зимницкого**
 - б) Нечипоренко
 - в) Аддис-Каковского
33. Абсолютный симптом перелома кости
- а) боль
 - б) патологическая подвижность**
 - в) отек
 - г) деформация
34. Вид переломов костей, который чаще всего наблюдается у детей
- а) неполные
 - б) полные
 - в) по типу «зеленой веточки»**
 - г) компрессионные
35. Первоочередное мероприятие у больного с открытым переломом и артериальным кровотечением
- а) иммобилизация конечности
 - б) наложение жгута на конечность**
 - в) наложение асептической повязки на место перелома
 - г) наложение холода на место перелома
36. Доврачебная помощь при переломе кости
- а) наложение фиксирующей повязки
 - б) наложение гипсовой повязки
 - в) транспортная иммобилизация**
 - г) согревающие компрессы

37. Транспортная иммобилизация при переломе предплечья
- а) пальцы – лопатка здоровой стороны
 - б) пальцы – лопатка больной стороны
 - в) пальцы – средняя треть плеча**
 - г) лучезапястный сустав – плечевой сустав
38. При переломе бедра фиксируют
- а) голеностопный сустав
 - б) голеностопный – коленный суставы
 - в) пальцы стопы – голеностопный сустав
 - г) голеностопный – коленный – тазобедренный сустав**
39. Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости
- а) лучезапястный сустав – плечевой сустав
 - б) локтевой сустав – плечевой сустав
 - в) пальцы – лопатка больной стороны
 - г) пальцы – лопатка здоровой стороны**
40. При переломе голени фиксируют
- а) пальцы стопы – голеностопного сустава
 - б) голеностопный – коленный сустав**
 - в) голеностопный сустав
 - г) голеностопный – коленный – тазобедренный суставы
41. Абсолютный симптом вывиха
- а) боль в зоне травмы
 - б) болезненная припухлость
 - в) кровоизлияние в зоне травмы
 - г) пружинящая фиксация**
42. Первая помощь при вывихе:
- а) наложение давящей повязки
 - б) тепло на месте повреждения
 - в) транспортная иммобилизация**
 - г) асептическая повязка
43. Доврачебная помощь при ушибе мягких тканей
- а) наложение фиксирующей повязки, холод**
 - б) наложение гипсовой повязки
 - в) транспортная иммобилизация
 - г) согревающие компрессы
44. Первая помощь при случайной ране
- а) остановка кровотечения, марлевая повязка
 - б) остановка кровотечения, асептическая повязка**
 - в) остановка кровотечения, гипсовая повязка
 - г) введение антибиотиков
45. Первая медицинская помощь при термическом ожоге
- а) обработка поверхностей ожога спиртом;
 - б) смазывание поверхностей ожога мазью;
 - в) обработка раствором марганца;
 - г) холод, обезболивание, наложение сухой повязки.
46. Охлаждение поверхности ожога холодной водой показано:
- а) в первые минуты после травмы**
 - б) перед каждой перевязкой
 - в) только при ожоге первой степени
 - г) не показано
47. Доврачебная помощь при отморожениях 1 степени
- а) растирание пораженной части тела водкой или спиртом**
 - б) удаление пузырей
 - в) растирание участков тела снегом
 - г) новокаиновая блокада.
48. При электротравме оказание неотложной помощи должно начинаться с
- а) непрямого массажа сердца
 - б) перикардального удара
 - в) прекращение воздействия электрического тока**
 - г) ИВЛ
49. Показания для введения противостолбнячной сыворотки и анатоксина
- а) воспалительные заболевания мягких тканей туловища

- б) **открытые травмы**
в) закрытые травмы
г) закрытая черепно-мозговая травма
50. Основной симптом сотрясения головного мозга
а) **ретроградная амнезия**
б) усиление рефлексов
в) паралич конечностей
г) нарушение функции тазовых органов
51. «Светлый промежуток» является симптомом
а) сотрясения головного мозга
б) ушиба головного мозга
в) **сдавления головного мозга**
г) перелома основания черепа
52. Типичное проявление перелома основания черепа
а) **кровотечение и истечение ликвора из носа и ушей**
б) отек век
в) подкожная эмфизема
г) двоение в глазах
53. Симптом «очков» наблюдается при
а) сотрясении головного мозга
б) ушибе головного мозга
в) **переломе основания черепа**
г) сдавлении головного мозга
54. Транспортировка пациента с закрытой черепно-мозговой травмой
а) сидя
б) полусидя
в) **на спине, голова фиксирована на ватно-марлевом круге**
г) лежа на боку
55. Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:
а) 96% этиловым спиртом
б) **холодной водой до онемения**
в) стерильным новокаином
г) жиром
56. Принципы оказания помощи при химических ожогах:
а) **по возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой**
б) промывание холодной водой в течение часа
в) анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности
г) присыпать тальком
57. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:
а) начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока
б) **освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию**
в) облить водой
58. Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:
а) наложение жгута
б) тампонада раны
в) **тугая давящая повязка**
г) закрутка
59. Шок - это:
а) **острая сосудистая недостаточность**
б) острая сердечная недостаточность
в) острая дыхательная недостаточность
60. До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно:
а) поставить очистительную клизму
б) положить на живот горячую грелку
в) **положить на эпигастрий пузырь со льдом**
61. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме:
а) **холод**
б) **обтирание спиртом**

- в) тепло
- г) новокаин
- д) анальгин

62. Снижение количества лейкоцитов крови у детей – это:

- а) лейкопения**
- б) анемия
- в) лейкоцитоз

63. Увеличение количества лейкоцитов в крови у детей – это:

- а) анемия
- б) лейкоцитоз**
- в) лейкопения

64. В детском возрасте преимущественно встречаются такие злокачественные опухоли как:

- а) рак желудка
- б) нейробластома**
- в) остеогенная саркома**
- г) рак прямой кишки
- д) нефробластома**

65. Первыми жалобами при нефробластоме являются:

- а) боли в животе**
- б) изменение цвета мочи
- в) капризность, повышенная утомляемость**
- г) гипертермия
- д) асимметрия живота**

66. Для клинки врожденной мышечной кривошеи характерно:

- а) веретенообразное утолщение средней или нижней трети кивательной мышцы**
- б) спастический паралич шейных мышц
- в) гипоплазия лицевого скелета
- г) высокое стояние надплечий, лопаток, сколиоз**
- д) появление припухлости мышцы после резкого поворота головы

67. Для клинки врожденного вывиха бедра характерны симптомы:

- а) относительного укорочения конечности**
- б) ограничения отведения бедер**
- в) асимметрия кожных складок**
- г) низведения конечности
- д) абсолютного укорочения конечности

68. Отсутствие в мошонке одного яичка - это:

- а) анорхизм
- б) крипторхизм**

69. К ранним симптомам биологической смерти относится:

- А) помутнение роговицы**
- Б) трупное окоченение
- В) трупные пятна
- Г) расширение зрачков
- Д) деформация зрачков

70. Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт:

- А) промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь**
- Б) вызывать рвоту
- В) дать слабительное
- Г) поставить клизму

71. Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является:

- А) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи**
- Б) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза
- В) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
- Г) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи

72. Выведение нижней челюсти при ИВЛ:

- А) предупреждает регургитацию желудочного содержимого
- Б) устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)**
- В) создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента

73. Первыми признаками развивающегося травматического шока являются:

- А) резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот**
- Б) психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния**
- В) судороги, апатия, потоотделение

- Г) гиперемия, сухость кожи, пенное отделение изо рта, галлюцинации
74. При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются:
- А) бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение
 - Б) цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания
 - В) бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия**
75. Обморок – это:
- А) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
 - Б) аллергическая реакция
 - В) потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса**
76. Показателями эффективной реанимации являются:
- А) появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет**
 - Б) расширенные зрачки
 - В) правильный массаж сердца
77. Число компрессий при проведении 5-тилетнему ребенку закрытого массажа сердца:
- а) 60 раз в минуту
 - б) 100-120 раз в минуту
 - в) 90-100 раз в минуту**
78. К методам временной остановки кровотечения относятся
- А) перевязка сосуда в ране
 - Б) перевязка сосуда на протяжении
 - В) наложение кровоостанавливающего жгута**
 - Г) форсированное сгибание конечностей**
79. Клинические проявления термического ожога 2 степени:
- а) гиперемия, прозрачные пузыри, боль отсутствует
 - б) гиперемия, боль, прозрачные пузыри**
 - в) гиперемия, боль, геморрагические пузыри
80. Общение в деятельности медицинского работника – это:
- А) обмен информацией
 - Б) обмен эмоциями
 - В) обмен информацией и эмоциями**
81. К вербальным средствам общения относится:
- А) поза
 - Б) речь**
 - В) взгляд
 - Г) жест
82. Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции:
- А) половой**
 - Б) вертикальный**
 - В) трансфузионный
83. Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции:
- А) трансфузионный**
 - Б) при употреблении в/в наркотиков**
 - В) через медицинские отходы, не прошедшие дезинфекцию**
 - Г) аэрогенный
84. Пути передачи вирусных гепатитов В, С:
- А) половой путь**
 - Б) парентеральный путь**
 - В) вертикальный путь**
 - Г) воздушно-капельный путь
 - Д) фекально-оральный
85. При сборе медицинских отходов запрещается:
- А) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)**
 - Б) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции**
 - В) собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов
 - Г) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов**
86. Для обработки рук перед выполнением инъекции можно использовать:
- А) 70% этиловый спирт**
 - Б) одноразовые спиртовые салфетки**
 - В) хлоргексидин спиртовой раствор 0,5%**

- Г) раствор хлормисепта 0,5%
87. Дезиконт (индикаторные полоски) используют для:
- А) определения концентрации дезинфицирующего средства**
 - Б) определения неправильно приготовленного дезинфицирующего раствора**
 - В) определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды
88. Кожный антисептик применяют для:
- А) гигиенической обработки рук**
 - Б) после приготовления пищи
 - В) хирургической обработки рук**
89. Моюще-дезинфицирующее средство используют для:
- А) дезинфекции использованного инструментария**
 - Б) дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария**
 - В) дезинфекции и стерилизации инструментария
90. Сбор отходов класса А осуществляется в:
- А) многоразовые емкости**
 - Б) одноразовые пакеты белого цвета**
 - В) одноразовые пакеты желтого цвета
 - Г) одноразовые пакеты красного цвета
91. Сбор отходов класса Б (не колесце-режущий инструментарий) осуществляется в:
- А) одноразовые пакеты белого цвета
 - Б) одноразовые пакеты желтого цвета**
 - В) одноразовые пакеты красного цвета
92. Утилизация медицинских отходов проводится согласно:
- А) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»**
 - Б) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»**
 - В) СанПиН 2.1.7.28-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ"
93. ВИЧ-инфекция не передается при:
- А) рукопожатии**
 - Б) использовании одного шприца, несколькими лицами
 - В) кашле, чихании**
 - Г) пользовании туалетами или душевыми**
 - Д) от инфицированной матери плоду
94. ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги
- А) должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе
 - Б) не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе**
95. Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:
- А) ежедневно
 - Б) 1 раз в неделю
 - В) 1 раз в месяц
 - Г) при каждом включении установки**
96. Высока вероятность инфицирования ВИЧ при:
- А) половом контакте с ВИЧ-инфицированным**
 - Б) проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным
 - В) совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным наркотических веществ,**
 - Г) рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной**
97. На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно:
- А) беременные женщины**
 - Б) больные с поражениями легких
 - В) больные парентеральными вирусными гепатитами**
 - Г) доноры крови и органов**
98. Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
- А) металла**
 - Б) хлопчатобумажной ткани
 - В) стекла**
 - Г) силиконовой резины**
99. «Дезинфекция» – это
- А) уничтожение патогенных микроорганизмов
 - Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.**
 - В) уничтожение грибов

- Г) уничтожение вирусов
100. Для стерилизации применяются средства, обладающие:
- А) статическим действием
 - Б) вирулицидным действием
 - В) спороцидным действием**
 - Г) фунгицидным действием
101. «Стерилизация» – это
- А) уничтожение патогенных бактерий
 - Б) уничтожение микробов на поверхности
 - В) уничтожение инфекции
 - Г) освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение**
102. Пути передачи внутрибольничной инфекции:
- А) парентеральный**
 - Б) контактный**
 - В) воздушно-капельный**
 - Г) биологический
 - Д) химический
103. Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к классу:
- А) А (эпидемиологически безопасные)
 - Б) Б (эпидемиологически опасные)
 - В) В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)
 - Г) Г (токсикологически опасные)**
 - Д) Д (радиоактивные)
104. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий
- А) по профилактике экзогенных интоксикаций
 - Б) направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
 - В) по профилактике внутрибольничной инфекции**
105. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом биксе со штатным фильтром:
- А) 3 суток
 - Б) 20 суток**
 - В) 30 суток
106. Стерильный стол накрывают:
- А) на сутки
 - Б) на 12 часов
 - В) на 6 часов**
107. Права пациента:
- А) на выбор врача и медицинской организации**
 - Б) на выбор палаты в медицинской организации
 - В) на получение информации о состоянии своего здоровья**
 - Г) на составление меню рациона питания
 - Д) на отказ от медицинского вмешательства**
108. Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности:
- А) замечание
 - Б) выговор
 - В) строгий выговор**
 - Г) штраф**
 - Д) лишение свободы**
109. Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:
- А) конституцию РФ**
 - Б) ФЗ об основах охраны здоровья граждан**
 - В) арбитражное право
 - Г) ФЗ о системе государственной службы РФ
110. Субъектами медицинского права являются:
- А) медицинский персонал**
 - Б) суд
 - В) пациент**
 - Г) ЛПУ
 - Д) должностное лицо правоохранительных органов
111. Понятие "врачебная тайна" предусматривается:
- А) трудовым кодексом
 - Б) конституцией РФ**

- В) законом об адвокатской деятельности
- Г) ФЗ об основах охраны здоровья граждан**
- Д) законом о полиции

112. Права медицинского работника:

- А) на условия выполнения своих трудовых обязанностей**
- Б) бесплатного проезда в общественном транспорте
- В) на совершенствование профессиональных знаний**
- Г) на профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя**

113. Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:

- А) сообщение на предыдущее место работы
- Б) заключение трудового договора**
- В) получение должностных инструкций**
- Г) внесение записей в трудовую книжку**
- Д) выдача справки о месте работы**

114. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при повреждении

- а) паренхиматозных органов
- б) капилляров
- в) артерий**
- г) вен

115. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:

- а) височной кости
- б) углу нижней челюсти
- в) поперечному отростку 6 шейного позвонка
- г) в надключичной ямке к 1 ребру**

116. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к:

- а) височной кости
- б) поперечному отростку 6 шейного позвонка**
- в) углу нижней челюсти
- г) в надключичной ямке к 1 ребру

117. Временный гемостаз при ранении сонной артерии

- а) наложение давящей повязки
- б) наложение окклюзионной повязки
- в) наложение жгута с противоупором**
- г) наложение жгут-закрутки.

118. Метод временного гемостаза при артериальном кровотечении

- а) возвышенное положение конечности
- б) наложение пузыря со льдом
- в) пальцевое прижатие**
- г) перевязка сосудов

119. Меры оказания первой помощи при носовом кровотечении

- а) холод на переносицу, пальцевое прижатие крыльев носа к носовой перегородке**
- б) дать понюхать нашатырный спирт
- в) запрокинуть голову
- г) дать успокаивающее средство

120. Положение больного с носовым кровотечением

- а) сидя, запрокинув голову
- б) лежа на спине
- в) сидя, слегка опустив голову**
- г) лежа на животе

121. Первая помощь при желудочно-кишечном кровотечении

- а) грелка на живот
- б) холод на живот, введение гемостатических средств**
- в) введение анальгетиков
- г) введение спазмолитиков

122. Операция, произведенная после полного обследования больного в стационаре

- а) экстренная
- б) срочная
- в) плановая**
- г) диагностическая

123. Операция, при которой полностью удаляется больной орган

- а) диагностическая
- б) радикальная**

- в) паллиативная
- г) экстренна.

124. Цель паллиативной операции

- а) уточнение диагноза
- б) излечение больного
- в) облегчение состояния больного**
- г) получение материала для исследования

125. Заболевание, при котором отмечается «сардоническая улыбка»

- а) бешенство
- б) газовая гангрена
- в) столбняк**
- г) сепсис

126. Ранним признаком столбняка со стороны раны является

- а) крепитация
- б) отсутствие чувствительности
- в) флюктуация
- г) единичные подергивания мышц вокруг и в самой ране**

127. «Опистотонус» - это

- а) появление размягчение в центре инфильтрации
- б) судорожное сокращение мимических мышц
- в) судорожное сокращение жевательных мышц
- г) судороги всего тела**

128. Симптом почечной колики

- а) недержание мочи
- б) полиурия
- в) задержка стула и газа
- г) острая боль в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника**

129. Доврачебная помощь при почечной колике

- а) холод местно
- б) сердечные средства
- в) спазмолитики, анальгетики и тепло**
- г) новокаиновая блокада

130. Транспортировка пострадавшего с переломом ребер

- а) лежа на спине
- б) лежа на животе
- в) сидя**
- г) лежа на боку

131. Вид пневмоторакса, при котором рана «не дышит»

- а) открытый
- б) закрытый**
- в) клапанный
- г) спонтанный

132. Вид пневмоторакса, при котором рана «дышит»

- а) открытый**
- б) закрытый
- в) клапанный
- г) спонтанный

133. Доврачебная помощь при закрытом пневмотораксе

- а) наложение сухой повязки**
- б) наложение давящей повязки
- в) герметической повязки
- г) наложение матерчатой повязки

134. Доврачебная помощь при открытом пневмотораксе

- а) наложение сухой повязки
- б) наложение давящей повязки
- в) наложение матерчатой повязки
- г) наложение герметической повязки**

135. Пострадавшего с переломом костей таза транспортируют на носилках в положении

- а) на животе
- б) на боку
- в) «лягушки»**
- г) на спине с выпрямленными ногами

136.Основной фактор появления нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций в ЛПУ?

а) нарушение правил асептики и антисептики в ЛПУ

- б) увеличение количества тяжелобольных
- в) появление в отделениях больных с педикулезом
- г) нарушение режима питания

137.Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую глаз:

а) обильно промыть водой (не тереть)

- б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия
- в) промыть 20% раствором сульфацила натрия
- г) промыть 1% раствором борной кислоты

138.При попадании биологической жидкости на кожу, необходимо:

а) промыть кожу водой с мылом

б) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным спиртом - контакт с кожей - 2 мин

- в) обработать 1% раствором хлорамина
- г) обработать 0,05% раствором перманганата калия

139. При попадании крови на слизистую носа необходимо:

а) промыть нос водой (не тереть)

- б) промыть 0,05% раствором перманганата калия
- в) промыть 0,01% раствором перманганата калия
- г) промыть 1% раствором борной кислоты

140.Нормативный документ по профилактике вирусных гепатитов:

- а) № 916
- б) № 720
- в) № 170
- г) № 408**

141.Меры профилактики ВБИ для медицинского персонала при работе с биологическими жидкостями:

а) использование халатов, масок, перчаток

б) использование халатов, перчаток, масок, защитных очков или щитков, фартуков, нарукавников

в) использование перчаток, фартуков, нарукавников

142.При уколах и порезах кожи необходимо:

а) обработать рану 3% хлорамином

б) выдавить кровь, обработать рану 5% спиртовым раствором йода

в) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать спиртом, смазать рану 5% спиртовым раствором йода

г) ничего не предпринимать, сообщить старшей медсестре

143.Цель социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента:

а) обеспечение кратковременной стерильности

б) создание кратковременной стерильности

в) профилактика профессионального заражения

г) удаление бытовых загрязнений

144. Гигиеническая обработка рук медперсонала проводится:

а) после посещения туалета

б) перед едой

в) до и после снятия перчаток

г) перед кормлением пациента

145.Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:

а) по профилактике интоксикаций

б) направленных на пропаганду здорового образа жизни

в) по профилактике внутрибольничной инфекции

г) по лечению пациента