

Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки по специальности «Фармация»

Разъяснения: *Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из представленного перечня вопросов будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться!*

Документ, который является основанием для отпуска лекарственных препаратов в отделения медицинской организации:

рецепт
заказ-заявка
*требование-накладная медицинской организации
накладная на внутреннее перемещение

Поверхности стен и потолков производственных помещений аптеки должны быть:

*гладкими, без нарушения целостности покрытия, допускающими влажную уборку с применением дезсредств
без грубых нарушений целостности покрытия
гладкими, допускающими сухую уборку
любыми, допускающими влажную уборку с применением дезсредств

Оправдательным документом для списания товара в расход является:

*акт о списании товара
акт о переводе товара во вспомогательный материал
справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам
товарная накладная

Контроль за ценообразованием на ЖНВЛП осуществляется:

*Правительством РФ
Правительством субъекта РФ
Министерством здравоохранения субъекта РФ
Министерством здравоохранения РФ

Денежное выражение стоимости товара или услуги в условиях рынка определяются понятием:

спрос
*цена
прибыль
рентабельность

Время в днях, в течение которого реализуется товарный запас в размере средней величины, называется:

точкой заказа
товарооборотом
издержками обращения
*товарооборачиваемостью

Аптечная организация имеет право приобретать и продавать товары, кроме:

биологически активных добавок к пище
*канцелярских принадлежностей
медицинской и санитарно-просветительной печатной продукции
очковой оптики

Хозяйственные связи между поставщиками и покупателями оформляются:

*договором поставки
договором о материальной ответственности
трудовым договором
соглашением сторон

Товар одного наименования, поступивший по одному сопроводительному документу (товарной накладной или счету-фактуре):

серия

*партия

товарная группа

товарная единица

Для контроля за оптовой надбавкой на ЖНВЛП оформляется:

*протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

товарно-транспортная накладная

реестр сертификатов

счет-фактура

Остаток лимита денег в кассе устанавливается:

*руководителем организации

банком

налоговой инспекцией

аптекой

Объем чайной ложки равен (мл):

20

10

15

*5

Обязательный вид внутриаптечного контроля качества лекарственных средств:

качественный

опросный

физический

*письменный

В микстуру добавляют методом двойного взбалтывания:

*нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1%

концентрированные растворы, растворы глицерина

настойку пустырника, настойку белладонны

настойку валерианы, настойку мяты, адонизид

Тритурацию используют, если масса ядовитого или сильнодействующего вещества на все дозы менее:

0,08

0,1

0,5

*0,05

Для стабилизации растворов солей слабых кислот и сильных оснований необходимо добавление:

раствора Вейбеля

0,05 М раствора цинка хлорида

0,1 М раствора кислоты хлористоводородной

*натрия гидрокарбоната или 0,1 М раствора натрия гидроксида

Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества лекарственного средства, то проставляется номер анализа и подпись провизора-аналитика на:

*ППК

этикетке

рецепте

копии рецепта

Письменный контроль заключается в проверке:

общей массы или объема лекарственного препарата

внешнего вида, запаха, однородности смешивания и отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах

*соответствия записей в паспорте письменного контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчетов подлинности лекарственного средства и его количественного определения

Метод количественного определения натрия тиосульфата:

алкалиметрия
броматометрия
*йодометрия
аргентометрия

Осадок параформа в растворе формальдегида образуется при хранении при температуре:

ниже +18°C
выше +9°C
*ниже + 9°C
выше +18°C

Суспензию серы стабилизирует, одновременно обеспечивая оптимальное фармакологическое действие:

эмульгатор Т-2
желатоза
*мыло медицинское
раствор крахмала 5%

Стабилизатор, используемый для приготовления инъекционного раствора новокаина 0,25%, назначенного для инфильтрационной анестезии:

*0,1М раствор хлористоводородной кислоты
0,1М раствор натрия гидроксида
трилон Б
натрия гидрокарбонат (х.ч)

Гидрофильными свойствами обладает:

ментол
камфора
сера осажденная
*магния оксид

Нерасфасованное лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, должно храниться:

в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком
на стеллажах или в шкафах
в сухом (не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре
*изолированно в хорошо укуповенной таре

Лекарственное растительное сырье, которое измельчают до 3 мм:

трава пустырника пятилопастного
*листья толокнянки
цветки ромашки лекарственной
семена льна посевного

Полный химический контроль заключается в оценке качества изготовления лекарственных препаратов по показателям:

количественный анализ
подлинность лекарственных средств
испытания на чистоту лекарственных средств
*качественный и количественный анализ

Лекарственные средства, поступающие из помещения хранения в помещения для изготовления лекарственных препаратов, подвергают:

контролю при отпуске
физическому контролю
качественному и количественному анализу
*качественному анализу

К глазным каплям не предъявляется требование:

*апирогенности
стабильности
изоосмотичности
стерильности

Условия хранения лекарственных веществ, предназначенных для изготовления нестерильных лекарственных форм:

в полипропиленовых банках с завинчивающейся пробкой
*в плотно закрытых штангласах
в металлических биксах
закрытых коробках, ящиках

К рекламному элементу на гибкой ножке относят:

шелфтокер
*воблер
стоппер
диспенсер

Правила продажи товаров утверждены:

*постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020
Федеральным законом N 99-ФЗ от 04.05.2011
Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010
законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992

Рецепты на анаболические стероиды (код А14А) после отпуска:

*хранятся в аптеке 3 года
регистрируются в журнале и возвращаются покупателю
хранятся в аптеке 3 месяца
отмечаются штампом «Лекарственный препарат отпущен» и возвращаются покупателю

Фармацевтическую экспертизу рецепта проводит:

врач
фельдшер
*фармацевт
фармаколог

Лекарственный препарат, содержащий псевдоэфедрин и декстрометорфан, отпускаемый по рецепту №148-1/У-88:

ирифрин
*каффетинколд
теофедрин Н
бронхолин шалфей

Препарат Кофетамин выписывается на бланке формы:

*№ 107-1/у
№ 148-1/у-88
№ 148-1/у-06(л)
№ 107/у-НП

При горизонтальной выкладке товары располагаются на полках витрины:

*по всей плоскости полки
вертикально
параллельно
по диагонали

Для отравления наркотиками характерно:

желтушность склер
боли в эпигастральной области
*«точечные» зрачки
опущение века

Совокупность методов, направленных на увеличение объемов продаж непосредственно в аптечной организации – это:

лизинг

*мерчандайзинг

коучинг

франчайзинг

Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение:

*установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи потребителю, если срок службы не установлен

срока годности товара

периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления

срока хранения товара

Особенность ожогов при электротравме:

*безболезненные

малоболезненные

умеренно болезненные

сильно болезненные

Медицинские изделия, не подлежащие государственной регистрации с последующим декларированием:

соски молочные из латекса, резины или силиконовые

изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, трусы, пеленки)

приборы для детей до 3 лет

*изделия санитарно-гигиенические: из резины, пластмасс и металла для ухода за детьми

Загрязнение воздуха рабочих помещений аптеки может привести к развитию:

цистита

плеврита

варикоза

*аллергии

Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся веществ с:

метиленовой синью

титрованным раствором натрия тиосульфата 0,1 моль/л

титрованным раствором гидроксида натрия 0,1 моль/л

*серной и азотной кислотой

Механизм действия омепразола:

блокирование М1-холинорецепторов

стимулирование простагландиновых рецепторов

*ингибирование протонной помпы

блокирование гистаминовых H₂-рецепторов

В состав нутрицевтики входят:

наркотические и ядовитые вещества

*незаменимые в питании вещества (макро- и микроэлементы)

антибиотики, гормоны

ткани и органа человека

Порекомендуйте препарат для лечения диареи:

неостигмина метилсульфат (прозерин)

дротаверин

*лоперамид (имодиум)

натрия гидрокарбонат

Проинформируйте пациента, какая группа антибиотиков обладает ототоксическим действием:

тетрациклины

*аминогликозиды

цефалоспорины

макролиды

Потребительские свойства резиновых изделий зависят от:

состава резины
условий хранения
*функционального назначения
формы изделия

Арбидол применяют для лечения:

микозов
*и профилактики гриппа и ОРВИ
герпетической инфекции
СПИДа

Особо чувствительным к свету является вещество:

перманганат калия
адреналина гидрохлорид
фенотиазин
*серебра нитрат

Стоимость товаров, израсходованных в аптеке на хозяйственные нужды, относят на:

убытки
*издержки обращения
реализацию
товарные потери

При неподаче расчетов аптекой лимита кассы, любая сумма, оставшаяся в кассе, является:

нулевой
максимальной
остатком на начало дня
*сверхлимитной

Учет расхода товаров на оказание первой медицинской помощи ведется в:

инвентарной книге
рецептурном журнале
*журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи
кассовой книге

Документом, в который включаются основные положения условий труда в организации, является:

ежегодный отчет
паспорт санитарно-технического состояния организации
отчет по травматизму и профзаболеваниям
*коллективный договор

В производственных помещениях допускается содержание огне- и взрывоопасных лекарственных препаратов:

необходимое количество для работы в течение недели
*необходимое количество для работы в течение 1 смены
3-дневный запас
месячный запас

При хранении взрывоопасных лекарственных средств следует принимать меры:

воздействие повышенной влажности
предохранения от загрязнения их микроорганизмами
*предохранения от загрязнения их пылью
воздействия пониженной температуры

Инъекционные препараты, приготовленные асептически, имеют срок хранения:

30 суток
*1 сутки
10 суток
5 суток

Аптечные этикетки для наружного применения имеют на белом фоне сигнальный цвет:

*оранжевый
розовый
синий
зеленый

В таре из светозащитных материалов, в темном помещении или шкафах хранят фармацевтические субстанции, требующие защиты от:

воздействия влаги
воздействия повышенной температуры
улетучивания и высыхания
*света

Лекарственным препаратом, требующим защиты от воздействия повышенной температуры, является:

*виферон
уголь активированный
натрия хлорид
ацетилсалициловая кислота

Лекарственные средства, которым необходима защита от улетучивания:

лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
антибиотики
органопрепараты
*спиртовые экстракты и настойки

Процесс умерщвления на изделии или в изделии или на поверхности вегетативных форм микроорганизмов, называется:

асептика
*дезинфекция
стерилизация
антисептика

Если не указано в рецепте, настой травы термопсиса готовят в соотношении:

1:10
1:20
1:100
*1:400

Окислительными свойствами обладает:

фенобарбитал
калия иодид
*калия перманганат
фурацилин

Коэффициент увеличения объема показывает количество:

*воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения
воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения
натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества
сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды.

Качественному контролю выборочно подлежат лекарственные препараты, изготовленные в течение рабочего дня, в объеме от их количества за день (%):

3
5
*10
1

Условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение микробного и другого загрязнения при получении стерильной продукции на всех этапах технологического процесса – это:

дезинфекция
стерильность
контаминация
*асептика

В жидких лекарственных формах с учетом процента влажности берут:

эуфиллин

*глюкозу

кислоту никотиновую

кислоту аскорбиновую

Раствор хлорамина может быть использован как окислитель в качественном анализе для лекарственного средства:

*натрия бромид

кислота борная

магния сульфат

натрия хлорид

Стабилизатор добавляют при изготовлении глазных капель:

рибофлавина

*натрия сульфацила

колларгола

пилокарпина гидрохлорида

30 мл 5% раствора глюкозы для инъекций стерилизуют паровым методом при температуре:

*120° – 8 мин

120° – 12 мин

100° – 30 мин

120° – 45 мин

Для предотвращения переутомления и снижения зрения при пользовании микроскопом следует:

*работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз

использовать только дневное освещение

работать чередуя глаза, используя только искусственное освещение

использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз

Титрование магния сульфата методом комплексонометрии ведут в присутствии:

*аммиачно-буферного раствора

глицерина

разбавленной серной кислоты

ацетата окисной ртути

Коллоидные растворы образует:

*протаргол

желатоза

камфора

натрия гидрокарбонат

Мази-сплавы готовят, сплавляя компоненты:

*в порядке понижения температуры плавления

сначала углеводородную основу

в любом порядке

в порядке повышения температуры плавления

Полноту смыва синтетических моющих и моюще-дезинфицирующих средств в посуде определяют по величине:

*рН

коэффициента преломления

оптической плотности

угла вращения

Торговое название изосорбида мононитрата:

кардикет

*эфокс

изокет

нитрокор

Проинформируйте пациента, какой желчегонный препарат содержит желчь:

эссенциале
мизопростол (сайтотек)
*холензим
панкреатин

Препарат, относящийся к андрогенам:

*тестостерон
гидрокортизон
эстрадиол
прогестерон

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни врачи назначают:

ибупрофен
*домперидон
кеторолак
лоперамид

МНН препарата бильтрицид:

тинидазол
клотримазол
левомицетин
*празиквантел

Препарат, применяющийся при лечении чесотки:

метенамин (гексаметилентетрамин)
*бензилбензоат
салициловая кислота
борная кислота

Антибиотик группы макролидов:

*мидекамицин
амоксициллин
рифампицин
гентамицин

Альфа₂ – адреномиметиком с центральным механизмом действия является:

оксиметазолин
ксилометазолин
тетризолин
*клонидин

Отпуск лекарственного препарата по рецепту с дозировкой, которая отсутствует в аптеке:

запрещается, рецепт возвращается покупателю
допускается при наличии в аптеке большей дозировки
запрещается, рецепт остается в аптеке
*допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки

Левифлоксацин отпускается из аптеки по форме рецептурного бланка:

*№ 107-1/у
№ 148-1/у-88
без рецепта
№ 107/у-НП

В "горячих зонах" торгового зала располагают товары:

перевязочные средства
медицинские изделия
*лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях
лечебную косметику

Действия фармацевта после заготовки ядовитого лекарственного растительного сырья:

промыть руки этиловым спиртом 70 %

вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой

*промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых веществ, 1-2% раствором гидрокарбоната натрия

промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной кислотой

Выкладка группы товаров, произведенных одной компанией, таким образом, чтобы самая покупаемая продукция располагалась в виде стен замка по краям, является условием правила:

корпоративного блока

порядка

дублирования

*замка

Срок действия рецепта на препарат «ПЕНТАЛГИН ICN» составляет:

*15 дней

5 дней

10 дней

30 дней

Рецепты на этиловый спирт выписываются на бланке формы:

№ 148-1/у-06 (л)

№ 107/у-НП

*№ 148-1/у-88

№ 107-1/у

Представление товаров в больших количествах называется:

горизонтальная выкладка

вертикальная выкладка

*объемная выкладка

фронтальная выкладка

Помощь при «остром животе»:

*срочная госпитализация

поставить клизму

дать обезболивающие препараты

промыть желудок

Биологически активные вещества, состоящие из гликона и агликона, называют:

*гликозидами

эфирными маслами

полисахаридами

жирными маслами

При пальцевом прижатии сонной артерии ее прижимают к:

ключице

ребру

*поперечному отростку VI шейного позвонка

середине грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

Рецепты на лекарственные средства, входящие в минимальный ассортимент лекарственных средств, обслуживаются в срок, не превышающий:

*5 дней

1 дня

2 дней

10 дней

Сводная ведомость инвентаризационных листов оформляется:

перед началом инвентаризации

после подведения итогов инвентаризации

*после подсчета сумм в инвентаризационных описях

после проверки в бухгалтерии

Как называют юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, обратившихся в лицензируемый орган с заявлением о предоставлении лицензии:

акционер

*соискатель лицензии

лицензиат

товарищество

Платежную ведомость подписывают:

*главный бухгалтер и руководитель аптеки

кассир и руководитель аптеки

главный бухгалтер и кассир

руководитель аптеки и фармацевт

К расходным кассовым операциям относится:

уценка по лабораторно-фармацевтическим работам

реализация товаров населению

расход товаров на хозяйственные нужды

*сдача выручки в банк

К действиям фармацевта в случае разлива кислот, щелочей и других агрессивных реагентов относят:

извещение руководителя и ожидание дальнейших указаний

эвакуацию людей

ознакомление с инструкцией по требованию безопасности в аварийных ситуациях

*прветривание помещения, осторожная уборка пролитой жидкости

Доступ в помещения (зоны) аптечной организации имеют лица:

*уполномоченные руководителем

посещающие аптеку с целью приобретения лекарственных средств

поставляющие товар в аптеку

имеющие пропуск

К функциям отдела экспедиции аптечного склада относятся:

прием товаров от поставщика

*отгрузка товара по заказам покупателя

комплектование заказов

распределение по местам хранения

Учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции:

накопительные

сводные

*первичные

внутренние

Данные товарного отчета отдела вносят в:

*отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц

лабораторно-фармацевтический журнал

книгу поступления товара

журнал учета движения товара

Методом алкалиметрии определяют:

сульфацетамид натрия

кодеин

*бендазола гидрохлорид

кофеин

Персиковое, подсолнечное, оливковое масла могут быть использованы для предварительного диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в мазевые основы:

углеводородные

этилен-аэрозольные

гидрофильные

*жировые

По правилу оптимального диспергирования количество вспомогательной жидкости для диспергирования 10,0 порошкообразных веществ составляет (г):

10

2

1

*5

Настой цветков ромашки, если не указано в рецептурой прописи, изготавливают в соотношении:

1:20

1:30

1:400

*1:10

Суппозитории не готовятся методом:

выкатывания

прессования

выливания

*гранулирования

К преимуществам инъекционного способа введения лекарственных веществ относится все, кроме:

высокой степени биологической доступности лекарственных веществ

возможности оказания экстренной помощи

точности дозирования лекарственных веществ

*опасности внесения инфекции

При изготовлении 10 мл 2% раствора калия йодида допускается отклонение 10%. Содержание калия йодида должно быть не менее:

0,018 г и не более 0,022 г

9 мл и не более 11 мл

1,8 г и не более 2,2 г

*0,18 г и не более 0,22 г

При разделительном способе выписывания порошков масса вещества на одну разовую дозу:

указана в рецепте

*рассчитывается делением выписанной массы на число доз

указана в сигнатуре

рассчитывается делением выписанной массы на число приемов

Лекарственный препарат, содержащий серу, воду очищенную, спирт камфорный и глицерин, представляет собой:

эмульсию

гомогенную дисперсную систему

*суспензию

комбинированную дисперсную систему

Предупредительной надписью «Приготовлено асептически» оформляют:

все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях

стерильные лекарственные препараты

*все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях без финишной термической стерилизации

инъекционные растворы

Дисперсологическая классификация лекарственных форм учитывает характер:

*связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой

дисперсионной среды

связи в гомогенных системах

дисперсной фазы

Реактив, с помощью которого определяют отсутствие жирных пятен на поверхности вымытой посуды:
метилловый оранжевый

калия перманганат
метиленовая синь
*судан III

Предупредительная надпись на этикетке флакона с настоем или отваром:

Перед употреблением взбалтывать
Хранить в сухом и защищенном от света месте
Хранить в сухом прохладном месте
*Хранить в прохладном месте. Перед употреблением взбалтывать

Плоды заготавливают у лекарственного растения:

*рябина обыкновенная
аир болотный
крушина ломкая
багульник болотный

Для лекарственного препарата «Эвкалипта прутовидного листа» характерно основное фармакологическое действие:

вяжущее
мочегонное
кардиотоническое
*противомикробное

Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, представляющее собой высушенные:

отдельные цветки и листья
или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
*или свежие надземные части травянистых растений

В случае обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных ЛП необходимо отразить качественные расхождения в:

журнале регистрации поступивших товаров
акте проведения инвентаризации
товарно-транспортной накладной
*акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно- материальных ценностей

Формой рецептурного бланка для отпуска из аптеки препарата Оксазепам является:

№ 107/у-НП
без рецепта
№ 107-1/у
*№ 148-1/у-88

Наиболее опасным проявлением немедленной аллергии является:

отек Квинке
*анафилактический шок
крапивница
бронхоспазм

Препарат Феназепам отпускается из аптек по рецептурному бланку формы:

107-1/у
*148-1/у-88
148-1/у-04 (л)
107/у-НП

Наиболее опасное осложнение гипертонической болезни:

порок сердца
первичное изменение почек
*гипертонический криз
бронхоспазм

Первичный учет расхода товаров на хозяйственные нужды ведется в:

*журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
инвентарной книге
реестре выписанных счетов
кассовой книге

Препарат Джозамицин отпускается из аптек по рецептурному бланку формы:

*107-1/у
148-1/у-88
107/у-НП
отпускается без рецепта

Подвесные макеты изделия, выполненные в величину, превышающую натуральную, называются:

*мобайлы
воблеры
муляжи
шелфтокеры

К лекарственному препарату, отпускаемому по рецепту №107-1/У относится:

*азитромицин таблетки
граммидин таблетки
клиндамицин суппозитории вагинальные
тетрациклин глазная мазь

При обработке рук запрещается:

применять готовые крема
применять для дезинфекции спирт этиловый 70%
механически удалять загрязнения
*мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды

К легковоспламеняющимся веществам относится:

глицерин
калия перманганат
перекись водорода
*спирт этиловый

К опасным производственным факторам согласно ст. 209 Трудового Кодекса РФ относятся производственные факторы, воздействие которых на работника может привести к:

снижению производительности труда отдельного работника
*производственной травме
заболеванию работника
снижению профессиональных навыков работников

Совокупность технических средств и приемов, которые сводят к минимуму риск при работе:

гигиена труда
*техника безопасности
производственная санитария
условия труда

К товарам аптечного ассортимента относятся лекарственные препараты и:

*медицинские изделия
санитарно-гигиенические товары
лечебная косметика
БАД

Заполняемость стеллажей, в которых хранятся емкости с легковоспламеняющимися лекарственными препаратами:

не менее, чем в 5 рядов
*в один ряд
не более, чем в 2 ряда
в несколько рядов

Показания к применению транквилизаторов:

эндогенная депрессия
приступы маниакального возбуждения
*невротические реакции
психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями

При обморочных состояниях фармацевт может информировать о возможности применения:

борной кислоты
настойки полыни
пероксида водорода
*раствора аммиака

Гастропротекторным действием обладает лекарственный препарат:

*де-нол
маалокс
омепразол
бекарбон

К биологически активным добавкам относится:

*компливит селен
компливит для женщин 45 плюс
комплигам В
комбилипен

Объясните пациенту, какой препарат эффективен при амебиазе любой локализации:

доксикалин
декарис
тетрациклин
*метронидазол

К антиагрегантам относится:

гепарин
фибринолизин
*аспирин
тромбин

Торговое название лекарственного средства Ацеклофенак:

мовалис
*аэртал
нимесил
вольтарен

Удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остаточных количеств лекарственных веществ:

дезинфекция
асептика
стерилизация
*предстерилизационная очистка

Ветошь, предназначенную для уборки, по окончании работы хранят в таре:

дезинфицированной
открытой
стерилизованной
*промаркированной

При включении электроприборов запрещается:

проверять соответствие напряжения прибора по паспорту, напряжению в сети
проверять исправность электроприборов
*трогать приборы мокрыми руками
проверять наличие заземления у приборов, имеющих металлический корпус

За работу в ночное время производится доплата, объем которой:

*определяется положением об оплате труда в организации

30%

50%

25%

Поступление в аптечную организацию калия перманганата необходимо оформить в журнале:

учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно- количественному учету

*регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ

учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения

Документ, в котором фиксируется результат приемки товара по количеству мест на складе:

журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями

журнал товародвижения

*журнал учета движения товара

журнал учета тары

Под приемкой товаров понимают:

*проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям

совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров

проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов

проверку количества товара

В каналах товародвижения аптечный склад представляет:

производителя

*оптовое звено

конечных потребителей

розничное звено

К самостоятельной работе по безрецептурному отпуску готовых лекарственных препаратов допускаются лица:

*со средним фармацевтическим образованием

без среднего фармацевтического образования

соблюдающие трудовой распорядок

использующие санитарную одежду

При приемочном контроле ЛП проверяются показатели:

общий объем, упаковка, масса

упаковка, масса, маркировка

*описание, упаковка маркировка

масса, маркировка, описание

Розничную надбавку на лекарственные препараты, кроме ЖНВЛП, аптеки, являющиеся плательщиками НДС, считают от цены:

оптовой с НДС

*оптовой без НДС

производителя с НДС

производителя без НДС

Транспортная накладная – это документ:

который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей сторонней организации

*по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции

который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

Прибылью распоряжается собственник, оставляя лишь часть ее самому предприятию в:

обществах с ограниченной ответственностью

полных товариществах

*унитарных предприятиях
акционерных обществах

У Наперстянки пурпурной в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают:

траву
*листья
корни
цветки

Лекарственное растительное сырье «Пижмы обыкновенной цветки» входит в состав сбора:

*желчегонного № 3
слабительного
грудного № 1
грудного № 4

Стимулятор эритропоэза:

*эритропоэтин
фейба
метипред
нейпоген

У Хвоща полевого в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают:

листья
корни
цветки
*траву

Недостатком ответственного самолечения является:

экономия медицинских ресурсов
экономия финансовых ресурсов
*высокий риск развития осложнений
активное участие потребителя

Соответствие медицинского изделия установленным нормам подтверждается:

экспертным заключением
протоколом анализа
свидетельством о государственной регистрации
*декларацией о соответствии

Лекарственная форма выпуска пилокарпина:

капсулы
мазь
*глазные капли
Таблетки

Анорексигенное средство, подлежащее предметно-количественному учету:

орлистат
флуоксетин
редуксин лайт
*сибутрамин

При стандартизации минеральных вод, реализуемых в аптеках, согласно национальному стандарту, учитываются все показатели, кроме:

бактериологический показатель
органолептические показатели
химический состав
*цены

Антигормональным действием обладает препарат:

метотрексат
*тамоксифен
азатиоприн

доксорубин

Для применения психостимуляторов показанием является состояние:

*снижение умственной и физической работоспособности
органические заболевания сердечно-сосудистой системы
глаукома
бессоница

Дайте информацию посетителю аптеки, как хранить стерильные бинты:

в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и хранить в полиэтиленовом пакете

*стерильные бинты хранятся в заводской упаковке

в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и положить на стол

в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в шкаф

Предложите желчегонный препарат растительного происхождения:

дротаверин (но-шпа)

*фламин

мизопростол (сайтотек)

оксафенамид

Требования к маркировке пищевой продукции не включают:

*сведения о декларации

условия хранения пищевой продукции

срок годности пищевой продукции

дату изготовления пищевой продукции

Смена полотенец для личного пользования в аптеке осуществляется:

*ежедневно

1 раз в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

Лабораторные и инструментальные исследования при проведении производственного контроля в аптеке проводятся:

руководителем предприятия

специалистами Роспотребнадзора

*аккредитованными лабораториями

специалистом по охране труда и технике безопасности

Журнал, который не относится в аптеке к охране труда и технике безопасности:

*журнал регистрации результатов приемочного контроля

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Лекарственные средства с ярко выраженными гигроскопическими свойствами должны храниться в:

толстостенной пластмассовой таре

холодильнике

*таре с герметической укупоркой, залитой парафином

шкафу

Во избежание пожара не следует держать вблизи открытого огня и нагревательных приборов:

субстанцию натрия тетрабората

субстанцию магния сульфата

*лекарственное растительное сырье

индикаторы на водной основе

Вместо лестниц и стремянок для рабы на аптечном складе:

* применять случайные подставки не разрешается

разрешается использовать столы

разрешается использовать стулья

разрешается использовать ящики

Журнал (карта) регистрации результатов температурного картирования хранится в течение:

1 года
*2 лет
3 лет
5 лет

Если во время поступления товаров документы поставщика отсутствуют, приемная комиссия составляет:

*акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
коммерческий акт
приемный акт
акт приемочного контроля

Главной задачей организации оптовой торговли лекарственными средствами является:

информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах
*обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей
изготовление лекарственных препаратов по рецептам
обеспечение населения товарами аптечного ассортимента

У зав. аптеки продолжительность рабочей недели составляет:

*40 часов
44 часа
36 часов
42 часа

Активирование товарных потерь, произошедших в результате боя, порчи, производится:

ежемесячно
во время инвентаризации
*в момент установления факта боя, порчи
после утверждения акта приемки

Оборотная сторона препроводительной ведомости содержит:

*покупный перечень всей передаваемой суммы
ИНН аптеки
адрес аптеки
расчетный счет аптеки

Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю (в часах):

36
42
45
*40

В аптечной организации оперативный учет уценки и дооценки по лабораторно-фасовочным работам в течение месяца ведется в:

реестре выписанных счетов
*журнале учета лабораторных и фасовочных работ
журнале учета рецептуры
оборотной ведомости

По лабораторно-фасовочным работам за счет округления цены готовой продукции в сторону увеличения стоимости возникает:

уценка
оптовая цена
*дооценка
надбавка

Документ для инвентаризации лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету:

инвентаризационная опись
акт результатов инвентаризации
*сличительная ведомость

сводная опись

Процесс размещения продукции с обеспечением условий хранения с момента поступления до момента получения потребителем называется:

хозяйственная операция
управление потоками
*хранение
складирование

Текст и сигнальный цвет предупредительной надписи «Хранить в защищенном от света месте» на этикетке лекарственного препарата должны иметь вид:

*на синем фоне белый шрифт
на голубом фоне белый шрифт
на красном фоне белый шрифт
на зеленом фоне белый шрифт

Лекарственное средство, подлинность которого определяют по реакции «мурексидная проба»:

*теобромин
папаверина гидрохлорид
фурацилин
кодеин

Коричнево – желтый или коричневый легкий порошок без запаха, легко растворимый в воде:

колларгол
* протаргол
серебра нитрат
натрия висмутат основной

Наука, изучающая терапевтическую эффективность лекарственных препаратов в зависимости от фармацевтических факторов:

фармацевтическая химия
*биофармация
биотехнология
фармацевтическая технология

Единица измерения массы в аптечной практике:

сантиметр
*грамм
миллилитр
литр

В прописи не указана концентрация перекиси водорода. Отпускают раствор:

30%
8,3%
10%
*3%

Особенностью технологии изготовления водных извлечений, содержащих дубильные вещества, является:

*отжим и процеживание без предварительного охлаждения
процеживание без отжима
добавление кислоты хлористоводородной для обеспечения полноты экстракции
полное охлаждение после настаивания на водяной бане

Последовательность смешивания ингредиентов при изготовлении микстуры с пепсином:

хлористоводородная кислота + вода + пепсин
в любом порядке
пепсин + вода + кислота хлористоводородная
*вода + хлористоводородная кислота + пепсин

В рецепте не указана концентрация мази. Из веществ общего списка мазь готовят в концентрации:

3%
*10%

1%

5%

Процесс, обратный коагуляции – распад агрегатов до первичных частиц, называется:

коацервация

агрегация

*пептизация

синерезис

Лекарственная форма, состоящая из твердых частиц дисперсной фазы, обладающая свойством сыпучести:

суппозитории

суспензии

растворы

*порошки

Водное извлечение изготавливают в соотношении 1:30 из:

травы пустырника сердечного

корня алтея лекарственного

*травы горичвета весеннего

листьев мать-и-мачехи

На теплоизолирующие покрытия устанавливают:

штангласы

микроскоп

*инфундирный аппарат

бюреточную систему

К глазным мазям предъявляют следующее требование:

нестерильность основы

гидрофобность

*отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочку

продленность действия

Внутриаптечная заготовка:

экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию

*экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям

экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту

готовые расфасованные лекарственные формы

Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:

*наличием необходимого количества медицинских работников

муниципальным управлением здравоохранением

функционированием частной системы здравоохранения

государственным управлением здравоохранением

Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:

2 часа

15-20 минут

*30 минут

3-6 минут

Личный состав на сортировочном посту работает с использованием средств индивидуальной защиты:

защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

защитная одежда, перчатки, очки

защитная одежда, перчатки, щитки

*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:

ситуационно-обусловленные потери

общие потери

санитарные потери

*безвозвратные потери

Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:

*травма не совместимая с жизнью
травматический шок
острая кровопотеря
психотравма

Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:

3 часа
6 часов
1 час
*20-30 минут

К основным сортировочным признакам относится:

тяжесть состояния пострадавшего
*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации
вид повреждения
развитие шока и комы

Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при угрожающих их жизни и здоровью обстоятельствах:

во время проведения развлекательных мероприятий
только при террористических актах
*при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях
только при травмах

При лечении диареи рекомендуется отвар из:

толокнянки
цветов бессмертника
мяты
*ольховых соплодий

К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием можно отнести:

дротаверин (но-шпа)
панкреатин (фестал)
мебеверин (дюспаталин)
*эссенциальные фосфолипиды (эссенциале)

Правовое регулирование в фармацевтической практике проявляется в государственном воздействии на тот или иной процесс с использованием:

норм морали
религиозных норм
социальных норм
*норм права

К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:

одышка, сухой кашель
боли в области сердца, одышка
отеки, головная боль
*чувство голода, потливость

Для уменьшения побочных явлений во время лечения глюкокортикоидами требуется диета, богатая:

йодом
углеводами
*калием
железом

Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:

1%
0,1%
10%
*0,9%

Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:

восстановление сознания
повышение температуры тела
*порозовение кожных покровов
повышение АД

Прием Геймлиха при инородном теле в гортани – это:

сочетание искусственной вентиляции легких с непрямой массажем сердца
введение воздуховода
*серия из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
запрокидывание головы и открывание рта

Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи принято считать с момента поражения:

*1-2 часа
3 часа
не более 6 часов
4 -5 часов

Вирусный гепатит В передается путем:

алиментарным
воздушно-пылевым
воздушно-капельным
*парентеральным

Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:

эндемия
спорадические заболевания
эпидемия
*пандемия

Гигиеническое воспитание – это:

просветительная деятельность
воспитательная деятельность
обучающая деятельность
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

Забота о собственном здоровье является:

добровольным выбором гражданина
ответственностью человека перед обществом
личным делом каждого гражданина
*обязанностью граждан

Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении:

капиллярном
венозном
*артериальном
паренхиматозном

Средство для наркоза:

кофеин
эфедрин
*ксенон
парацетамол

Тримеперидин (промедол) – это:

*наркотический анальгетик
аналептик
психостимулятор
ненаркотический анальгетик

Обязательное медицинское страхование является:

системой, направленной на защиту прав медицинских работников
*составной частью государственной системы социального страхования
страхованием от несчастных случаев
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

Комплекс простейших мероприятий, выполняемых на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи, а также личным составом спасательных формирований, санитарных постов и санитарных дружин с использованием табельных и подручных средств – это:

первая врачебная помощь
доврачебная помощь
квалифицированная медицинская помощь
*первая помощь

Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:

*подавления овуляции
снижения двигательной активности сперматозоидов
уничтожения сперматозоидов
сгущения цервикальной слизи

Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:

Программой развития здравоохранения
Гражданским кодексом РФ
*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
Трудовым Кодексом РФ

Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:

дезинфекции
дератизации
*стерилизации
дезинсекции

Барьеры в общении между людьми:

искреннее сочувствие
активное слушание
*критика и советы, оценка другого человека, указания и приказной тон, переключение темы на себя
положительная обратная связь

При бронхиальной астме применяют:

бисопролол
*сальбутамол
метопролол
пропранолол (анаприлин)

Первичная профилактика табакокурения направлена на:

людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
людей, которые недавно начали курить
*некурящих людей
курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

У взрослых к первому этапу СЛР относится:

контроль показателей кровообращения
*проведение закрытого массажа сердца
проведение искусственной вентиляции легких
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

Инвентаризация имущества проводится по:

документации, представленной материально-ответственным лицом
его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица
*его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица
документации в присутствии руководителя медицинской организации

К инвазивным процедурам относится:

пассивное кормление пациента
подготовка пациента к исследованию
проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
*проведение в/м, в/в, п/к, инъекций

Понятие «кумуляция» обозначает:

привыкание
зависимость
*накопление
повышенная чувствительность

Эффект действия нитроглицерина наступает через:

20-25 минут
*1-2 минуты
15-20 минут
10-15 минут

Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции:

очаговая
профилактическая
текущая
*заключительная

Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают:

анемию
*желудочно-кишечные кровотечения
снижение артериального давления
одышку

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:

фунгицидное
бактериостатическое
вирулицидное
*бактерицидное

К группе противовирусных лекарственных препаратов относится:

парацетамол
дроперидол
*ацикловир
протамина сульфат

Должностные преступления – это:

*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог
клевета
оставление в опасности
оскорбление

К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:

бактериостатическое
фунгицидное
бактерицидное
*вирулицидное

Длительность действия морфина составляет:

*4-6 часов
1-2 часа
8-10 часов
10-12 часов

Основной симптом стенокардии:

*сжимающая, давящая боль

тошнота

слабость

одышка

Лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов, кроме:

хлоропирамина (супрастина)

преднизолона

*препаратов группы пенициллина

физиологического раствора

Вербальная информация передается с помощью:

*речи

жестов

позы

взгляда

«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются:

водные

анионные

гелеобразные

*спиртовые

По определению ВОЗ здоровье - это:

динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни

*состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней

состояние полного физического благополучия

отсутствие болезней

Утилизация медицинского мусора класса Б выполняется путем:

захоронения на территории больницы

складирования на хозяйственном дворе больницы

*сжигания в печах или захоронения на, спец.полигонах

вывоза на городскую свалку бытового мусора

Для проведения йодной профилактики при загрязнении местности радиоактивными веществами препараты йода хранятся:

в подразделениях медицинской организации

*на аптечном складе региона

в больничной аптеке

на складе центральной аптеки

Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой помощи:

доксциклин амоксициллин + клавулановая кислота

карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая

калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон

*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые и обезболивающие препараты

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утверждается Правительством РФ:

ежемесячно

*ежегодно

по мере необходимости

ежеквартально

Рейтингом называется:

уровень оценки квалификации медицинского работника

круг полномочий, которыми обладает специалист

уровень знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенных работ по

какой-либо профессии, специальности

*количественная оценка профессиональных характеристик

Реакция организма, возникшая в связи с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендованных в инструкции по применению, для профилактики, диагностики и лечения заболевания или для реабилитации, называется:

*побочным действием

нежелательной реакцией

терапевтическим эффектом

фармакологическим действием

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является:

*трудовая книжка

сертификат

свидетельство

справка из отдела кадров

Правильное соотношение компрессий на грудину и вдохов при проведении реанимации составляет:

5 : 2

*30 : 2

15 : 2

10 : 2

Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника, называется:

*квалификацией

аттестацией

аккредитацией

сертификацией

Открытость мыслям и чувствам других людей называется:

уважением

*умением слушать

искренностью

пониманием

Если объектом закупки являются лекарственные средства, то документация о закупке должна содержать указание:

о поставщике

о торговых наименованиях

*о международных непатентованных наименованиях

о производителе

Документ, содержащий обязательные к исполнению указания вышестоящих органов, называется:

внутренним

*директивным

входящим

исходящим

Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, относятся к классу опасности:

"Г"

*"А"

"Б"

"В"

Вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма, применяемые для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, называются:

*лекарственными средствами

сырьем

лекарственными формами

лекарственными веществами

Учение о должном поведении фармацевтических работников называется:

гуманизм
биоэтика
нравственность
*деонтология

Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции, называется:

*профессиональный стандарт
квалификационная категория
стандарт медицинской помощи
порядок оказания медицинской помощи

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержащие приборы и оборудование относятся к отходам:

«Д»
«Б»
«В»
*«Г»

Менеджмент качества нацелен на выполнение требований:

* потребителей
исполнителей
поставщиков
производителей

К преступлению против здоровья населения и общественной нравственности относят:

убийство матерью новорожденного ребенка
незаконное ношение оружия
*сокрытие информации о событиях, создающих опасность для жизни людей
причинение смерти по неосторожности

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться административные наказания в виде:

выговора
увольнения
замечания
*предупреждения

Для остановки венозного кровотечения необходимо:

согнуть конечность выше раны
согнуть конечность ниже раны
*наложить давящую повязку
наложить жгут

Организационно-правовой документ, определяющий основные функции, обязанности, права и ответственность работника при осуществлении им деятельности в определенной должности, называется:

*должностная инструкция
локальный нормативный акт
коллективный договор
штатное расписание

К взрывчатым веществам относят:

глицерин
*нитроглицерин
аминофиллин
эпинефрин

Для работников, у которых условия труда отнесены к вредным или опасным, сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается не более (часов в неделю):

*36

38

37

39

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для:

*выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации
расширения должностных обязанностей
выполнения новых профессиональных задач в рамках приобретенной ранее специальности
актуализации познаний в рамках имеющейся специальности

Документ, объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка, называется:

справка

служебное письмо

*объяснительная записка

докладная записка

Новую порцию антисептика (или мыла) наливают в дозатор после:

промывания водой, высушивания

промывания водой

мытья моющим средством, промывания водой

*дезинфекции, промывания водой, высушивания

Организация безопасности труда на рабочем месте необходима для создания:

*мер по предупреждению травм, воздействия токсических, микробиологических, радиационных и стрессовых факторов

санитарно-эпидемиологического режима

психологического комфорта

лечебно-охранительного режима

Оказание медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации начинается с проведения:

противоэпидемических мероприятий

*медицинской сортировки

медицинской эвакуации

медицинской помощи

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психоактивных веществ, наказывается лишением свободы, с последующим лишением права занимать определенные должности на срок:

3 года

4 года

*2 года

5 лет

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда влечет за собой:

*наложение административного штрафа

объявление замечания

освобождение от работы

наложение административного ареста

Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до:

1 года

5 лет

10 лет

*3 лет

Иммунобиологические лекарственные препараты, предназначенные для проведения специфической профилактики, называются:

иммуноглобулины

*вакцины

антибиотики

бактериофаги

Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, называется:

персонализированные данные
субъективные данные
индивидуальные данные
*персональные данные

Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:

преднизолон
унитиол
*атропин
диазепам

При отравлении опиатами противопоказан:

диазепам
*кордиамин
преднизолон
атропин

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и предупреждение возникновения заболеваний:

лечение
реабилитация
диагностика
*профилактика

Признаком эффективности реанимационных мероприятий является:

расширенные зрачки
бледность кожных покровов
*появление самостоятельного дыхания
суженные зрачки

Наложение штрафа относится к ответственности:

дисциплинарной
*административной
материальной
уголовной

Появление рвоты «кофейной гущей» свидетельствует о:

пищевой токсикоинфекции
*желудочном кровотечении
аневризме пищевода
пилоростенозе

Антидотом при отравлении метанолом является:

атропин
унитиол
налоксон
*этиловый спирт

Конфликт определяется как:

*отсутствие согласия между двумя или более сторонами
влияние, основанное на принуждении
побуждение других к достижению целей организации
способность оказывать влияние на отдельные личности

Тройной прием Сафара включает в себя:

сгибание головы, открывание рта, валик под плечи
*разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открывание рта
поворот головы вправо, открывание рта, валик под голову

поворот головы влево, открывание рта, валик под голову

В перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, входит:

боль за грудиной
роды
*отравление
признаки инсульта

Работники предупреждаются об увольнении по сокращению численности штата не менее чем за:

две недели
*два месяца
один месяц
одну неделю

Какие пути введения относятся в парентеральным?

внутривенный, трансдермальный, трансбуккальный
ректальный, назальный, пероральный
подкожный, внутримышечный, сублингвальный
*внутримышечный, подкожный, субарахноидальный

Какое явление может возникнуть при совместном введении двух ЛС?

привыкание
зависимость
кумуляция
*синергизм

При каком пути введения отсутствует процесс всасывания ЛС?

трансдермальном
внутримышечном
подкожном
*внутривенном

Какой препарат вызывает расширение зрачка?

тимолол
пилокарпин
неостигмина метилсульфат
*тропикамид

Для лечения артериальной гипертензии используют:

фенилэфрин
оксиметазолин
*клонидин
тетризолин

Долгосрочный побочный эффект ксилометазолина:

кандидоз ротовой полости
*атрофия слизистой оболочки
нарушения функции печени
угнетение кроветворения

К ноотропным средствам относится:

суматриптан
парацетамол
*гопантенат кальция
лития карбонат

В качестве психостимулятора применяется:

трамадол
кетамин
*кофеин
кодеин

Альтернативное название ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы:

кирены
*статины
фибраты
сартаны

Для купирования приступа стенокардии целесообразно использовать сублингвальную форму:

метопролола
*нитроглицерина
нитропруссид натрия
дигоксина

При ишемическом инсульте применяют:

валсартан
дигоксин
*нимодипин
периндоприл

Показанием к применению нитропруссид натрия является:

*гипертонический криз
ортостатическая гипотензия
мерцательная аритмия
синусовая тахикардия

К какой фармакологической группе относится метопролол?

диуретики
*бета-адреноблокаторы
ингибиторы АПФ
сартаны

Препарат гормона эпифиза, регулирующий биоритмы и применяемый в качестве снотворного средства:

летрозол
тиамазол
соматотропин
*мелатонин

Для восполнения дефицита витамина В₆ применяют:

аскорбиновую кислоту
рибофлавин
*пиридоксин
фолиевую кислоту

К антикоагулянтам непрямого действия относится:

клопидогрел
эноксапарин
*варфарин
абциксимаб

К какой фармакологической группе относится аминакапроновая кислота?

антикоагулянты
*антифибринолитики
фибринолитики
антиагреганты

Какое действие ЛС при беременности приводит к врожденным уродствам?

фетотоксическое
*эмбриотоксическое
токолитическое
тератогенное

Каким действием обладают анксиолитики?

ноотропным
*противотревожным
противопаркинсоническим
антипсихотическим

Препарат животного происхождения, применяющийся для лечения нарушений мозгового кровообращения:

винкамин
циннаризин
*церебролизин
дигидроэрготоксин

Какой препарат относится к группе общетонизирующих средств?

экстракт валерианы
алкалоиды барвинка малого
экстракт сенны
*экстракт элеутерококка

Какой препарат применяют при глаукоме?

атропин
*пилокарпин
фенилэфрин
тропикамид

Какой препарат относится к группе М-холиноблокаторов?

пилокарпин
*атропин
галантамин
фенилэфрин

При ринитах применяют:

галантамин
тропикамид
доксазозин
*ксилометазолин

При гипофункции щитовидной железы применяют:

кортикотропин
дезоксикортикостерона ацетат
*тироксин
инсулин

Гормональный препарат, применяемый при анафилактическом шоке:

инсулин
окситоцин
тиреоидин
*преднизолон

Основным средством терапии сахарного диабета 1 типа является:

глибенкламид
метформин
пиоглитазон
*инсулин

Какой препарат является анальгетиком-антипиретиком?

диклофенак
*метамизол натрия
индометацин
кеторола

К местным анестетикам относится:

лидокаин и галантамин
артикаин и неостигмин
*лидокаин и артикаин

Механизм действия морфина:

парциальный агонист μ -рецепторов
антагонист μ - и агонист κ -рецепторов
агонист μ -рецепторов и ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ
*полный агонист опиоидных рецепторов (μ, κ, δ)

Для купирования гипертонического криза применяют:

индапамид
*каптоприл
ацетазоламид
гидрохлоротиазид

При нарушении периферического кровообращения применяют:

нимодипин
суматриптан
индапамид
*пентоксифиллин

Фармакологическое действие кислоты ацетилсалициловой:

*антиагрегантное
гемостатическое
антикоагулянтное
эритропоэтическое

Какой НПВС применяют в низкой дозе для профилактики ИБС?

*ацетилсалициловую кислоту
нимесулид
кеторолак
диклофенак

Основные фармакологические эффекты НПВС:

*обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный
противовоспалительный, обезболивающий, седативный
жаропонижающий, обезболивающий, снотворный
обезболивающий, седативный, антиагрегантный

Антибиотик цефалоспоринового ряда:

*цефаклор
стрептомицин
феноксиметилпенициллин
эритромицин

К фторхинолонам относится:

*моксифлоксацин
линкомицин
ванкомицин
азтреонам

Какой препарат относится к макролидам?

доксисицилин
*кларитромицин
окситетрациклин
метациклин

Какой препарат относится к группе линкозамидов?

хлорамфеникол
стрептомицин
гентамицин
*линкомицин

Сырье Горичвета весеннего хранится:

отдельно, как плоды и семена
по общему списку
отдельно, как эфиромасличное
*отдельно, как сильнодействующее

Антрагликозиды, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами:

желчегонными
*слабительными
отхаркивающими
кардиотоническими

Для лекарственных препаратов Хвоща полевого характерно основное фармакологическое действие:

отхаркивающее
кардиотоническое
вяжущее
*мочегонное

В состав мочегонного сбора входит сырье:

*толокнянки обыкновенной
крапивы двудомной
наперстянки пурпурной
багульника болотного

Алкалоиды являются основной группой биологически активных веществ в:

*траве термопсиса
корнях алтея
траве душицы
листьях трифоли

Корни Алтея лекарственного содержат биологически активные соединения:

*полисахариды
горечи
антрагликозиды
сердечные гликозиды

В состав седативного сбора входит сырье:

*мяты перечной
брусники обыкновенной
наперстянки пурпурной
багульника болотного

Для лекарственных препаратов «Подорожника большого листа» характерно основное фармакологическое действие:

потогонное
гепатопротекторное
*отхаркивающее
фотосенсибилизирующее

Флавоноиды, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами:

фотосенсибилизирующими
*желчегонными

отхаркивающими
кардиотоническими

Из лекарственного растительного сырья «Эхинацеи пурпурной трава» производят лекарственный препарат:

флакарбин
негрустин
ромазулан
*иммунал

Документ, который не оформляется на иммунобиологические препараты:

сертификат производства МИБП
декларация о соответствии
*свидетельство об утверждении типа средства измерения
сертификат соответствия МИБП

Медицинские осмотры работников фармацевтических предприятий и аптечных организаций проводятся за счет средств:

*работодателя
работника
муниципального бюджета
фонда обязательного медицинского страхования

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми:

работниками не реже одного раза в полугодие
*вновь принимаемыми на работу, временными работниками, командированными, студентами, прибывшими на практику и др. при приеме на работу
работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
работниками при выполнении ими разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности

Разрешение на осуществление фармацевтической деятельности аптечной организацией подтверждается наличием у нее:

*лицензии
паспорта аптеки
устава организации
акта обследования аптеки

Выборочный контроль качества лекарственных средств осуществляется:

Роспотребнадзором
Министерством здравоохранения РФ
*Росздравнадзором
лицензирующим органом

К работе с наркотическими средствами, психоактивными веществами не допускаются лица:

достигшие 18-летнего возраста
*больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом
не имеющие непогашенных или неснятых судимостей за преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления
достигшие пенсионного возраста

Поведение фармацевта с позиций деонтологии не направлено на:

создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе
достижение эффективности лечения больных
создание благоприятных взаимоотношений в системе фармацевтический работник – врач – больной
*увеличение объема продаж

Документом, подтверждающим соответствие БАДов установленным требованиям, является:

*свидетельство о государственной регистрации
сертификат соответствия
свидетельство об утверждении типа средства измерения

сертификат соответствия МИБП

Документ, подтверждающий качество лекарственного средства для реализации из аптеки:

копия сертификата соответствия

*декларация о соответствии

паспорт качества завода изготовителя

протокол анализа независимой лаборатории

Специальной оценке условий труда подлежат:

рабочие места с вредными и опасными условиями труда

*все, имеющиеся в организации рабочие места

рабочие места, оборудованные различными приборами и механизмами

50% рабочих мест от всех, имеющихся в организации

Повторный инструктаж проводится с периодичностью:

1 раз в месяц

*1 раз в полгода

1 раз в квартал

1 раз в год

ЛП для медицинского применения хранятся:

в соответствии с требованиями государственного реестра ЛС

без особых требований

*в соответствии с указаниями производителя по хранению, указанными на вторичной упаковке и в государственной фармакопее

в соответствии с требованиями регистра ЛС

Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение:

периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления

*установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи потребителю, если срок службы не установлен

срока, установленного договором

срока годности товара

Покупатель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества не вправе по своему выбору потребовать:

замены на товар аналогичной марки

*наказания продавца, продавшего товар ненадлежащего качества

замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены

возврата уплаченной за товар денежной суммы

Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, не находящихся под международным контролем, осуществляется:

в изолированных помещениях хранения

в обычных помещениях хранения

*в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня

в технически укрепленных помещениях, аналогичных помещениям хранения наркотических и психотропных ЛС

Ассортимент реализуемых товаров в аптечных организациях устанавливается:

органом управления фармацевтической службой субъекта РФ

Министерством здравоохранения РФ по минимальному перечню для оказания медицинской помощи

*руководителем аптеки самостоятельно с учетом условий лицензии

органом местного самоуправления

Генеральную уборку асептического блока в аптеке проводят не реже одного раза в:

*неделю

3 дня

день

две недели

Хозяйственные связи между поставщиком и покупателем (аптечной организацией) оформляются:

аккредитивом
обязательством
соглашением
*договором

Выплата заработной платы относится к расходной кассовой операции, юридическим основанием которой является:

заявление о выдаче наличных денег
приемная квитанция
объявление на взнос наличными
*расчетно-платежная ведомость

Запасы лекарственных препаратов в аптеке измеряются:

*в днях запаса
только в относительных показателях
уровнем товарных запасов
по средней стоимости

Рецепт на ЛП с пометкой «STATIM» с момента обращения пациента в аптечную организацию обслуживается в срок, не превышающий:

пяти рабочих дней
двух рабочих дней
*один рабочий день
десяти рабочих дней

Какие аспекты взаимодействия ЛС и организма изучает фармакодинамика?:

распределение
*механизмы действия и эффекты
всасывание
метаболизм

Сырье, заготавливаемое от спорыньи пурпурной, содержит алкалоид:

*эрготамин
пилокарпин
кофеин
платифиллин

Из лекарственного растительного сырья «Бессмертника песчаного цветки» производят лекарственный препарат:

флакарбин
глицирам
*танацехол
фламин

Из лекарственного растительного сырья «Ромашки аптечной цветки» производят лекарственный препарат:

ледин
*ромазулан
танацехол
фламин

Дубильные вещества, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами:

желчегонными
*вяжущими
слабительными
кардиотоническими

Трава Чистотела большого содержит биологически активные соединения:

полисахариды
дубильные вещества

сердечные гликозиды
*алкалоиды

Эфирные масла являются основной группой биологически активных веществ в:
листьях кассии (сенны)
плодах шиповника
*листьях мяты перечной
корневищах змеевика

В качестве лекарственного сырья у Подорожника большого заготавливают:
корни
плоды
*листья
цветки

У Шиповника коричневого в качестве сырья заготавливают:
корни
листья
цветки
*плоды

Для исключения отказов покупателями и формирования положительного имиджа аптечной организации необходимо ежедневно регистрировать:
*неудовлетворенный спрос
действительный спрос
угасающий спрос
сезонный спрос

Согласно теории менеджмента, организация – это:
комплексная система организации производственной деятельности предприятия
*группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность
система сознательно координируемых действий двух или более человек

Товарооборот аптечной организации – это:
валовая прибыль организации
прибыль от реализации товаров
количество проданных упаковок ЛП
*стоимость проданных товаров за отчетный период

Отметка на рецепте об отпуске препарата не включает:
ФИО и подписи отпустившего
наименования или номера аптечной организации
наименования и дозировки ЛП, даты отпуска
*серии препарата

При простатите и аденоме предстательной железы применяют:
сальбутамол
атропин
*тамсулозин
фенилэфрин

К какой группе лекарственных средств относится Гопантеновая кислота?:
противопаркинсонические
антиконвульсанты
антидепрессанты
*ноотропы

Фармакологический эффект, характерный для Дигоксина?
гипотензивный
антиишемический

*кардиотонический
гиполипидемический

Альтернативное название блокаторов ангиотензиновых рецепторов:

кирены
*сартаны
фибраты
статины

При нарушении периферического кровообращения применяют:

суматриптан
*пентоксифиллин
индапамид
нимодипин

К какой фармакологической группе относится Бисопролол?

сартаны
диуретики
ингибиторы АПФ
*бета-адреноблокаторы

Препарат глюкокортикостероидов, используемый для местного применения в виде мази в дерматологии:

финастерид
*бетаметазон
летрозол
тамоксифен

К какой фармакологической группе относится Тимоген?

иммуносупрессоры
*иммуномодуляторы
противоаллергические средства
стимуляторы кроветворения

В какой лекарственной форме выпускают Ксилометазолин?

комбинированная суспензия
ректальные суппозитории
*назальный спрей
раствор для инъекций

Каким действием обладают нейролептики?

*антипсихотическим
галлюциногенным
ноотропным
психостимулирующим

Какое средство относится к группе седативных?

афобазол
гопантеповая кислота
пирацетам
*экстракт валерьяны

Личным психологическим пространством при общении с пациентом считается расстояние (в см):

120-360
*46-200
более 360
15-46

Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности влечет за собой ответственность:

процессуальную
гражданско-правовую
*уголовную

финансовую

Документ, предназначенный для использования в той медицинской организации, в которой он составлен, называется:

входящим

*внутренним

гарантийным

исходящим

Достаточным стажем работы для присвоения высшей квалификационной категории является:

*5 лет

4 года

7 лет

3 года

Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в действие не позднее, чем за:

*4 недели

10 дней

3 недели

2 недели

К взрывоопасным веществам относят:

метамизол натрия

калия оротат

*калия перманганат

дифенингидамин

При применении какого препарата может развиваться гипокалиемия?

эналаприла

спиронолактона

*фуросемида

валсартана

Антисекреторное средство – ингибитор протонной помпы:

ранитидин

*омепразол

пирензепин

фамотидин

Фармацевтические субстанции, требующие защиты от воздействия влаги, следует хранить при температуре до (°C):

25

18

40

*15

К ингибиторзащищенным пенициллинам относится комбинация:

цефоперазона и сульбактама

имипенема и циластатина

амоксициллина и ампициллина

*амоксициллина и клавулановой кислоты